

FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES

Fascículo 9

octubre de 1992

TAXACEAE*

Por Sergio Zamudio Ruiz^{**,***}

Instituto de Ecología, A.C.

Centro Regional del Bajío

Pátzcuaro, Michoacán

Árboles o arbustos, generalmente dioicos, rara vez monoicos; hojas persistentes, alternas, dispuestas en espiral, dísticas o subdísticas por la torsión del pecíolo, lineares a linear-lanceoladas, aplanadas, con bandas de color verde claro o glaucas en el envés; estróbilos estaminados axilares, solitarios o en espigas compactas, rodeados en la base por varias brácteas, con (1) 3 a 14 estambres, anteras con 2 a 9 sacos polínicos, situados en una escama apicalmente engrosada o peltada; estróbilo femenino axilar, formado por varias escamas estériles y una escama ovulífera terminal, con un óvulo solitario erecto; semilla de consistencia ósea, rodeada parcial o totalmente por un arilo suave y carnoso de color rojo, embrión con dos cotiledones.

Familia con tres a cinco géneros y unas 15 especies; distribuida en el Hemisferio Norte y en Nueva Caledonia. En México sólo se registra la existencia del género *Taxus*.

Varios representantes de esta familia han sido usados tradicionalmente como plantas de ornato y en Europa la madera de *Taxus* se emplea desde tiempos remotos en la ebanistería.

* Referencia: Pilger, R. 1903. Taxaceae. In: A. Engler. Pflanzenreich 18 (IV, 5): 1-124.

** Trabajo realizado con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

*** Se agradece al Dr. H. Ern, Director del Museo y Jardín Botánico de Berlín (B), el proporcionar información sobre el ejemplar tipo de *Taxus globosa*.

TAXUS L.*

Árboles o arbustos dioicos, perennifolios; hojas dispuestas en espiral, pero frecuentemente dísticas, cortamente pecioladas, lineares a linear-lanceoladas, rectas o a menudo falcadas; estróbilos masculinos axilares, solitarios o rara vez en espigas cortas, subsésiles, rodeados por varias brácteas escumiformes imbricadas, columna estaminal cortamente estipitada, turbinado-globosa, con (4) 6 a 14 estambres agrupados en el ápice, que sobresalen de las brácteas, anteras peltadas, subglobosas, deprimidas por arriba, con 3 a 9 esporangios que cuelgan del borde externo, estípite corto, conectivo no apendiculado, antera abierta casi en forma de sombrilla, con 3 a 9 lóbulos; óvulo solitario sobre una escama terminal, axilar, cubierto por numerosas escamas estériles, anchas, fuertemente imbricadas, las superiores gradualmente más grandes, casi formando una cúpula, lámina ovulífera anular en la antesis, volviéndose prominente con el tiempo, cupulada y truncada, más corta que la semilla; semilla madura ovoide-globosa, testa dura, cubierta parcialmente por un arilo carnoso, en forma de baya, de color rojo brillante, embrión con 2 cotiledones.

Género compuesto por 7 a 10 especies ampliamente distribuidas en las regiones templadas del Hemisferio Norte, cuatro en Norteamérica. Las hojas y la semilla de algunas especies de *Taxus* son venenosas al hombre y al ganado, por la presencia de un alcaloide llamado taxina; la madera es rica en taninos. En América no tienen importancia económica destacada, pero en Europa las plantas de este género fueron usadas en la medicina tradicional como abortivas y emenagogas, las variedades hortícolas de *Taxus baccata* L. se han cultivado ampliamente en parques y jardines, la madera se emplea en la construcción de muebles y en la fabricación de arcos por su flexibilidad.

En México sólo se conoce una especie hasta el momento.


Taxus globosa Schlecht. Linnaea 12: 496. 1838. *T. baccata* ssp. *globosa* (Schlecht.) Pilger, Pflanzenreich 18 (IV, 5): 114. 1903.

Nombre común registrado en la zona: granadillo.

Nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: palmira, romerillo, tlatscal.

Árbol bajo o arbusto, perennifolio, de (3) 6 a 12 m de alto; tronco erecto, de 30 a 50 cm de diámetro, muy ramificado, las ramas son al principio algo ascendentes, pero después descienden y las ramillas son colgantes, formando una copa redondeada o extendida, corteza escamosa, de color café claro, se desprende en fragmentos cuadrados o rectangulares de unos 3 a 4 cm por lado, la corteza de las

*Referencia: Bailey, L. H. 1949. Manual of cultivated plants. Revised edition. MacMillan Publishing Co., Inc. New York. Pp. 99-101.



Taxus globosa Schlecht. A. rama con estróbilos; B. segmento de una rama femenina con semillas cubiertas por un arilo carnoso de color rojo; C. ramilla con estróbilos masculinos mostrando los esporangios. Ilustrado por Sue Sill.

ramas es más o menos lisa, de color café claro, las ramillas son también cafés y conservan las bases en donde se insertaban las hojas que han caído, los renuevos son de color verde claro; hojas jóvenes distribuidas en espiral, más tarde se disponen en forma dística o subdística por la torsión del pecíolo, aplanadas, lineares a linear-lanceoladas, ligeramente falcadas, de (1.5) 2 a 3.5 cm de largo, por 2 a 2.5 mm de ancho, ápice agudo, acuminado, base angostada en un pecíolo corto, márgenes ligeramente involutos, una sola vena media engrosada, verde oscuras en el haz, más claras en el envés; estróbilos masculinos axilares, ubicados en la parte inferior de las ramillas, solitarios o rara vez en espigas apretadas de 2 a 4, formados por 9 a 14 estambres con filamentos cortos, escama de la antera peltada, con (3) 4 a 7 (8) sacos polínicos péndulos; estróbilos femeninos solitarios en las axilas de las hojas, dispuestos en la parte posterior de las ramas, rodeados por varias brácteas membranosas, verdes, con el margen escarioso; semillas ovoides, de 6 a 7 mm de largo por 4 mm de ancho, cubiertas parcialmente por un arilo carnoso de color rojo, maduran el primer año.


Es un árbol muy escaso en la región de estudio, sólo se conoce de la porción nororiental del estado de Querétaro. Crece en el fondo de cañadas húmedas con bosque mesófilo de montaña, bosque de *Pinus patula* y bosque de *Abies religiosa*. Alt. 1000-2850 m, Florece de diciembre a febrero, y las semillas maduras se encuentran de septiembre a noviembre.

Se distribuye a lo largo de la Sierra Madre Orienta] y la Sierra de Juárez de Oaxaca, reapareciendo al parecer en forma disyunta en Guatemala y Honduras. N.L., Tamps., S.L.P., Qro., Hgo. (tipo: *C. A. Ehrenberg 448 (B)*), Ver., Oax.; Centroamérica.

Aunque llega a ser localmente abundante, no deja de ser vulnerable, pues la creciente destrucción de los bosques en que habita puede afectar drásticamente a las pocas poblaciones que existen y ocasionar su desaparición.

Querétaro: cerro Las Avispas, camino a Xilitla, municipio de Jalpan, *C. Guzmán 181* (IEB); cañada Las Avispas, al SE de San Juan de Los Durán, municipio de Jalpan, *E. Carranza 2332* (IEB); Joya del Hielo, 5 km al NE de Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, *R. Fernández 4446* (CHAPA, ENCB); Cañada de los Granadillos, cerca del Rancho los Pinos, municipio de Pinal de Amoles, *S. Zamudio 6115* (CHAPA, IEB); El Salto, cerca de Santa Agueda, municipio de Pinal de Amoles, *A. Herrera 4* (ENCB, IEB, MEXU); cerca del Puerto de Canoa, Vertiente N del Cerro Pingüical, municipio de Pinal de Amoles, *J. Rzedowski 48219* (IEB); cañada del Agua Fría, cerro La Calentura, municipio de Pinal de Amoles, *S. Zamudio 3627* (CHAPA, IEB), *6069* (CHAPA, IEB); Cañada del Agua Fría, 10 km al S de Pinal de Amoles, municipio de Pinal de Amoles, *R. Fernández 994* (ENCB, IEB).

En Querétaro no se conoce ningún uso para este árbol, pero en otros estados se emplea como ornamental, maderable, curtiente y para elaborar carbón.



A pesar de que algunos autores han ubicado a *T. globosa* como una subespecie de *T. baccata* L., en la actualidad se considera a las especies americanas como entidades independientes de la europea. *T. globosa* se distingue por sus hojas más largas y delgadas, agudas, claramente falcadas y por la semilla ovoide, más gruesa. Las diferencias en hábito y el aislamiento geográfico refuerzan este criterio. La existencia de estróbilos masculinos agrupados en espigas compactas en las poblaciones de Querétaro es un carácter novedoso, no citado con anterioridad para el género.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PLANTAS

Abies religiosa, 4
granadino, 2
palmira, 2
Pinus patula, 4
romerillo, 2
Taxaceae, 1

Taxus, 1, 2
T. baccata, 2, 5
T. baccata ssp. *globosa*, 2
T. globosa, 2, 3, 5
tlatscal, 2