

Guía de campo con nombre totonaco
del municipio de Zongozotla, Puebla¹

(con datos adicionales de Atlequizayán, Cuauhtemoc, Xochitlán, Zoquiapan)

Osbel López-Francisco, Jonathan D. Amith y Kenia Velasco Gutiérrez²

En proceso de edición
No citar sin previa autorización
2020-05-13

Acanthaceae

Hasta la fecha se han colectado 17 especies de Acanthaceae en Zongozotla y pueblos circunvecinos, incluyendo por lo menos 1 especie nueva a la ciencia, *Justicia alanae* Daniel y otro, una *Ruellia*, que posiblemente también resulte ser nueva especie. La familia se caracteriza por tener hoja opuestas, flores con pétalos unidos (por lo menos por la base o pétalos inferiores) y frutos que son cápsulas dehiscentes. Generalmente plantas de esta familia son hierbas o bejuco aunque a veces llegan a ser pequeños arbustos. Las especies más importantes económicamente son las varias que se emplean para cercas vivas y *Justicia spicigera* cuyas propiedades medicinales son ampliamente conocidas.



Acanthaceae
Chilanthemum trifidum Oerst.





Descripción: Planta endémica a algunos estados del centro de México.







Arbusto de 2 m de alto, hojas opuestas y lanceoladas de 6 cm., flor de 6 mm., color lila con garganta blanca.







Colecta: 22324








Totonaco de Zongozotla
Sin nombre conocido.







Totonaco de Atlequizayán
Sin nombre conocido.

			<p>Acanthaceae <i>Dicliptera sumichrasti</i> Lindau</p> <p>Descripción: Planta herbácea</p> <p>Colecta: 22320, 22297</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xtata:stukut chuwula'</i></p> <p>Náhuat de S. Mig. Tzinacapan <i>a:xiwit</i></p> <p>Notas: <i>Dicliptera sumichrasti</i> fue colectada solamente en Atlequizayán. Significa algo como "su coyuntura de pie de guajolote". Ahí y en Cuetzalan las hojas se hierven y se revuelven con masa para alimentar a pavipollos chiquitos en lugar de comprar alimento comercial.</p>
		<p>Acanthaceae <i>Hypoestes phyllostachya</i> Baker</p> <p>Descripción:</p> <p>Cols. 22298</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsipsni tawan</i></p> <p>Nota: Significa 'hierba punteada o salpicada'. Crece en la orilla de los caminos. No se ha reportado uso alguno.</p> <p>Nahuat Zoquiapan <i>chahkwil xiwit</i> Nota: Según el asesos significa 'pintillo'. Como planta viva se emplea sembrada en los jardines como ornamental.</p>	








				
			<p>Acanthaceae <i>Justicia amplifolia</i> T.F. Daniel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21907</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsi:s</i></p> <p>Notas: Los asesores comentaron que conocen dos tipos de tsi:s. El otro es de hojas grandes. No hubo un asesor de habla náhuat present así que no se sabe si esta especie hubiera sido clasificado como mowih, <i>J. spicigera</i>.</p>
		<p>Acanthaceae <i>Justicia alanae</i> Daniel (sp. novo)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22328</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán Sin nombre conocido.</p>	





		<p>Acanthaceae <i>Justicia aurea</i> Schltld.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74170</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ktajan waqne'</i></p> <p>Notas: Significa 'cola de zorra'. Se utiliza para cercas vivas. Tiene el mismo uso entre los pueblos nahuas de Cuetzalan. En S. Miguel Tzinacapan se llama <i>a:kwitaxo:chit</i> o <i>xokotatopo:nkowitz</i> pero en Tacuapan se conoce como <i>sorrahkwitapi:l</i>, con el mismo significado de 'cola de zorra' como en el totonaco de Zongozotla. Véase <i>Justicia carnea</i></p>
		<p>Acanthaceae <i>Justicia breviflora</i> (Nees) Rusby (o quizá especies cercanas pero distintas)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22480 (lila con garganta blanca moteada) 74597 (blanco)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Sin uso reportado.</p>
			







		<p>Acanthaceae <i>Justicia carnea</i> Lindl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74180</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstajan waqne'</i></p> <p>Notas: Significa 'su cola zorra'. Se usa como cerca viva y ornamental vivo en los jardines.</p> <p>Véase <i>Justicia aurea</i>.</p>	
			<p>Acanthaceae <i>Justicia pectoralis</i> Jacq.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22377</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Sin uso reportado.</p>
		<p>Acanthaceae <i>Justicia spicigera</i> Schltld.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74014</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsi:s</i> Cuetzalan Náhuat: <i>mowih</i></p> <p>Notas: En Tzinacapan se reconocen dos tipos de <i>mowih</i>, uno cuyas hojas al dejarse remojar tiñen el agua de un color morado y otro que no tiñe. La primera es medicinal. En Zongozotla distinguen dos tipos de <i>tsi:s</i> pero solamente éste, <i>J. spicigera</i>, se emplea como remedio. Este tiñe el agua. Primero se machachan las hojas que luego se ponen a</p>	







			<p>remojar para dejar teñida el agua. Éste luego se usa para bañar bebés para prevenir enfermedades. Adultos pueden tomar el agua como té para contrarrestar las náuseas o el vómito.</p>
		<p>Acanthaceae <i>Justicia veracruzana</i> T.F. Daniel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74568</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka tsi:s</i></p> <p>Notas: Significa 'tsi:s grande'. No tiene uso. A pesar de diferencias notables entre esta especie y <i>J. spicigera</i> se relacionan por el mismo nombre, <i>tsi:s</i>.</p>
		<p>Acanthaceae <i>Odontonema callistachyum</i> (Schltdl. & Cham.) Kuntze</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21772</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kurux xanat</i></p> <p>Usos: Se usa solamene como cerca viva, tal como el <i>kstajan waqne'</i>.</p> <p>Náhuat de Cuetzalan: <i>te:nkwa:kwalaxo:chit</i> En Tzinacapan aparte de su uso como cerca viva, la savia que sale de los tallos tiernos se usa como cicatrizante para heridas y también se ocupa para cerca viva</p>








		<p>Acanthaceae <i>Ruellia blechum</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74629</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta y si tiene uso alguno.</p>	
			<p>Acanthaceae <i>Ruellia jussieuoides</i> Schlttdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74541</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Se maneja como ornamental en los jardines o patios caseros y también en los cafetales se dejan crecer.</p>
		<p>Acanthaceae <i>Ruellia</i> sp. 1 (pos. sp. novo)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21903</p> <p><i>Ruellia</i> sp. 1 (1282, 21903, 31275, 72111, 72230)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Sin uso. Aunque ningún asesor mencionó su uso como ornamental de jardín, quizá también tenga este uso como <i>R. jussieuoides</i>.</p>	

		<p>Acanthaceae <i>Spathacanthus hahnianus</i> Baill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21923</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Planta no reconocida por ningún asesor.</p>	
				
			<p>Acanthaceae <i>Stenostephanus haematodes</i> (Schltdl.) T.F. Daniel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22216, 74426</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido o <i>stonta:y</i></p> <p>Usos: Solamente un asesor de tres tuvo un nombre para esta planta: <i>stonta:y</i>. No sabía si tiene algún uso.</p> <p>Nahuat Zoquiapan <i>nakaspi:pilo:l</i></p>

		<p>Acanthaceae <i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21837, 74670</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Algunos asesores dijeron conocer un tipo de esta planta que crece sobre otras plantas herbáceas y que se emplea como ornamento vivo para jardines. Quizá se referían a <i>Thunbergia fragans</i> Roxb. que es parecido pero con flores blancas.</p>
<p>Actinidiaceae</p> <p>Actinidiaceae es una pequeña familia de árboles (y a veces arbustos) tres géneros. Solamente uno de estos tres se encuentra en América tropical: <i>Saurauia</i>. En el estado de Puebla se han documentado seis especies distintas. En el totonaco de Zongozotla se distinguen dos especies para el color de la nervadura de las hojas. Se distingue por hojas gruesas, rasposas y pubescentes, a veces con tinte grisáceo. Las flores se distinguen por sus anteras amarillas.</p>			
		<p>Actinidiaceae <i>Saurauia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21472, 74124</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnápapa aqalaman</i> (blanco <i>aqalaman</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>istawa:t</i> o <i>istawa:kowit</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro tiene nervadura y pubescencia roja. Éste tiene pubescencia verde.</p> <p>Usos: Las hojas de este, blanco, se aprovechan para envolver tamales, exclusivamente de frijol. Los frutos son comestibles ingiriéndose de manera directa. La madera se aprovecha como leña.</p>







		<p>Actinidiaceae <i>Saurauia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74191</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa tsatsoqo aqalaman</i> (el rojo <i>aqalaman</i>)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de hojas y peciolo verde. Este tiene pubescencia rojiza.</p> <p>Usos: Los frutos de este árbol son comestibles. Se aprovecha como combustible a manera de leña. No se usan las hojas para envolver tamales porque dejan un sabor amargo.</p>
		<p>Adoxaceae <i>Sambucus nigra</i> subsp. <i>canadensis</i> (L.) Bolli</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74053</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsilili'</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Nahuat <i>xo:me:t</i> o <i>xo:me:t kowitz</i></p> <p>Notas: Se reconocen dos tipos por el tamaño de las hojas. Él de hojas pequeñas se usa como medicinal, él de las hojas grandes no tiene valor medicinal sino solamente se utiliza como cerca viva.</p> <p>De la variedad medicinal, se aprovechan las hojas en forma de baño para bebés, con el único fin de prevenir enfermedades. Otros usos incluyen lavar el cabello con la misma agua de las hojas para fomentar el crecimiento del cabello. También, se utiliza para las náuseas: se machacan las hojas y se disuelven las hojas así machucadas en agua. Se toma en un vaso como agua al tiempo.</p>
			







		<p>Adoxaceae <i>Viburnum caudatum</i> Greenm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21708, 21785, 74080</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akski:t</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: Crece en montes conservados y en cafetales. Anteriormente, por la propiedad flexible y resistente que tiene el tallo y ramas de esta planta, se elaboraban cunas rústicas y huacales. Un asesor mencionó el uso de la madera para cabo de azadón.</p>
		<p>Adoxaceae <i>Viburnum microcarpum</i> Schltldl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21890</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor de Zongozotla tenía nombre para esta planta ni conocía un uso. Esta especie fue colectada también en el municipio de Zacapoaxtla pero tampoco se reportó ningún nombre ni uso.</p>
			

		<p>Alstroemeriaceae <i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74667</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtanchiwix mi:tsi'</i> (testículos de gato)</p> <p>Náhuat de Cuetzalan Sin nombre o <i>ta:lka:kampa:nah</i></p> <p>Notas: <i>Xtanchiwix mi:tsi'</i> se interpreta como gónadas de gato, <i>tanchiwix</i> gónadas y <i>mi:tsi'</i> gato (a). Se conoce solamente un tipo de esta planta. Crece a orilla de caminos, no presenta ningún uso.</p>	
		<p>Altingiaceae <i>Liquidambar styraciflua</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21827, 74120</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qo:ma'</i> (sin análisis)</p> <p>Náhuat de Cuetzalan <i>okotsokowit</i></p> <p>Usos: Este árbol es aprovechado como leña y como material para la construcción de casas rústicas, particularmente como caballete que va a lo largo por la parte superior donde se juntan las dos aguas del techo.</p>	
			<p>Amaranthaceae <i>Achyranthes aspera</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22323</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>xtata:stukut chuwlhá'</i></p> <p>Notas: Esta colecta se hizo en Atlequizayán pero con asesores de Zongozotla presente. Ellos no reconocían la planta pero el asesor de Atlequizayán, Venancio Rodríguez, comentó que crece en cafetales y no tiene uso. Nótese que la clasificó con los <i>xtata:stukut chuwlhá'</i> (véase nota introductoria con los <i>Iresine</i> spp.)</p>

Amaranthus spp.: *qalhtu:ni:t*





El término *qalhtu:ni:t* se aplica a dos grupos de *Amaranthus*. El primer grupo, que se divide en 'blanco' y 'rojo' según el color de las hojas, tallo e inflorescencia, es comestible y probablemente sean ambos variantes de *Amaranthus hybridus*. El segundo grupo es solamente de *Amaranthus spinosus*. No es comestible. En el náhuatl de Cuetzalan también se dividen los *Amaranthus* entre *wa:wkilit* (comestible) y *witswa:wkilit* (literalmente 'wa:wkilit espinoso'). Nótese que el nombre común del español es 'quintonil' quizá derivado del totonaco *qalhtu:ni:t*.








			<p>Amaranthaceae <i>Amaranthus</i> cf. <i>spinosus</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74111</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalhtakunila n qalhtu:ni:t</i> (espinoso <i>qalhtu:ni:t</i>)</p> <p><i>xalhtakunila n qalhtu:ni:t</i></p> <p>Cuetzalan Náhuatl <i>witswa:wkilit</i></p> <p>Notas: Hay 3 tipos de <i>qalhtu:ni:t</i> (<i>Amaranthus</i> spp.), este que es espinoso y otros dos que son comestibles y de tallos y hojas verdes y rojas y sin espinas. El de espinas no se come.</p>
			<p>Amaranthaceae <i>Amaranthus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74160</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa snapapa: qalhtu:ni:t</i> (el blanco <i>qalhtu:ni:t</i>)</p> <p>Notas: Comestible, de cual se aprovechan únicamente las hojas, primero se hierve agua mezclada con sal caliza y después se echan las hojas al agua hirviendo. Luego, se escurre y se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto. O también, se puede quedar en el primer paso de la preparación y servir en forma de caldo. El blanco es más preferido que el rojo (la que sigue) y se cosecha primero si hay los dos.</p>

			<p>Amaranthaceae <i>Amaranthus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74276</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo qalhtu:ni:t</i> (rojo <i>qalhtu:ni:t</i>)</p> <p>Náhuat de Cuetzalan <i>wa:wkilit</i></p> <p>Notas: Tiene el mismo uso (comestible) del anterior.</p>
			<p>Amaranthaceae <i>Celosia argentea</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22159</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>mi:tsi xanat</i> (flor de gato)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>pu:yo xanat</i></p> <p>Notas: En época de todos santos se cultiva junto con el pasma: <i>xanat</i> (<i>Gomphrena serrata</i> L.) como ornamental en los cultivos y se cortan para dejar de ornamental en el panteón. Según dicen en Zongozotla se llama <i>mi:tsi xanat</i> porque al crecer la inflorescencia agarra forma de la pata de un gato. En Atlequizayán el significado es de 'flor de pollo'. También en San Juan Tahitic (náhuat) se llama 'cresta de gallo'.</p>







			<p>Amaranthaceae <i>Chamissoa</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21771, 74419</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmantah paxni'</i> (su camote de puerco)</p> <p>Notas: Se hicieron dos colectas de Chamissoa. Una fue nombrada <i>xmantah paxni'</i> y el otro no tenía nombre. No se sabe todavía si son la misma especie. No se ha explorado si la colecta 74419, que fue nombrada <i>xmantah paxni'</i>, tiene camote. Aunque tuviera, no es comestible.</p>
			<p>Amaranthaceae <i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22088</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xcha:lukut chawalhá'</i> (su pie.hueso de guajolote)</p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>xtata:stukut chuwulhá'</i></p> <p>Notas: El término <i>xcha:lukut</i> se compone del posesivo <i>x-</i>, <i>lukut</i> 'hueso' y el elemento <i>cha:-</i> que hace referencia al pie o pierna (cf. <i>cha:spán</i>, 'pierna'). El Atlequizayán <i>tata:stukut</i> refiere a 'coyuntura de dos huesos' probablemente por la forma boluda de las coyunturas de la planta.</p> <p>Crece a orillas de camino. En Zongoztla no tiene uso. En Atlequizayán se usa como forraje para aves de corral, se hierve la planta y se mezcla con masa de maíz.</p> <p>Véase: <i>Iresine</i> sp.</p>
<i>lhqehni'</i>				
<p>El término <i>lhqehni'</i> se aplica tanto para el epazote (silvestre y cultivado) y la yerba buena (<i>Metha spicata</i> L., solamente cultivada). En cuanto al <i>lhqehni'</i> que es epazote hay tres tipos. Se conocen tres tipos de esta planta, que crece en sitios abiertos y perturbados. Los otros dos son de tallo verde y pubescente. Los tres tipos son <i>staqa lhqehni'</i> comestible como epazote verde-crudo, <i>xaspupuku staqa lhqehni'</i> (el epazote verde-crudo de color azul), que también es comestible. Y finalmente el <i>lhqehni ju:ki'</i> ('<i>lhqehni</i> venado') que es un Asteraceae (<i>Erechtites valerianifolia</i> (Link ex Wolf) Less. ex DC.) y no comestible. Nótese que <i>staqa</i> es 'verde' pero en el sentido de 'crudo' (<i>xtakni'</i>, 'verde [color]'). En Cuetzalan también distinguen un <i>epazote zorra</i>, que no ha sido colectado.</p>				







			<p>Amaranthaceae <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74121</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa spupuku staqa lhqehni'</i> (el azul verde.inmaduro epazote/hierba.buena)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>epaso:t</i></p> <p>Usos: Planta silvestre. Comestible, se utiliza como uno de los condimentos más codiciados para la elaboración de distintos platillos. Además, es medicinal, se utiliza en forma de té para tratar el dolor de estómago y como desparasitante (10 hojas/1 litro de agua).</p>
		<p>Amaranthaceae <i>Gomphrena serrata</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22483</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>munchulu tawan</i></p> <p>Nota: Es una <i>Gomphrena</i> silvestre, no cultivado. En Zongozotla no tiene ni nombre ni uso. Pero en Atlequizayán lo conocen como <i>munchulu tawan</i> ('arroyo hierba') aunque crece en cualquier sitio. No tiene tampoco uso en Atlequizayán</p>	








		<p>Amaranthaceae <i>Gomphrena serrata</i> L. Descripción:</p> <p>Colecta: 22132</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pasma: xanat</i> (olote flor)</p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>pasma: xanat</i></p> <p>Notas: Crece solamente como cultivado en campos de siembra. Se cultiva junto con el <i>mi:tsi xanat</i> (<i>Celosia argentea</i> L.). Se usa como ornamental en todos santos, llevándose al panteón.</p>
<p><i>xcha:lukut chawalhá'</i></p> <p>Este nombre se aplica en Zongozotla a la mayoría de los <i>Iresine</i> spp. colectadas aunque todavía no se ha determinado cuantas especies distintas representan. También usan este término para <i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq. En Atlequizayán se aplica un término cognado a <i>Dicliptera sumichrasti</i> Lindau (Acanthaceae) y otro Amaranthaceae de género distinto (colecta #22323, <i>Achyranthes</i> sp.). Su significado viene de <i>x-</i> (posesivo, 'su'), <i>lukut</i> ('hueso') y el elemento <i>cha:-</i> que significa pierna como en <i>cha:spán</i> ('pierna', de humanos y a veces de algunos animales). En cuanto a los <i>Iresine</i> conocidos como <i>xcha:lukut chawalhá'</i> hay varios tipos que se diferencian por el color de los tallos y hojas. Crecen todos en sitios abiertos y a orilla de caminos. No tienen uso. Nótese que hay un <i>Iresine</i> que se conoce como <i>tsatsoqo tawan</i> ('roja hierba'). En el náhuatl de Cuetzalan se conocen por lo menos algunos <i>Iresine</i> como <i>tankwa:olo</i> ('rótula de rodilla').</p>			
		<p>Amaranthaceae <i>Iresine</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21576, 22114</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xcha:lukut chawalhá'</i> (su pie.hueso de guajolote)</p> <p>Notas: Véase nota introductoria a <i>Iresine</i> spp.</p>







		<p>Amaranthaceae <i>Iresine</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74179</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xcha:lukut chawalhá'</i> (su pie.hueso de guajolote)</p> <p>Náhuat de Cuetzalan: <i>tank^wa:olo</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria a <i>Iresine</i> spp.</p>	
			<p>Amaranthaceae <i>Iresine</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74352</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xcha:lukut chawalhá'</i> (su pie.hueso de guajolote)</p> <p>Notas: Véase nota introductoria a <i>Iresine</i> spp.</p>
		<p>Amaranthaceae <i>Iresine</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74525 107422, 107430</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xcha:lukut chawalhá'</i> (su pie.hueso de guajolote)</p> <p>Notas: Véase nota introductoria a <i>Iresine</i> spp.</p>	

			<p>Amaranthaceae <i>Iresine</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74458</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsatsoqo tawan</i> (roja hierba)</p> <p>Notas: Medicinal, se aprovecha la planta completa hervida y luego usando el agua para bañar al afectado para controlar la fiebre y para el espanto provocado por eventos traumáticos.</p>
			<p>Amaryllidaceae <i>Zephyranthes</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21932, 74156</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xl:aqchaqan chu:n</i> o <i>ksipu:lax chu:n</i> (su.jabón zopilote o su.cebolla zopilote)</p> <p>Notas: Esta planta tiene dos nombres, ambos referentes al zopilote o buitres. Tiene uso medicinal. Uno es para lavar heridas: se hierve la planta y el jugo se aplica a la herida. O bien el bulbo se utiliza para tratar ronchas provocadas por hongos o por alguna infección. Se parte y se aplica directamente a la zona afectada.</p>
		<p>Anacardiaceae <i>Rhus terebinthifolia</i> Schltld. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21704, 74506</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tasani: miya:k</i> (<i>tasani:</i> bejuco)</p> <p>Notas: Solamente uno de los tres asesores tuvo un nombre para esta planta. No tiene uso. El significado de <i>tasani:</i> no queda claro.</p>	







			
		<p>Anacardiaceae <i>Tapirira mexicana</i> Marchand</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74151</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ásan</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>kakate</i> o <i>kakatekowit</i></p> <p>Usos: El fruto y las semillas de este árbol son comestibles. El fruto se ingiere de manera directa al madurar, las semillas se ponen a secar para después ser consumidas al quitar la testa como una almedra.</p>
		<p>Anacardiaceae <i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21898, 74241</p> <p>Creencia: En Zongozotla creen que para evitar que a uno le haga daño hay que convidar a la planta los que lleva. Se le dice a la planta "No me vayas a hacer daño y te convidó de mis tacos." Dejas un pedazo de taco al lado de la planta.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>taxa:k</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>ka:kits</i></p> <p>Notas: En Zongozotla el nombre <i>taxa:k</i> se aplica a <i>T. radicans</i> y también a dos <i>Cissus</i>: <i>C. microcarpa</i> (de inflorescencia roja) y <i>C. verticillata</i> (de inflorescencia verde crema). El <i>taxa:k</i> (<i>T. radicans</i>) es tóxico. EL látex provoca granos en la piel. No tiene uso beneficiosal</p>







		<p>Annonaceae <i>Annona cherimola</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21811, 74217</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akchít kiwi'</i> (<i>akchít</i> árbol) Cuetzalan Náhuat <i>kokay</i></p> <p>Notas: Se reconocen 2 tipos de <i>akchít</i>, un nombre genérico para las anonas o guayábanas. El otro <i>akchít</i> es de frutos más pequeños y se llama <i>xakchit kiwi' muxni'</i> ('su <i>akchít</i> de mono').</p> <p>Las dos formas son silvestres y el fruto de los dos se puede comer aunque se prefiere el de tamaño normal y el fruto del otro es más bien comido por los tejones.</p> <p>No se cultiva ni uno ni otro tipo.</p>
		<p>Annonaceae <i>Annona cherimola</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74249</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xakchít kiwi' muxni'</i> (su <i>akchít</i> de mono)</p> <p>Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se aprovecha solo como leña. Un asesor comentó que ha observado que los tejones se alimentan del fruto de esta planta. Quizá también otros animales se lo comen pero esto no se ha documentado.</p>
			








		<p>Annonaceae <i>Annona cherimola</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74402</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xakchít kiwi' muxni'</i> (su <i>akchít</i> de mono)</p> <p>Notas: Véase anterior.</p>
		<p>Annonaceae <i>Tridimeris hahniana</i> Baill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21925, 22292, 74583</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pa:stapu kiwi'</i> (riñón árbol)</p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores, Isac Pére, tuvo un nombre para esta planta. El nombre proviene de la forma del fruto (que mide como 10 cm.) que es como riñón. Se aprovecha sólo como leña.</p>
			







		<p>Apiaceae <i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague</p> <p>Colecta: 74051</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkula:ntoh chu:n</i> (cilantro zopilote)</p> <p>Notas: Se conoce solamente un tipo de esta planta, que crece en sitios rocosos y abiertos. Los asesores mencionan que tiene propiedades medicinales pero desconocen para que se utiliza. Nótese que en Cuetzalan el <i>Cyclanthera ribiflora</i> (Schltld.) Cogn. es <i>tsohp:ilo:kilit</i> (quelite de zopilote).</p>
		<p>Apiaceae <i>Eryngium foetidum</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74157, 74627</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhtaku:ni kula:ntoh</i> o <i>stranjero kula:ntoh</i> (espinoso cilantro o extranjero cilantro)</p> <p>Náhuat de Cuetzalan <i>witskola:ntoh</i></p> <p>Usos: Esta planta es utilizada como condimento, se amarran de cinco a siete hojas (enteras o bien molidas) y con ello se sazonan los frijoles de olla. Además, se amarran como cuatro hojas y se echan en caldo</p>
			








			<p>blanco de verduras, como papas y chayotes principalmente. Se amarran las hojas porque son espinosas y así amarradas se pueden sacar del caldo</p>
			<p>Apiaceae <i>Spananthe paniculata</i> Jacq.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21462, 22038, 74365, 107443</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi japat</i> (determinador pequeño <i>japat</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>kowa:tapi:ts</i></p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores dio un nombre para esta planta y lo clasificó como un tipo de <i>japat</i>, un término que designa un Asteraceae, <i>Schistocarpha bicolor</i> Less. El <i>xalak tsuwi japat</i> no tiene uso conocido.</p> <p>El nombre en náhuat, <i>kowa:tapi:ts</i> ('culebra.silbato') se aplica también a un Araceae, <i>Philodendron inaequilaterum</i> Liebm. (<i>sqat</i> en el totonaco de Zongozotla). Es interesante pero el mismo significado se aplica a <i>P. inaequilaterum</i> en el mixteco de Yoloxóchitl: <i>yu²ku¹ ka⁴na³ ko¹o⁴</i> ('hoja llama culebra').</p>








				<p>Apocynaceae <i>Asclepias curassavica</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21363, 21505, 74054</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmak^wa talhuy</i> (que.cura pinto)</p> <p>Cuetzalan Nahuat <i>po:pototsitsi:n</i></p> <p>Notas: Crece en zonas perturbadas, potreros y lugares húmedos. Es medicinal. El látex se utiliza para el tratamiento contra las ronchas provocado por hongos o el insolación. Se aplica 2 veces al día por lo menos 4 días consecutivos o, de preferencia, hasta que el daño desaparezca.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Blepharodon mucronatum</i>. (Schltdl.) Decne.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74086</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsiki:t miya:k</i> (leche.materna bejuco)</p> <p>Cuetzalan Náhuat M. Gorostiza: Sin nombre. La había visto en zonas calidas (200-300 m) donde la conocen como "watek" y se usa como remedio contra la picadura de serpientes.</p> <p>Nota: Antiguamente los frutos de esta planta se utilizaban como sonaja de juguete para los niños.</p>		
<p><i>maklhtaka:n</i></p>					
<p><i>Maklhtaka:n</i> se interpreta como de cuerpos filoso, proviene de las palabras <i>makne'</i> cuerpo y <i>lhtakak</i> filoso. Los asesores no estaban de acuerdo sobre cuantos tipos de este hay. Uno dijo que había dos y otro que había tres. Pero no distinguen en el nombre. Todos son bejuco que crecen sobre árboles y arbustos en zonas abiertas. El fruto de por lo menos uno es comestible, se desprende la corteza y se pone a hervir endulzando con azúcar al gusto.</p>					
<p>El nombre proviene de la forma del fruto de por lo menos una especie. Este fruto tiene filos que corren a lo largo del fruto. Un asesor lo equiparaba al casco de conquistador. Parece que el comestible, o el principal comestible, es <i>G. pectinatus</i>. Solamente <i>G. chloranthus</i> no fue incluido bajo la clasificación <i>maklhtaka:n</i> quizá por no tener fruto en el momento de colecta y ser menos común.</p>					

		<p>Apocynaceae <i>Gonolobus chloranthus</i> Schltld.</p> <p>Colecta: 21933</p>	<p>Totonaco Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor sabía un nombre ni un uso para esta planta.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Gonolobus fraternus</i> Schltld.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74123</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makhtaka:n</i> (de cuerpo filoso) Cuetzalan Náhuat</p> <p><i>po:poto</i></p> <p>Notas: El fruto de esta planta es comestible, se desprende la corteza y se pone a hervir endulzando con azúcar al gusto.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Gonolobus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74439</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makhtaka:n</i> (de cuerpo filoso)</p> <p>Notas: Durante esta colecta los asesores comentaron que hay 2 tipos de <i>makhtaka:n</i>, el otro es de frutos más grandes (doble de tamaño). Pero parece que hay por lo menos 3 especies.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>

		<p>Apocynaceae <i>Gonolobus cf. pectinatus</i> Brandegee</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74587</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makhtaka:n</i> (de cuerpo filoso)</p> <p>Notas: Durante esta colecta se comentó que hay 3 tipos de <i>makhtaka:n</i>, los otros dos son de tallo y hoja lisa, este es pubescente. Aunque durante la colecta se comentó que esta colecta (74587) no era comestible parece que este comentario se hizo por lo poco desarrollado del fruto. El comestible tiene filos en los frutos como este, que aparentemente es <i>G. pectinatus</i>.</p>	
		<p>Apocynaceae <i>Gonolobus xanthotrichus</i> Brandegee</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22358</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makhtaka:n</i></p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>maya:k</i></p> <p>Notas: Véase comentarios iniciales. Los asesores de Zongozotla comentaron que es comestible, el asesor de Atlequizayán que no era.</p>	
			<p>Apocynaceae <i>Mandevilla subsagittata</i> (Ruiz & Pav.) Woodson</p> <p>Colecta: 22002, 74089</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpaluwa tsi:ya'</i> (sus.tripas ratón)</p> <p>Notas: Aunque ninguno de los asesores tuvo un uso para esta planta la conocían por nombre, <i>xpaluwa tsi:ya'</i> que se le aplica por la forma de su fruto, que es como un ejote largo y delgado.</p>

			
		<p>Apocynaceae <i>Marsdenia propinqua</i> Hemsl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74320</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>uyu: miya:k</i> (<i>uyu: bejuco</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>wa:koh</i> (véase abajo)</p> <p>Nota: En Zongozotla los <i>uyu: miya:k</i> no se distinguen aunque refieren a dos especies científicas. El tallo se aprovecha como sustituto de laso. El nombre <i>wa:koh</i>, generalmente es <i>Mikania</i>. Quizá se aplicó a <i>Marsdenia</i> por equivocación. Mariano Gorostiz, de S. Miguel Tzinacapan agregó que ahí <i>wa:koh</i> es medicinal y se emplea para mordedura de serpientes.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Marsdenia zimapanica</i> Hemsl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22450</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>uyu: miya:k</i> (<i>uyu: bejuco</i>)</p> <p>Notas: Véase entrada anterior.</p> <p>Véase: <i>Prestonia mexicana</i>.</p>

		<p>Apocynaceae <i>Matelea lanceolata</i> (Decne.) Woodson</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21858</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ninguno de los tres <i>Matelea</i> tuvieron nombre ni uso, según asesores de Zongozotla. Solamente el #22364 fue colectada en Atlequizayán y tampoco el asesor de Atlequizayán presente en la colecta tuvo nombre ni uso para la planta.</p>	
			<p>Apocynaceae <i>Matelea nigrescens</i> (Schltdl.) Woodson</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22364</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase arriba.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Matelea velutina</i> (Schltdl.) Woodson</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21934</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase arriba.</p>	

		<p>Apocynaceae <i>Orthosia kunthii</i> Decne.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22207, 74427</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>miya:k</i></p> <p>Notas: Solamente un asesor de tres dio un nombre, miya:k ('bejuco') de por sí muy general y descriptivo, a esta planta. Nadie sabía de un uso para esta planta.</p>	
			<p>Apocynaceae <i>Orthosia</i> sp. novo</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21887</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor tuvo un nombre ni sabía un uso para esta planta.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Oxypetalum cordifolium</i> (Vent.) Schltr.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74496</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Un dijo que aunque no tenía un nombre para este bejuco conocía dos tipos de esta planta, que crece sobre las herbáceas y arbustos a orilla de caminos. El otro dijo que era de frutos con espinas. Podría ser que lo clasificaba con algunos Cucurbitaceae. Ninguno de los otros asesores tuvieron ni nombre ni uso para esta planta.</p>	

Plumeria rubra L. : *qalhwa:t xanat* y *tsi:la xanat*

El nombre genérico de *Plumeria rubra* es *qalhwa:t xanat*, literalmente 'huevo flor' aparentemente porque las flores en botón parecen a un huevo. Hay cuatro tipos de *Plumeria rubra*. El blanco, amarillo, y blanco con amarillo se nombran *qalhwa:t xanat* mientras que el rosita se llama *tsi:la xanat* (sin etymología obvia). Todos son silvestres y todos se ocupan en los jardines como ornamental. Abajo se presentan tres de los cuatro tipos, faltando el blanco con garganta amarilla. Este árbol se utiliza como cerca viva y simplemente (sin poner alambre ni travesaños) para marcar y delimitar parcelas y terrenos. Además, por las flores vistosas se mantiene vivo en parques y jardines.



Apocynaceae
Plumeria rubra L.

Descripción:

Colecta: 74131

Totonaco de Zongozotla
xasananka n qalhwa:t xanat
(amarillo huevo flor)

Cuetzalan Náhuat
Puede ser un tipo de
ka:ka:lo:xo:chit aunque no se
conoce bien la de flores amarillas.

Notas: Véase texto introductorio.










Apocynaceae
Plumeria rubra L.

Descripción:

Colecta: 74147

Totonaco de Zongozotla
xasnapapa: n qalhwa:t xanat
(flor de huevo blanco)
Cuetzalan Náhuat
ka:ka:lo:xo:chit

Notas: Véase texto introductorio.

		<p>Apocynaceae <i>Plumeria rubra</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21859, 74163</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsi:la xanat</i> (falta análisis) Cuetzalan Náhuat <i>ka:ka:lo:xo:chit</i></p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Prestonia mexicana</i> A. DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22271</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>uyu: miya:k</i></p> <p>Nota: Se clasifica como uyu: miya:k pero a diferencia de los <i>Marsdenia</i> a que se aplica el mismo nombre, este se emplea para huacales o cunas. No se usa para laso por tener el tallo más rígido que las otras.</p> <p>Véase: <i>Marsdenia</i> spp.</p>
			

walhtaqa:t

El término *walhtaqa:t* no parece tener significado fuera de su uso para designar a los *Tabernaemontana*. Aparentemente la especie prototípico es *Tabernaemontana litoralis* pero se ha extendido el uso a por lo menos otros dos especies del mismo género: *Tabernaemontana alba* Mill. y *Tabernaemontana donnell-smithii* Rose. Pero también puede ser que el término se aplica a todos los *Tabernaemontana* sin distinguir en la estructura interna de la categoría (con una especie más central que otras). El único uso que se ha reportado para las tres especies documentadas es para leña. Aunque pueden crecer grandes, p. ej., *T. litoralis*, no crecen rectas haciendo que no son muy aptas para madera de construcción de casas.



Apocynaceae
Tabernaemontana alba Mill.

Descripción:







Colecta: 22311

Totonaco de Zongozotla
walhtaqa:t

Totonaco Atlequizayán
walhtaqa:t

Notas: Véase nota introductoria.



		<p>Apocynaceae <i>Tabernaemontana donnell-smithii</i> Rose</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22154</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>walhtaqa:t</i></p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>walhtaqa:t</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
		<p>Apocynaceae <i>Tabernaemontana litoralis</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22321, 22451</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>walhtaqa:t</i></p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>walhtaqa:t</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
			

			<p>Apocynaceae <i>Vailia anomala</i> (Brandege) W.D. Stevens</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22001</p>	<p>Totonaco Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor tenía un nombre para esta planta.</p>
		<p>Aquifoliaceae <i>Ilex discolor</i> Hemsl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21889</p>	<p>Totonaco Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor tenía un nombre para <i>Ilex</i> de cualquier especie.</p>	
			<p>Aquifoliaceae <i>Ilex condensata</i> Turcz.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21901</p>	<p>Totonaco Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor tenía un nombre para <i>Ilex</i> de cualquier especie.</p>

		<p>Aquifoliaceae <i>Ilex tolucana</i> Hemsl. (sinón. <i>I. discolor</i> var. <i>tolucana</i> (Hemsl.) Edwin ex J.Linares)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22055</p>	<p>Totonaco Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Ningún asesor tenía un nombre para <i>Ilex</i> de cualquier especie.</p>
---	--	---	---

Araceae: *sqat* y otros términos







En las sierras nororiental y norte de Puebla, tanto en pueblos totonacos como nahuas, los Araceae se dividen en varios grupos básicos que corresponden a géneros distintos

- *Anthurium* spp. (generalmente *A. scandens* y, menos común, *A. pentaphyllum* var. *bombacifolium*)
- *Dieffenbachia oerstedii*
- *Monstera* spp.
- *Philodendron* spp.
 - *Philodendron inaequilaterum*
- *Syngonium* spp. (*S. neglectum* y *S. podophyllum*)
- *Xanthosoma* spp.

En Zongozotla *Anthurium scandens* recibe el nombre aplicado a muchas hierbas epífitas, un nombre que se traduce como 'hierba que posa' o algo parecido. *Anthurium pentaphyllum* var. *bombacifolium* recibe, sin lugar a duda, el nombre *cha:pis*, el término todos pueblos totonacos documentados hasta la fecha se asigna a los dos principales *Syngonium* regionales. Así que no hay un nombre específico para *Anthurium* en Zongozotla. En Zihuateutla y Ecatlán el nombre de *Anthurium scandens* incluye un término relacionado con el maíz: Zihuateutla: *ixta'qtza'q spu:n* (su.elote pájaro') y en Nanacatlan es *xtlaqtla spu:n* (su.elote pájaro); Ecatlán: *stran kú'xi'* ('transparente maíz'). Nótese que en Cuetzalan, en náhuatl, se llama *ma:sakatao:l*, 'maíz de *ma:saka'* (duende). *Dieffenbachia oerstedii* en Zongozotla se clasifica como un *sqat*, el término aplicado a *Philodendron* en general. Esta especie no ha sido colectada mucho pero en Patla (mpio. Jopala) se designa con un término específico, *helhpixi:x*, pero es posible que este término fue extendido a *D. oerstedii* ya que en el diccionario del totonaco de Upper Necaxa la planta nombrada *helhpixi:x* se describe como con flor blanca y tallo grueso. Ningún *Monstera* ha sido colectado en un pueblo totonaco meno uno por T. Croat pero sin asesor presente. Sin embargo, al ver una foto de *Monstera egregia*, O. López lo consideraba un *sqat* pero con un calificativo que describe la forma de las hojas: *xa lakalhukuni:la sqat* (el.que con.hoyo *sqat*) o *xa tsiliki sqat* (borde.picada *sqat*).

En cuanto a los *Philodendron*, todos los colectados en Zongozotla se conocen como *sqat*. En Ecatlán hay una sola colecta de este género, *Philodendron inequilaterum* Liebm., conocido como *sqe:t*, cognado del término de Zongozotla. En Chicontla-Patla hay tres colectas de *Philodendron*. Primero *P. radiatum* se conoce como tantá:j que también se aplica a *Monstera deliciosa*. Las hojas de ambas son parecidas y muy llamativas por ser tan cortadas. No es sorprendente que las dos se clasifican con el mismo nombre y que este nombre no es el nombre común para otros *Philodendron*. Otro *Philadendron* conocido en Chicontla-Patla es el *P. inaequilaterum*, nombrado *tzu'lhnú:t*. Finalmente, se colectó un *Philadendron* que fue nombrado *x'é'ti'* probablemente cognado con los términos *sqat* y *sqe:t*, de Zongozotla y Ecatlán, respectivamente.

Finalmente están los *Xanthosoma*. ...







			<p>Araceae <i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G. Don.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chawaná: paxni kak</i> (que.da.escocés marrano quelite) <i>xli:kuchan sakah</i> (su.veneno tuza)</p>
			<p>Araceae <i>Anthurium pentaphyllum</i> var. <i>bombacifolium</i> (Schott) Madison</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:pis</i></p>
<p>Descripción:</p>	<p>Totonaco Atlequizayán <i>cha:pis</i></p>			
<p>Colecta: 22469, 22486, 22504</p>	<p>Notas:</p>			

Notas: En la entrevista que se hizo con esta colecta se consideraba a la Alocasia como parte del grupo de Xanthosoma y se comentó que hay 5 tipos que se diferencia por el color y tamaño de las hojas.

Bricilia López Cano dijo que conoce a esta planta como *xli:kuchan sakah* por el uso que se le da de envenenar las tuzas. Se corta su camote en trozos que se colocan frente a las madrigueras. Se muere la tuza al comérselo.

También se aprovecha la Alocasia como ornamento vivo para parques y jardines.

Nota: M. Gorostiza agregó que las hojas tiernas se hierven, con el propósito de alimentar crías de pavo.

			
		<p>Araceae <i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.</p> <p>Colecta: 21479, 21520, 74635</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maq̄tawalhá: tawan</i></p> <p>Notas: <i>Maq̄tawala: tawan</i> significa hierba que posa, proviene de las palabras <i>maq̄tawala'</i> que posa, que se aloja y <i>tawa:n</i> hoja o hierba. Conocen un tipo de esta planta, aunque existen muchas más que reciben el mismo nombre, por lo regular casi todas son plantas parásitas. Crece sobre árboles en sitios bajo sombra, no presenta ningún uso.</p> <p>Es interesante que en Zongozotla no se conoce esta planta por un nombre específico sino solamente por una designación genérica. Se puede comparar con el nombre de otros pueblos donde el nombre relaciona la planta con el maíz o elote:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zihuateutla: <i>ixta'qtza'q spu:n</i> (su.elote pájaro'); • Nanacatlan es <i>xtlaqtla spu:n</i> (su.elote pájaro); • Ecatlán: <i>stran kú'xi'</i> ('transparente maíz'). • Cuetzalan, en náhuat, se llama <i>ma:sakatao:l</i>, 'maíz de <i>ma:saka'</i> (duende).
			







		<p>Araceae <i>Arisaema macrospatum</i> Benth.</p> <p>Colecta: 21716, 74605</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Conocen un solo tipo de esta planta que crece en suelos húmedos bajo sombra, no presenta ningún uso.</p>
		<p>Araceae <i>Dieffenbachia oerstedii</i> Schott</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22494</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>sqati'</i></p> <p>Notas: Se conoce como un <i>sqat</i> y se le da el mismo uso como ornamental vivo en los jardines caseros como la mayoría de los Araceae.</p>
		<p>Araceae <i>Monstera acuminata</i> K. Koch (colecta de Cuetzalan del Progreso)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: T. Croat 107406 (es una <i>Monstera</i> pero no ha sido identificado ni hubo asesores presentes que dieran información)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa lakalhukuni:la sqat</i> o <i>xa tsiliki sqat</i> (el.que con.hoyo <i>sqat</i> o borde.picada <i>sqat</i>)</p> <p>Notas: Se usa cortada y transplatada a los jardines caseros como ornamental. Se distingue de los <i>Philodendron</i> por el calificativo que lo describe como <i>Philodendron</i> con agujero o <i>Philodendron</i> con el borde ondulado o picado.</p>



Photo a la izquierda de *Monstera egregia* Schott (Cuetzalan del Progreso)








Araceae:
Monstera deliciosa Liebm.








No colectada en Zongozotla
(fotos de Cuetzalan, cols. 2801,
21131)






Descripción:







Totonaco de Zongozotla
xa lakalhukuni: la *sqat* o
xa tsiliki sqat
(el. que con. hoyo *sqat* o
borde. picada *sqat*)









Notas: Al ver una foto de esta especie Isác Pérez Núñez lo identificó como *xa lakalhukuni*: la *sqat* aunque Osbel López comentó que probablemente le queda también el nombre de *xa tsiliki sqat*. Tiene el mismo uso ornamental que otros Araceae.





				
<p><i>Philodendron : sqat</i></p>				
<p>En la Sierra Nororiental y Norte han sido colectadas las siguientes <i>Philodendron</i>: <i>P. advena</i>, <i>P. hederaceum</i>, <i>P. inaequilaterum</i>, <i>P. radiatum</i>, <i>P. sagittifolium</i> y <i>P. smithii</i>. Ningún asesor conocía el uso de un <i>Philodendron</i> como silbata. Se mencionó que hay un <i>Catopsis</i> (Bromeliaceae) cuya hoja se usa para producir un sonido de silbato. Se corta y se dobla la hoja y se empuja el aire sobre la hoja así doblada. En cuanto al uso de las hojas de un <i>Philodendron</i> para envolver carne, al examinar las fotos Isac Pérez comentó que era <i>P. sagittifolium</i> (que tiene las hojas más grandes y alargadas que las demás) que tenía tal uso. En cuanto a la función de adorno en las fiestas escolares y en las bodas, por las fotos identificaron a <i>P. seguine</i> con tal función. Nótese que en Cuetzalan este uso es de <i>P. hederaceum</i>. Ninguna planta es comestible, ni hojas ni frutos.</p>				
			<p>Araceae <i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22470</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Náhuatl Zoquiapan <i>ta:ixikilit</i></p> <p>Náhuatl de Cuetzalan <i>tepe:xo:chima:it</i></p> <p>Notas: Se usa como adorno y para envolver a itacates que se llevan al campo. Véase nota introductoria.</p>

				
			<p>Araceae <i>Philodendron inaequilaterum</i> Liebm. Descripción:</p> <p>Colecta: 22501</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Náhuatl Zoquiapan <i>ta:lxikilit</i></p> <p>Náhuatl de Cuetzalan <i>kowa:tapi:ts</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
			<p>Araceae: <i>Philodendron radiatum</i> Schott</p> <p>No colectado.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa tsiliki sqat</i></p> <p>Notas: Fue reconocido por foto por Isác Pérez Núñez con el nombre <i>xa tsiliki sqat</i>. Se usa la planta como ornamental en los jardines caseros.</p>

		<p>Araceae <i>Philodendron sagittifolium</i> Liebm.)</p> <p>Colecta: 107408 (fotos de colectas en Cuetzalan:</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
			
		<p>Araceae <i>Philodendron seguine</i> Schott</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2847</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Notas: Se usa para ornamental colgado en ceremonias y fiesta. También se emplea como ornamental de los jardines. Para eso se lleva vivo y se siembra en los jardines de las casas. Véase nota introductoria.</p>

			<p>Araceae <i>Philodendron</i> sp. (cf. <i>Philodendron advena</i> Schott o <i>Philodendron sagittifolium</i> Liebm.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2848</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Notas: Se usa para envolver a los tacos que se llevan al campo. También véase nota introductoria.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Araceae <i>Philodendron</i> sp.</p> <p>Colecta: 107405</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqat</i></p> <p>Notas: No hubo asesor presente en esta colecta.</p>
			<p>Araceae <i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> Schott</p> <p>Colecta: 74654</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>

			<p>Araceae <i>Syngonium neglectum</i> Schott</p> <p>Descripción: Inflorescencias generalmente 1 pero a veces 2 o 3; 20–40 cm de largo con espádice 6-9 cm de largo y 5-7 cm diámetro</p> <p>Colecta: 74199, 107407</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:pis</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>aha:wit</i> o <i>aha:wit</i>, <i>yahya:wit</i>, <i>yahya:wit</i> (< <i>ta:lchawis</i>)</p> <p>Notas: El fruto de esta planta es comestible al madurar. Se come crudo el espádice. Cuando está madura, adquiriendo un tono rojizo, se abre y se come es espádice (como elotito) interior, sin cocer.</p>
		<p>Araceae <i>Syngonium podophyllum</i> Schott</p> <p>Descripción: Inflorescencias de 4 a 11, menos de 9 cm de largo al empezar hasta 13 cm con fruto; espádice de 4 a 7 cm de largo, 1.5 a 3 cm diámetro; hojas algo delgadas.</p> <p>Cols. Croat 107407 (sin foto ni asesor presente; fotos de #1443 de Cuetzalan)</p>	<p>En Zongozotla se distinguen dos tipos de <i>cha:pis</i>, uno de frutos amarillos y otros de frutos rojizos. Aparentemente esta distinción no corresponde a la distinción entre <i>S. neglectum</i> y <i>S. podophyllum</i>.</p> <p>Nota: M. Gorostiza agrega que en Tzinacapan anteriormente se consumían los frutos de esta planta al madurar.</p>	
			<p>Araceae <i>Xanthosoma robustum</i> Schott</p> <p>Colecta: 74595</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa kilhchawaná: paxni kak</i> (el. que da.escocés.boca marrano quelite)</p> <p>Notas: Proviene de <i>kilhni'</i> boca, <i>chawana'</i> que pica o provoca comezón, <i>paxni'</i> puerco, cerdo y <i>kak</i> quelite o planta comestible. Crece entre los cafetales, no presenta ningún uso. No se come.</p>

				<p>Araceae <i>Xanthosoma violaceum</i> Schott</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74519</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paxni kak kuxi: pisi:s</i> (marrano quelite maíz <i>pisi:s</i>) Cuetzalan Náhuat metsonkilit</p> <p>Nota: Comestible, se comienza quitando y guardando la parte suave o carnosa de la hoja entre todas las nervaduras. Luego se tira la hoja ya de puras venas. Posteriormente las secciones de las hojas quitadas se hierven en una olla de barro; una vez cocidas se termina de sazonar el caldo con cacahuete molido, hojas de aguacate (estas pueden ser enteras o molidas) y hojas de <i>Arthrostemma primaevum</i> (Con nombre en totonaco <i>xkutni' tawan</i>).</p>
<p>Falta coleccionar y fotografíar</p>				<p>Araceae <i>Xanthosoma</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Falta coleccionar. Quizá sea <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paxni kak loq</i> (marrano quelite <i>loq</i>)</p> <p>Nota: Es comestible pero toda la hoja es verde, como el que da comezón. Según Osbel López las hojas del comestible son más grandes que las hojas del <i>xakilhchawaná: paxni kak</i>. No se ha fijado en otra diferencia.</p>

Araliaceae: *Dendropanax arboreus* y *Oreopanax* spp.

La familia Araliaceae se representa en Zongozotla por 2 géneros (*Dendropanax* y *Oreopanax*) y cuatro especies

- *Dendropanax arboreus* (L.) Decne. & Planch.
- *Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch.
- *Oreopanax echinops* (Schltdl. & Cham.) Decne. & Planch.
- *Oreopanax xalapensis* (Kunth) Decne. & Planch.

Estos dos géneros se pueden distinguir fácilmente por sus hojas y flores. *Dendropanax* tiene hojas glabras, simples y con márgenes enteras; hojas juveniles a veces son 3-lobadas. Las hojas de *Oreopanax* tienen la superficie (indumento) con pelos estrellados o con escamas. Son poligamodiocas: algunas plantas tienen flores bisexuales y masculinas y otras plantas tienen flores bisexuales y femeninas.

Los tres *Oreopanax* documentadas en la región son también fáciles de distinguir. *O. capitatus*, a menudo hemiepífeto, tiene las hojas simples y enteras, con largos pecíolos. *O. echinops* y *O. xalapensis* tienen hojas compuestas palmadas con diferencias en número, tamaño e indumento. También, como se ven por las fotos, se distinguen claramente por sus flores y frutos.

O. echinops

- pecíolos de hasta más de 60 cm.
- 3 a 7 folíolos sésiles
- indumento de pelos largos estrellados y rojizos
- folíolos más grandes

O. xalapensis

- pecíolos de hasta 35 cm.
- 5 a 10 folíolos peciolulados
- indumento principalmente escamoso
- folíolos más pequeños

En Zongozotla utilizan un término, *kapa'*, cuyo uso se limita a designar al *Dendropanax arboreus* (L.) Decne. & Planch. Un cognado, *ká'pa'* se emplea en Chicontla/Patla para el mismo árbol (Beck 2011:173) aunque aparentemente se emplea otro término, *li:ma:sta'hé:n*, para el miso (Amith col. #70107; cf. Beck 2011:302). Los *Oreopanax* reciben otros nombres en Zongozotla. El nombre para *O. capitatus* refleja su hábitat de epífeto ya que su nombre, *maq̄tawala: kiwi'* (árbol que posa), claramente refleja este tipo de planta. El mismo nombre se aplica a los Loranaceae y Santalaceae, por ejemplo. Los otros dos *Oreopanax* reciben el nombre de *xkuxi la:qa'* (su.maíz quetzal.bird) en referencia clara a los frutos. En Zongozotla se agrupan dos *Oreopanax* (*O. echinops* y *O. xalapensis*) bajo este nombre.

En náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla hay un solo término para los Araliaceae: *tamalkowit* (tamal.árbol). En Zoquiapan y Cuauhtemoc este término se aplica a *D. arboreus*. Pero los de San Miguel Tzinacapan solamente dicen que el *D. arboreus* se parece al *tamalkowit*, un término que utilizan para *O. capitatus*. No hay una clara explicación del porqué de este nombre. En otros pueblos nahuas se utilizan nombres distintos para varias Araliaceae. Esta discusión se presentará en la guía de Cuetzalan (náhuatl).

En Veracruz el nombre *tamalkowit* es reportado para *Dendropanax arboreus* y *Oreopanax xalapensis* [6]. Además hay documentación que varias especies de este género se usa para envolver tamales [7]. *O. echinops* se usa así en la región de Las Tuxtlas, Sierra de Zongolica y Veracruz central. En esta última región se ha notado el mismo uso de *O. capitatus* y de *O. flaccidus* Marchal. En Chiapas hay también reportes del uso de *Oreopanax* spp. para envolver tamales. Breedlove y Laughlin menciona un grupo de árboles llamados *jabnal te'* (hoja árbol) que incluye *O. peltatus* y *O. xalapensis*. Del primero escriben que sus hojas se utilizaban para envolver tamales de frijol en bodas y otras ocasiones ceremoniales. *O. peltatus* Linden ex Regel y quizá *O. liebmanni* Marchal. *O. peltatus* también se usa para tamales de frijol, probablemente en Jalisco [8, p. 70].

Aunque hay evidencia amplia del uso de las hojas de varias especies de *Oreopanax* para envolver tamales (de Chiapas, Veracruz y Jalisco), un uso que claramente es el origen del nombre en náhuatl(l), no se ha observado ningún uso para envolver tamales en pueblos nahuas o totonacos de las sierras Norte y Nororiental de Puebla. El nombre de 'tamal árbol' sin embargo, se mantiene para varios árboles de la familia Araliaceae.



Araliaceae

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

Descripción: Árbol de 15 o más metros con amplia distribución neotropical. Hojas alternas, brillantes, gruesas, sin pelos y con la base redonda; a veces con 3 lóbulos cuando jóvenes. Flores (julio a septiembre) verdosos (< 3 mm); salen en grupos sostenidos por un eje y asemejan a sombrillas. Frutos (octubre a diciembre) son drupas (4–7 mm de largo) que cambian de verde a morado al madurar y con surcos una vez que se seca. Los peciolos son distintivos: las hojas terminales de una rama los tienen cortos pero las hojas inmediatamente abajo los tienen muy largos.



Totonaco de Zongozotla

kapa'
(sin análisis)

Tepehua de Pisaflores

k'áppá

Cuetzalan Náhuatl

Cercano al *tamalkowit* que se aplica a *Oreopanax capitatus*

Náhuatl Zoquiapan y







Cuahtemoc





tamalkowit

Notas: Se aprovecha únicamente como leña. Un asesor reconoció esta especie cuando tenía fruto (2 veces) pero no cuando tenía solamente flor (2 veces). Osbel López había comentado (antes de ver este dato) que era más fácil identificar al *kapa'* cuando estaba con fruto que con flor.

La única otra colecta de *D. arboreus* en un pueblo totonaco fue en Chicontla donde se llama *li:ma:sta'hé:n*, un instrumen que hace referencia a su uso. Las ramas con flores (colectadas por los fiscales) se empotran a lo largo del camino donde pasa la procesión de la semana santa.

En Zoquiapan y Cuahtemoc (mpio. Ayotoxco), *D. arboreus* se llama *tamalkowit*. En Cuetzalan varios asesores indicaron que *D. arboreus* parece al *tamalkowit* (un nombre que aplican a *Oreopanax capitatus*) pero que no es. Flora de Veracruz (Fasc. 8, p. 7) da *tamalkowit* como el nombre de *D. arboreus*. y *Oreopanax xalapensis*.

		<p>Araliaceae <i>Hydrocotyle</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22371</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco Atlequizayán <i>skup tama:n</i></p> <p>Notas: Colecta de Atlequizayán con asistencia de asesores de Zongozotl quienes no conocían esta planta, pero el asesor de Atlequizayán, Venancio Rodríguez, sí. La palabra <i>tama:n</i> significa postrado en el suelo (sea lo que sea) y <i>skup</i> indica algo como 'totalmente'. Según Osbel López se llama así porque es una planta acuática que cubre totalmente la superficie del agua.</p>
		<p>Araliaceae <i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne & Planch</p> <p>Descripción: Árbol, raramente arbusto, ocasionalmente hemiepífito, hasta 15 m; distribución desde las costas de Brasil y Perú hasta México oriental (Veracruz). Hojas en verticilo por las puntas de las ramas, simples, enteras, en forma de huevo a elípticas, con 3 a 5 nervios en la base; las de mayor tamaño notablemente onduladas. Flores (principalmente junio a septiembre) diminutas agrupadas en cabezuelas, dispuestas en una panícula de hasta 23 cm de largo; cáliz amarillento, corola blanquecina de hasta 2.5 mm de largo. Frutos (julio a octubre) globosos, blancos a amarillentos, de 3 a 5 mm de diámetro. Llamativo por los peciolos de las hojas de 5–25 cm.</p> <p>Colecta: 21806, 74293</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maq̄tawala: kiwi'</i> (árbol que posa)</p> <p>Náhuatl de Cuetzalan <i>tamalkowit</i></p> <p>Notas: <i>Maq̄tawala kiwi'</i> significa árbol que posa, proviene de las palabras <i>maq̄tawala'</i> ('que posa' o 'que se aloja') y <i>kiwi'</i> ('árbol'). Conocen un tipo de este árbol, aunque existen muchas más plantas epífitas que reciben el mismo nombre. Por lo regular todas son plantas parásitas. El <i>O. capitatus</i> crece parasitando árboles en el monte conservado para luego, al madurar, echar raíces hacia y dentro de la tierra. Se emplea sólo para leña.</p>
			

		<p>Araliaceae <i>Oreopanax echinops</i> (Schltdl. & Cham.) Decne. & Planch.</p> <p>Descripción: Presente en bosques de niebla, encinares y pinares húmedos (1000–2750 m) desde el centro de México (ambas costas) hasta el norte de Panamá. Árbol o arbusto hasta 10 m de alto. Presenta superficie de pelos largos estrellados y rojizos. Hojas palmadas (hojas juveniles simples) con pecíolos de hasta más de 60 cm. y con 3 a 7 folíolos sésiles. Flores agrupadas en cabezuelas de subglobosas a cónicas, dispuestas a su vez en un racimo robusto. Cáliz y corola diminutos, verdosos. Infrutescencia rojiza, cabezuelas hasta de 5 cm de ancho, con frutos ovoides de 1 cm de largo con los estilos aún presentes.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkuxi la:qa'</i> (su.maíz quetzal)</p> <p>Notas: Unos asesores dijeron que había dos tipos, uno de frutos rojos (éste) y el otro de frutos verdes. Pero bien puede ser que la referencia era a la diferencia entre <i>O. echinops</i> y, el más pequeño, <i>O. xalapensis</i>. Ninguno de los dos tiene uso. La madera es blanda.</p> <p>Colecta: 21635, 74457</p>
		<p>Araliaceae <i>Oreopanax xalapensis</i> (Kunth) Decne. & Planch.</p> <p>Descripción: Se distribuye entre los 800 a 3300 m desde el centro de México (ambas costas) hasta el norte de Panamá. Árbol o arbusto de hasta 20 m aunque generalmente no rebasa los 12 en esta área. Hojas compuestas, palmadas con pecíolos de hasta 35 cm. y con 5 a 10 folíolos peciolulados. Superficie de las hojas principalmente escamosa. Las flores se agrupan en cabezuelas que a su</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi xkuxi la:qa'</i> (los.que pequeños su.maíz quetzal)</p> <p>Notas: Este es el segundo tipo de <i>xkuxi la:qa'</i>, el más pequeño. No tiene uso. Aparentemente el comentario que es más pequeño se basa en el tamaño de los folíolos y no lo alto del árbol. <i>O. echinops</i> llega a 10 m, y <i>O. xalapensis</i> hasta 20 m. Sin embargo los folíolos de <i>O. echinops</i> son generalmente más grandes que los de <i>O. xalapensis</i>.</p>



vez conforman racimos robustos de hasta 40 cm de largo y hasta 100 cabezuelas en la inflorescencia estaminada (de flores masculinas). Cáliz y corola diminutos, pétalos blanquecinos. Fruto elipsoide de color violáceo en la madurez.

Colecta: 21736, 22251, 74448

Chamaedorea : *li:htampah*

En todos los pueblos en que se ha documentado *Chamaedorea* los nombres son cognados con la posible excepción de una colecta de Zihuateutla para que un asesor de Patla, presente en la colecta, le dio el nombre de *litsnpa'*. En mismo asesor en una colecta de su propio pueblo pero de otra especie de *Chamaedorea*, le dio el nombre de *li:tampáj* (el mismo nombre que se documentó por un asesor de Chicontla). Otros nombres cognados son *li:htampa:n* (Mecatlán) y *le'tumpaj* (Tepetzintla de Galeana).

A diferencia de la categorización de Ernesto Vázquez de San Miguel Tzinacapan (véase la guía de Cuetzalan) quien distingue claramente 4 tipos de *Chamaedorea*, los de Zongozotla aparentemente no distinguen mucho entre los varios tipos de este género aunque designan a uno como 'el amarillo' (cf. *Chamaedorea* cf. *pinnatifrons* (Jacq.) Oerst).

La importancia de todas las especies de *Chamaedorea* es de su importancia ornamental. Las hojas se emplean como ornato en eventos y ceremonias culturales y religiosas, como alfombras para altares, mesas donde se ponen ofrendas o convidan a gente principal y alrededor de los santos en fiestas religiosas.

En cuanto a las especies documentadas en este estudio de Zongozotla y otros estudios florísticos en la Sierra Nororiental de Puebla se ha establecido que hay 3 *Chamaedorea* que dominan el inventario que se ha colectado:

- *Chamaedorea oblongata* Mart.
- *Chamaedorea pinnatifrons* (Jacq.) Oerst
- *Chamaedorea schiedeana* Mart.







Pero también se han colectado otras especies, aparentemente todas de menor abundancia en la región:

- * *Chamaedorea microspadix* Burret
- * *Chamaedorea nubium* Standl. & Steyerm.
- *Chamaedorea oreophila* Mart.
- * *Chamaedorea queroana* Hodel









Todas estas especies han sido colectadas en el municipio de Zongozotla menos *C. oblongata* (que es relativamente común y sin lugar a duda también se encuentra en el municipio; se ha colectado en los municipios de Atlequiza'yán, junto a Zongozotla, y Cuetzalan del Progreso) y *C. microspadix* que solamente ha sido colectado en Zacapoaxtla. Entre los asesores de Zongozotla aunque saben que hay diferencias entre los *li:htampah* al preguntarse sobre las diferencias no tienen una clara descripción. El único asesor que parece distinguir bien tanto lexicalmente como en su descripción es Ernesto Vázquez Chanico de San Miguel Tzinacapan (véase la guía de Cuetzalan del Progreso).

* Indica que es un nuevo registro para el estado de Puebla.

		<p>Areceaceae <i>Chamaedorea nubium</i> Standl. & Steyerl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21733</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lhtampah</i></p> <p>Notas : Véase discusión introductoria.</p>
		<p>Areceaceae <i>Chamaedorea oblongata</i> Mart.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22121</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lhtampah</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>li:lhtampah</i></p> <p>Notas : Véase discusión introductoria.</p>
		<p>Areceaceae <i>Chamaedorea oreophila</i> Mart. (hembra, pistilada)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21804, 21805</p> <p>21804</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lhtampah</i> (falta analizar)</p> <p>Notas : Véase discusión introductoria.</p>

		21805	
		<p>Arecaceae <i>Chamaedorea oreophila</i> Mart. (macho, estaminado)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21928</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lhtampah</i> (falta analizar)</p> <p>Notas : Véase discusión introductoria.</p>
		<p>Arecaceae <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> (Jacq.) Oerst</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21463, 22030, 74221</p> <p>Foto de 21463</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa sananka li:lhtampah</i> (el.que amarillo <i>li:lhtampah</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>tepe:xi:lo:t</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no enumerados.</p> <p>Usos: Las hojas se aprovechan como ornato para ceremonias sociales, además los frutos se aprovechan para rellenar sonajas y para recreación.</p>

		22030	
		74221	
		<p>Areceaceae <i>Chamaedorea queroana</i> Hodel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74292</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lhtampah</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido.</p> <p>Notas : Véase discusión introductoria.</p>






			<p>Areaceae <i>Chamaedorea schiedeana</i> Mart.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74250</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lhtampah</i> (falta analizar)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>tepe:xi:lo:t</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos que se distinguen por el tamaño y color del fruto.</p> <p>Usos: Las hojas y planta se utilizan como ornamento para eventos y ceremonias sociales</p>
		<p>Areaceae <i>Bactris mexicana</i> Liebm. ex Mart.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: No fue colectada.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>moqo:t</i></p> <p>Notas: Aunque no fue colectado en presencia de un asesor de Zongozotla, parece que forma parte del grupo llamado <i>moqo:t</i>. Como el otro <i>moqo:t</i>, <i>Syagrus romanzoffiana</i>, es más común en tierras bajas y no se encuentra en Zongozotla.</p>	
			<p>Areaceae <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassma</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22439</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>moqo:t</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>pa:lmah koyole:rah</i></p> <p>Náhuat de Cuetzalan <i>kowxiwit</i></p> <p>Notas: Se colectó en Zoquiapan con dos asesores de Zongozotla: Osbel López y su papá Sebastián López. Ninguno dio un uso para esta palma, que crece más en zonas bajas y cálidas. Osbel López dijo conocer dos tipos de</p>







			<p><i>moqo:t</i> y su papá dijo conocer a tres (quizá incluía a <i>Cocos nucifera</i> L. o <i>Sabal mexicana</i> Mart.). Según Osbel López las dos palmas más conocidas son <i>S. romanzoffiana</i> y <i>Bactris mexicana</i> Mart. que se encuentran en municipios circunvecinos de terrenos más bajos como Zapotitlán de Méndez y Xochitlán.</p>
		<p>Aristolochiaceae <i>Aristolochia</i> cf. <i>variifolia</i> Duch. (sinónimo <i>Aristolochia purpusii</i> Brandegee)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tlantaná: tawan (laka tsamá:t)</i> (pateador hierba [cara de muchacha])</p> <p>Notas: Es medicinal, se utiliza como remedio cuando una persona recibe una patada de otra del sexo contrario. Se machaca la planta y luego triturada la planta se pone en agua y se deja reposar por una noche. La paciente se toma el extracto reposado en ayunas.</p> <p>Esta colecta fue de 'cara de muchacha', esto es, para aliviar a una mujer que ha recibido una patada de un hombre. Hay otra planta que recibe el mismo nombre; véase <i>Calceolaria mexicana</i> y las notas introductorias.</p>

Colecta: 74677








				<p>Asparagaceae <i>Agave</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21567</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido</p> <p>Nota: Ningún asesor tuvo un nombre en este momento, para esta colecta de Zongozotla. Aunque uno dijo que tiene uso ornamental parece que no se acostumbra usarlo así.</p>
		<p>Asparagaceae <i>Agave</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74508</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>su:ya:t</i> (falta analizar)</p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores de Zongozotla presentes tuvo un nombre para esta planta. Este asesor, Isac Pérez Núñez, comentó que hay 2 tipos, que crecen en paredes rocosas. Esta colecta es del tipo verde, el otro es de hojas grisáceas.</p> <p>Antiguamente, se extraía fibra para elaborar lasos de las hojas de esta planta.</p> <p>Nota que <i>su:ya:t</i> no tiene interpretación. Quizá sea una coincidencia pero la palabra totonaca se parece a <i>so:ya:t</i>, un término del náhuatl de Guerrero para palma.</p>		






		<p>Asparagaceae <i>Beschorneria yuccoides</i> K.Koch</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21891</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Esta planta, colectada en terrenos de Zongozotla, no fue reconocida por ningún asesor de Zongozotla. Crece en tierras altas; en este caso arriba de 2,000 metros.</p>
		<p>Asparagaceae <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.</p> <p>Colecta: 21803, 22028, 74077</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:pa:lhkan</i> (lindero)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>i:sawatsitsi:n</i></p> <p>Notas: Se utiliza como una guía para delimitar terrenos y parcelas. El nombre mismo de la planta significa 'lindero' o bien algo que se utiliza para dividir terrenos en el campo..</p>
			









		22028	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo li:pa:lhkan</i> (rojo lindero)</p> <p>Usos: Se utiliza como una guía para delimitar terrenos.</p>	
			<p>Asparagaceae <i>Echeandia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74274</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:qalhxeqne k" a:yoh</i> (su.silbato caballo)</p> <p>Usos: Sin uso. Aunque tiene un nombre que significa 'silbato/trompeta de caballo' no se utiliza para producir ningún sonido.</p>
				










			<p>Asparagaceae <i>Echeandia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21353</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:qalhxpqne k^wa:yoh</i> (su.silbato caballo)</p> <p>Notas: Véase anterior.</p>
			<p>Asparagaceae <i>Echeandia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22029</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:qalhxpqne k^wa:yoh</i> (su.silbato caballo)</p> <p>Notas: Véase anterior.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Asparagaceae <i>Echeandia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107423</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:qalhxpqne k^wa:yoh</i> (su.silbato caballo)</p> <p>Notas: Véase anterior.</p>










			<p>Asparagaceae <i>Manfreda</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22046</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene ni nombre ni uso local.</p>
<p>La leyenda del Akalukut</p> <p>“Hace muchos años, cuando en el municipio de Zongozotla aún no existían medios de comunicación, y las autoridades necesitaban comunicar o realizar alguna petición al distrito de Tetela de Ocampo, se delegaba a una persona para realizar dicho trabajo. El mensajero tenía que ir a pie hasta el destino, cruzando veredas y lugares solitarios, durando la travesía un aproximado de siete horas, una vez realizado la entrega del mensaje, este tenía que regresar por los mismos caminos. Sin embargo, al estar a unos cinco kilómetros antes de arribar al municipio, caía la noche y se tenía que regresar apoyado de una linterna. Y es en este punto, donde ocurría lo insólito, muchos no culminaban su recorrido. Al no haber regresado a su casa, las esposas reportaban el suceso y todo el pueblo salía a buscarle, dándose cuenta de que el mensajero había sido asesinado. Después de varios sucesos repetitivos, prepararon una emboscada, para saber quién o qué era el responsable de tales actos, eligieron a una persona para que realizara el recorrido completo, y cuando caía la noche los pobladores se encontraban ocultos en el punto en donde ocurrían los siniestros. Cuando el mensajero estaba llegando al lugar, salió una criatura del bosque en forma de hombre pero con gigantescos cuernos, cuando intento arremeter contra el mensajero, todos los pobladores atacaron con machetes y antorchas encendidas, capturando al responsable de los asesinatos, lo arrastraron hasta el centro del municipio en donde lo quemaron vivo, al siguiente día, en el lugar donde cayeron las cenizas apareció por primera vez una planta de hojas lanceoladas aserradas en forma de cuernos (<i>Yucca</i> sp.). Y actualmente castigan a este demonio mutado en forma de planta, cultivándolo en el borde de las parcelas, lejos de donde este pueda provocar más daños.”</p>				
		<p>Asparagaceae <i>Yucca</i> sp.</p> <p>Colecta: 74633</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akalukut</i></p> <p>Notas: <i>Akalukut</i> no tiene un significado como tal, sin embargo, se compone de las palabras <i>aka:n</i> nuca y <i>lukut</i> hueso. La inflorescencia de esta planta es comestible, se hierven únicamente los tépalos y, posteriormente se prepara con huevo, carne o en caldo. Además se emplea como lindero para terrenos y parcelas.</p>	









			<p>Asteraceae <i>Acmella repens</i> (Walter) Rich. ex Pers.</p> <p>Colecta: 21366, 74048</p> <p>Descripción: Según los asesores las flores son del mismo color, un verde muy claro o blanco.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>mú:xi:wa'</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuatl <i>pitsoa:xiwit</i></p> <p>Notas: Crece a orilla de caminos y milpas. Se aprovecha como forraje para cerdos, conejos y aves de corral.</p>
				
		<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> cf. <i>areolaris</i> (DC.) Gage ex B.L.Turner</p> <p>Colecta: 74611</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ka:j</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: <i>Ka:j</i> no tiene interpretación. Se conoce un solo tipo de esta planta, que crece en el monte. El tallo, por su característica hueca, se emplea para entubar agua, usado como una especie de manguera. Se puede juntar varios tallos cabo a cabo para que la "manguera" alcance varios metros de longitud.</p>	





			<p>Asteraceae <i>Ageratina ligustrina</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21513</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Crece a orillas de camino. No tiene uso.</p>
		<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22334</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kas tawan</i> (‘gas’ hierba)</p> <p>Náhuatl Zoquiapan <i>miliktixiwit</i></p> <p>Notas: Se colectó en terrenos de Zoquiapan. Se llama en totonaco <i>kas tawan</i> pero la <i>kas</i> es la pronunciación local de ‘gas’. Se llama así por el olor de gas (algunos dicen olor de mango) que esta planta emite. Según Osbel López la hoja se emplea para aliviar dolores estomacales y abdominales. Las hojas se colocan sobre la panza del afectado y se amarran en su lugar con una venda.</p>	





			<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74398</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqa tama:n</i> (blanco postrado.extendido)</p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta. No tiene ninguna utilidad.</p>
		<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74449</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ju:ki tawan</i> (venado hierba)</p> <p>Notas: Hay 2 tipos, éste que es blanco y otro que es de flores moradas. Se distingue del kas tawan por la falta de olor fuerte de las hojas.</p> <p>Los dos ju:ki tawan tienen el mismo uso medicinal. Las hojas se dejan reposar en alcohol por dos o tres días, hasta que este se tiña de un color verde oscuro. Posteriormente se emplea para tratar a las personas con reumatoides, aplicado el alcohol teñido de verde en forma untada sobre la zona afectada.</p>	
				







			<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74464</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ju:ki tawan</i> (venado hierba)</p> <p>Notas: Tiene el mismo uso medicinal como el <i>ju:ki tawan</i> blanco (<i>napap</i>).</p>
			<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74478</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapa: xpunima:k ni:n</i> (blanco su.algodón muerto)</p> <p>Notas: Ssolamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta. No tiene uso alguno.</p> <p>Véase <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni</p>
			<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Colecta: 74610</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>

			<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Colecta: 21654</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Asteraceae <i>Ageratina</i> sp.</p> <p>Colecta: 22354</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Asteraceae <i>Ageratum corymbosum</i> Zuccagni</p> <p>Colecta: 74047</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpunima:k ni:n</i> (su.algodón muerto)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>kaba:yoh k'itaxo:chit</i></p> <p>Usos: Conocen un tipo de esta planta que crece en sitios abiertos y perturbados, no presenta ningún uso. El <i>Ageratum corymbosum</i> parece ser la planta prototípica que lleva este nombre totonaco; cf. #74478 que fue llamado <i>xasnapapa: xpunima:k ni:n</i>. De tres colectas de <i>Ageratum</i> el <i>A. corymbosum</i> fue el único que tuvo nombre totonaco.</p>

			<p>Asteraceae <i>Ageratum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22381</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Fue colectada en Zoquiapan con presencia de asesores de Zongozotla. Ninguno tenía un nombre ni uso para esta planta.</p>
			<p>Asteraceae <i>Ageratum</i> sp.</p> <p>Colecta: 74596</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tuvo ningún nombre ni uso para los asesores presentes. Los animales no se la comen.</p>
		<p>Asteraceae <i>Aldama dentata</i> La Llave</p> <p>Colecta: 74038</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chixi: tawan</i> (peluda hierba)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ehkaw</i></p> <p>Usos: El nombre de la planta proviene de <i>chixi:t</i> 'cabello' o 'pelo' (para personas y animales; cf. <i>maq̄pa chixi:t</i>, 'vellos de brazo') obviamente relacionado con la pubescencia de esta especie. Aunque se conoce según los asesores solamente "una planta" con este nombre es posible que</p>	






			<p>abarque bajo este nombre varias especies científicas todavía no identificadas. Crece principalmente en cultivos de maíz, se aprovechan las hojas como forraje para cerdos, mulas, caballos e incluso aves de corral (crudas).</p> <p>Véase <i>Sigesbeckia jorullensis</i> Kunth.</p>
		<p>Asteraceae <i>Alloispermum integrifolium</i> (DC.) H. Rob.</p> <p>Colecta: 21722, 74612</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tlaqtla tawan</i> (elote hierba)</p> <p>Notas: Se conoce un solo tipo de esta planta que crece en la milpa, cafetales y orilla de caminos. El prototípico planta conocido como <i>tlaqtla tawan</i> es el <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. y también se ha extendido a incluir bajo este nombre <i>Jaegeria hirta</i> (y quizá otras). El nombre se relacionia con el hecho de que crece por lo común entre los cultivos de maíz. El más usado aparentemente es el <i>Galingsoga parviflora</i> que se aprovecha como forraje para cerdos, caballos y mulas. Se corta y se lleva a la casa para dar a estos animales como alimento.</p>
			








		<p>Asteraceae <i>Alloispermum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74349</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xu:na tawan</i> (amarga hierba)</p> <p>Notas: Se utiliza para controlar los niveles de glucosa en diabéticos, para lavar heridas y granos en la piel, para el dolor de estómago y de muelas. Para diabéticos y el dolor de estómago las hojas se toman en té (3 hojas/1 litro de agua); en el caso de los granos (varicela) se aplica en forma de baño. Finalmente, para el dolor de las muelas, se machacan las hojas y se aplica directamente en la muela picada.</p>
<p><i>kú:chaxa</i></p>			
<p>No está claro el significado del nombre <i>kú:chaxa</i> pero quizá se relaciona con <i>chaxa</i> que significa el tallo del maíz (sea verde o seco). Quizá este nombre se aplica a un grupo de <i>Archibaccharis</i> (aparentemente por lo menos tres especies de este género) por tener el interior del tallo algodonoso. Ninguno de los <i>kú:chaxa</i> ni parece que los animales sueltos se lo comen.</p>			
		<p>Asteraceae <i>Archibaccharis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21642</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido o, por un asesor, <i>kú:chaxa</i> (falta análisis aunque <i>chaxa'</i> se aplica al tallo de maíz)</p> <p>Notas: Se hicieron 4 colectas de <i>Archibaccharis</i> que por momento se han quedado como <i>Archibaccharis</i> sp. Hay siete especies de <i>Archibaccharis</i> documentado en el estado de Puebla. De las cuatro colectas solamente en un caso un solo asesor lo nombró <i>kú:chaxa</i>, un término que se aplica a varias</p>








		21644	<p>especies de Asteraceae: <i>Archibaccharis</i>, <i>Baccharis</i>, <i>Leiboldia</i>. Es probable que <i>kú:chaxa</i> se relaciona con <i>chaxa</i>, que designa el tallo de la planta de maíz ya que los tallos de estas plantas, con el tallo de maíz, tiene una consistencia algodonosa en el interior del tallo.</p>
		74523	
		<p>Asteraceae <i>Archibaccharis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74437</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lak tsu kú:chaxa'</i> (el pequeño <i>kú:chaxa'</i>)</p> <p>Notas: Se designa esta como un pequeño <i>kú:chaxa</i> por su tamaño. Como la mayoría de los <i>kú:chaxa</i> no tiene uso.</p>

			<p>Asteraceae <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74373</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>múntsiya: tawan</i> (arena.de.río hierba)</p> <p>Usos: El nombre de esta planta refiere al hecho de que su habitat principal es por las riberas de los rios donde, particularmente donde hay tierra arenosa.</p>
			<p>Asteraceae <i>Baccharis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74502</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kú:chaxa'</i> (falta analisis aunque <i>chaxa'</i> se aplica al tallo de maíz)</p> <p>Notas: Esta es una de varias plantas conocidas por este mismo nombre. Este <i>kú:chaxa'</i> no tiene uso.</p>

			<p>Asteraceae <i>Baccharis trinervis</i> (Lam.) Pers.</p> <p>Colecta: 74009, 74017</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:kuchana: kú:chaxa'</i> (medicina <i>kú:chaxa'</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ko:nkilit</i></p> <p>Notas: Esta planta se clasifica entre los <i>kú:chaxa</i> por su característica de un interior algodonoso de su tallo. Pero, a diferencia de las demás hierbas que llevan este nombre, éste es medicinal. Se utilizan las hojas para reventar granos (específicamente espinillas y perrillas). Las hojas se machacan y se aplican directamente sobre el grano, de preferencia en la noche. Se deja así por la noche. Se puede repetir el proceso por otra noche.</p>
			<p>Asteraceae <i>Barkleyanthus salicifolius</i> (Kunth) H. Rob & Brettell</p> <p>Colecta: 74593 tratar este mal se hierven las hojas de <i>are:na tawan</i> y se aplica el agua en forma de baño por todo el</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>are:nah tawan</i> (arena hierba)</p> <p>Notas: Hay una sola planta que se conoce con este nombre, <i>are:nah tawan</i>. Crece en sitios húmedos y cerca de cuerpos de agua, de una manera similar al <i>múntsiya: tawan</i>. Es planta medicinal. Se usa para curar la la enfermedad conocida como 'mal de ojo'. Esta condición se provoca en los niños menores de 5 años cuando a una persona ajena a la familia le gusta el niño, particularmente por su aspecto físico. Esto provoca que el niño (o niña) sufra por un lagrimeo constante y dolor de cabeza. Para</p>
		<p>Asteraceae <i>Barkleyanthus salicifolius</i> (Kunth) H. Rob & Brettell</p> <p>Colecta: 74593 tratar este mal se hierven las hojas de <i>are:na tawan</i> y se aplica el agua en forma de baño por todo el</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>are:nah tawan</i> (arena hierba)</p> <p>Notas: Hay una sola planta que se conoce con este nombre, <i>are:nah tawan</i>. Crece en sitios húmedos y cerca de cuerpos de agua, de una manera similar al <i>múntsiya: tawan</i>. Es planta medicinal. Se usa para curar la la enfermedad conocida como 'mal de ojo'. Esta condición se provoca en los niños menores de 5 años cuando a una persona ajena a la familia le gusta el niño, particularmente por su aspecto físico. Esto provoca que el niño (o niña) sufra por un lagrimeo constante y dolor de cabeza. Para</p>	

			<p>cuerpo. Luego, al terminar el baño, se corta una rama con hojas y se acomoda al niño como almohada para que duerma sobre ella.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Bartlettina karwinskiana</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.</p> <p>Colecta: 74606</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: De esta planta, aunque no le tenían nombre los asesores la reconocían y sabían que crece en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua, no presenta ningún uso.</p>
		<p>Asteraceae <i>Bartlettina sordida</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.</p> <p>Descripción</p> <p>Colecta: 21779, 74609</p> <p>21779</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qa:nat chawalhá'</i> (#74609) o sin nombre conocido (#21779) (su.excremento guajolote)</p> <p>Notas: <i>Xpu:qa:nat chawala'</i> se interpreta como excremento (como de diarrea) de guajolote, proviene de las palabras <i>pu:qa:nat</i> excremento y <i>chawalhá'</i> guajolote. Se llama así por el olor de las hojas. Conocen un solo tipo de esta planta. Crece a orilla de caminos, no presenta ningún uso.</p>	

			74609	
		<p>Asteraceae <i>Bartlettina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74532</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Un asesor comentó que esta planta se parece a otro que tienen las hojas olorosas (olor a mango o a gas) y que se llama <i>kas tawan</i>. Esta planta, #74532, no tiene uso alguno.</p>	
		<p>Asteraceae <i>Bartlettina</i> sp.</p> <p>Colecta: 22379,</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kas tawan</i></p> <p>Notas: <i>Kas tawan</i> significa hierba de gas, proviene de las palabras, <i>kas</i> es una palabra inexistente del totonaco, surge del intento de decir la palabra "gas" y <i>tawan</i> hierba. Se llama así por su olor, que algunos describen como olor a mango. Es una planta medicinal: se emplea para aliviar dolores estomacales, abdominales y cólicos. Las hojas se colocan directamente en la zona de dolor y se sujeta con una venda.</p>	

		74592		
			<p>Asteraceae <i>Bartlettina</i> sp.</p> <p>Colecta: 21730</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido</p> <p>Notas: No se incluía como un tipo de <i>kas tawan</i>. Para los asesores totonacos, esta colecta no tiene nombre ni uso.</p>
		<p>Asteraceae <i>Bartlettina</i> sp.</p> <p>Colecta: 21737</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido</p> <p>Notas: No se incluía como un tipo de <i>kas tawan</i>. Para los asesores totonacos, esta colecta no tiene nombre ni uso.</p>	

Bidens alba var. *radiata* (Sch. Bip.) R.E. Ballard ex Melchert y *Bidens odorata* Cav.

Estas dos especies son, junto con otras de sus variedades, parte de un complejo de especies de *B. pilosa*. De cuatro variedades de *B. odorata* (var. *calicola*, var. *chilpangensis*, var. *oaxacensis* y var. *odorata*), solamente la variedad *odorata* se encuentra en la Sierra Nororiental de Puebla. De entre todas las variedades, la variedad *odorata* posee la cabezuela más grande, cercana al tamaño de *B. alba*. Hay dos variedades de *B. alba*: *alba* y *radiata*. Solamente la segunda se encuentra en la región de estudio, la variedad *alba* crece más hacia la costa. *B. alba* var. *radiata* crece más erecta que *B. odorata* var. *odorata*. Las diferencias principales son con respecto a las brácteas, siendo espatuladas en *B. alba* var. *radiata* y más linear a linear-espatuladas en *B. odorata* var. *odorata*. Si las hojas son disecadas se trata de *B. odorata* var. *odorata*. Generalmente las hojas de *B. odorata* son más largas y angostas que las de *B. alba* var. *radiata*. En cuanto a las flores, ambas pueden tener 5 lígulas, pero solamente *B. alba* llega a tener 8. En cuanto a la forma de las lígulas, las de *B. alba* son más de 2 veces más largas que anchas, mientras las de *B. odorata* son menos de 2 veces más largas que anchas, esto es, más “chatas”, mientras que las de *B. alba* son más largas.

En todos los pueblos totonacos estudiados, se conoce tanto a *Bidens alba* var. *radiata* como a *Bidens odorata* con el nombre de *xtiyo'* o un cognado cercano, y a *Bidens reptans* como un tipo de “*Bidens*” expresado con un modificador a *xtiyo'* o su cognado.



Asteraceae
Bidens alba var. *radiata* (Sch. Bip.)
R.E. Ballard ex Melchert

Colecta: 21355

Totonaco de Zongozotla
xtiyo'
(sin análisis)

Notas: Esta planta, que incluye tanto *B. alba* var. *radiata* y *B. odorata* var. *odorata* se ocupa como forraje para cerdos y aves de corral. También se utilizan para detener la hemorragia de una cortada. Se mastica la hoja y se aplica la pasta que resulte directamente a la herida.









Asteraceae
Bidens odorata var. *odorata* Cav.







Colecta: 22134, 74045





Totonaco de Zongozotla
xtiyo'
(sin análisis)







Cuetzalan Náhuat
mo:so:t

Notas: Véase anterior.

		<p>Asteraceae <i>Bidens reptans</i> (L.) G. Don Descripción:</p> <p>Colecta: 21448, 74441</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqlalhná: xtiyo'</i> (pelo.rubio xtiyo')</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>k^oomo:so:t</i></p> <p>Notas: Conocen un tipo de esta planta que crece sobre los árboles. Tanto como en el náhuat como en el nombre científico se relaciona con el <i>xtiyo' / mo:so:t / Bidens.</i> , no presenta ningún uso.</p>
		<p>Asteraceae <i>Brickellia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21935</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
			

				<p>Asteraceae <i>Brickellia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22403</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Chaptalia</i> nutans</p> <p>No colectada pero visto y conocido por los asesores en tierras de Zongozotla.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Aunque no tiene nombre si tiene uso medicinal. Dos hojas se hierven en un litro de agua y se toma como té en las mañanas para dolor en los riñones.</p>		
		<p>Asteraceae <i>Chaptalia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22344</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>		

		<p>Asteraceae <i>Chaptalia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21874</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M. King & H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22226, 74452</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ju:ki tawan</i> (venado hierba)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>ju:ki tawan</i></p> <p>Notas: El término <i>ju:ki tawan</i> también se aplica a una <i>Ageratina</i> pero esta no tiene uso medicinal como la <i>Chromolaena odorata</i>. Parece que todas las <i>ju:ki tawan</i> tienen uso medicinal. Las hojas se dejan reposar en alcohol (antes era con aguardiente) por dos o tres días, hasta que este se tiña de un color verde oscuro. Posteriormente se emplea para tratar personas con reumatoides, aplicada de forma untada en la zona afectada.</p>

		<p>Asteraceae <i>Chromolaena</i> sp.</p> <p>Colecta: 22348</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Cirsium</i> sp.</p> <p>Colecta: 74055</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqtsoqo:wat</i> (sin análisis)</p> <p>Usos: No tiene uso conocido.</p>
		<p>Asteraceae <i>Clibadium arboreum</i> Donn.Sm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107444 (fotos de colectas de Cuetzalan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>



Asteraceae

Critonia morifolia (Miller) R.M.King & H. Rob.

Colecta: 74042

Totonaco de Zongozotla








pú:lhuku'
(hueco?)









Cuetzalan Náhuat








a:ko:kohxiwit








Notas: Aparentemente el nombre *pú:lhuku'* se relaciona con *pu:lhukún*, 'hueco'. Se nota que el nombre náhuat también sugiere 'hueco' ya que *a:ko:koh* se relaciona con 'garganta'.







En Zongozotla esta planta se emplea como remedio para el empacho en niños. A la hoja se le unta manteca de cerdo y bicarbonato de sodio, posteriormente se coloca la hoja en el estómago del niño y se sujeta con una venda. La planta viva se emplea como cerca viva.








			<p>Asteraceae <i>Critonia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22421</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>li:su:t</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. Sin embargo es de notar que los de Zongozotla usan el término <i>li:su:t kiwi'</i> para referirse a <i>Bernardia mexicana</i>, cuya cortés se usa como fibra.</p>
		<p>Asteraceae <i>Critonia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22503</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	
		<p>Asteraceae <i>Critonia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22342</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	







			<p>Asteraceae <i>? Critonia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21790</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Dahlia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21705</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.</p> <p>Colecta: 74628</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>








		<p>Asteraceae <i>Elephantopus mollis</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22204, 74497</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:palhna: tawan</i> (barrer hierba)</p> <p>Náhuat Zoquiapan <i>weyakxiwit</i></p> <p>Notas: El nombre de esta planta refiere a su uso como escoba en los quehaceres domésticos en el interior de las csas.</p>	
		<p>Asteraceae <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22285</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhtakát kak</i> (filoso quelite)</p> <p>Notas: Esta planta recibió este nombre por uno de los dos asesores por ser parecida al <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L. una planta (véase abajo) cuyas hojas son comestibles. Por eso le designan <i>kak</i> ('quelite') a <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex DC. aunque no es comestible.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21383, 74354</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>klhqeñni ju:ki'</i> (su.epazote venado)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>Sin nombre conocido.</i> (pero Mariano Gorostiza indica que hay dos tipos, el otro es de flores rosa)</p> <p>Notas: Los dos <i>Erechtites</i> colectadas en Zongozotla (son las únicas dos especies de este género en el estado) reciben este nombre por la forma de la planta, que parece mucho al epazote. Sin embargo ninguna de las dos tiene uso alguno.</p>








		<p>Asteraceae <i>Erechites valerianifolius</i> (Wolf) DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21511, 74142</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>klhqe'ni ju:ki'</i> (su.epazote venado)</p> <p>Notas: Véase nota anterior.</p>	
				
		<p>Asteraceae <i>Erigeron karvinskianus</i> DC.</p> <p>Colecta: 21474, 21795, 74074</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmak^wa tali:puwa:n</i> (que.cura tristeza)</p> <p>Notas: Esta planta, muy común y reconocida, tiene uso medicinal que da la razón a su nombre. Se utiliza en forma de té para tratar los malestares provocados por tener que orinar más de lo esperado. Además, es utilizada, también en té, para curar la tristeza ocasionada por adversidades personales y emocionales.</p>	








		<p>Asteraceae <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.</p> <p>Colecta: 21347, 74049</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tlaqtla tawan</i> (elote hierba)</p> <p>Notas: El <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. es la referencia prototípica del término <i>tlaqtla tawan</i>, que también nombra otras plantas (p. ej., <i>Alloispermum integrifolium</i> (DC.) H. Rob.). El nombre refleja que esta planta crece en los terrenos de cultivo. Se aprovecha como forraje para cerdos, caballos y mulas, cortando la planta y llevándola a casa.</p>
		<p>Asteraceae <i>Hidalgia pentamera</i> Sherff</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21807, 21916, 74564</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa:qe:wa luwa'</i> (su. <i>Cyclanthera langaei</i> serpiente)</p> <p>Notas: El nombre hace referencia a la forma de las hojas que se consideran parecidas a la planta llamada <i>a:qe:wa</i> (<i>Cyclanthera langaei</i> Cogn. conocido en náhuat como <i>ma:kwi:lkilit</i> 'cinco quelites', por la forma dividida de las hojas). Sin embargo el <i>xa:qe:wa luwa'</i> no es comestible.</p>
			

				
			<p>Asteraceae <i>Hieracium</i> sp.</p> <p>Colecta: 21728</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Hieracium</i> sp.</p> <p>Colecta: 21878</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	

		<p>Asteraceae <i>Hymenostephium cordatum</i> (Hook. & Arn) S.F. Blake</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21449, 74333</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tastay</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>mekeahkaw</i></p> <p>Usos: Esta planta no tiene uso, ni los animales se lo comen. Nótese que la misma especie fue colectada en Ecatlán donde lo nombran <i>stiliki tastuy</i> ('redondo <i>tastuy</i>').</p>
		<p>Asteraceae <i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21365</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tlaqtla tawan</i> (elote hierba)</p> <p>Notas: Otra hierba con el nombre de <i>tlaqtla tawan</i> como también <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. (el prototípico) y <i>Alloispermum integrifolium</i> (DC.) H. Rob.. El nombre refleja que esta planta crece en los terrenos de cultivo.</p>
		<p>Asteraceae <i>Koanophyllon longifolium</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.</p> <p>Colecta: 21457</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>

		<p>Asteraceae <i>Lactuca graminifolia</i> Michx.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21390, 74215</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>klhtakat kaka lawá:n</i> (filoso quelite extranjero)</p> <p>Notas: Esta es una planta comestible, se aprovechan las hojas y los tallos tiernos, se prepara en forma de caldo con sal al gusto o simplemente crudo acompañado de un taco.</p>	
			<p>Foto 74215</p>	
		<p>Asteraceae <i>Lagascea helianthifolia</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21701,</p> <p>Foto: 74510</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	

		Foto: 21701		
		<p>Asteraceae <i>Lasiantha</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74515</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Leiboldia serrata</i> (D. Don) Britton</p> <p>Colecta: 21562, 22062, 74486, 74653,</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido o <i>qontsi:ts</i> o (#22062)</p> <p>Notas: De las cuatro colectas que se hicieron de <i>L. serrata</i> solamente un asesor, Isac Pérez Núñez lo reconoció como <i>qontsi:ts</i>. Dijo que crece a orilla de ríos, no presenta ningún uso. Osbel López no dio un nombre a las plantas que se colectaron pero después comentó que conoce una planta que le da el nombre de <i>qontsi:ts</i> pero que tiene las hojas más verdes.</p>

				
			<p>Asteraceae <i>Lepidaploa salzmannii</i> (DC.) H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21769, 74546</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaspupuku kú:chaxa'</i> (azul <i>kú:chaxa'</i>) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Es otra especie que se designa como un <i>kú:chaxa'</i> por tener un tallo con interior algodonoso como el interior de la caña de maíz (<i>chaxa'</i>). Aunque Osbel López comentó que solamente el banco, L. tortuosa, se emplea para arrear mulas y otras bestias de carga, tanto Sebastián López Cano como Isac Pérez Núñez dijeron que el azul, <i>Lepidaploa salzmannii</i> también se usa para tal fin.</p>
		<p>Asteraceae <i>Lepidaploa tortuosa</i> (L.) H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21720, 74545</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnápapa: ku:chaxa'</i> (blanco <i>kú:chaxa'</i>) Cuetzalan Náhuat <i>wiwilakani</i></p> <p>Notas: Anteriormente se aprovechaba el tallo de esta planta para arrear bestias de carga y la corteza de esta planta como un lazo para amarrar exclusivamente leña. Según Osbel López solamente el blanco, <i>xasnápapa: ku:chaxa'</i>, tiene este uso y no el azul, <i>xaspupuku kú:chaxa'</i>.</p>	

			<p>Asteraceae <i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74369, 22027</p> <p>Foto: 74369</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtili: tawan</i> (redonda hierba)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>ehkaw</i></p> <p>Notas: <i>Xtili: tawan</i> se interpreta como hierba redonda, proviene de las palabras <i>xtili:lh</i> redondo, circular y <i>tawan</i> hojas o hierba. Conocen dos tipos de esta planta que crece entre los cultivos de maíz, el otro es de flores más grandes. Se aprovecha como forraje para cerdos y aves de corral.</p> <p>La otra planta conocida como <i>xtili: tawan</i> es <i>Sclerocarpus</i> sp. probablemente <i>Sclerocarpus uniserialis</i> (Hook.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.</p>
		<p>Foto: 22027</p>		
			<p>Asteraceae <i>Melanthera nivea</i> (L.) Small.</p> <p>Colecta: 21468, 74063</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chastu:tati tawan</i> (cuadrado hierba)</p> <p>Notas: La palabra <i>chastu:tati</i> refiere a cosas como tallos de plantas, madera tallada que tiene 4 esquinas, sea cuadrado o rectangular. En este caso refiere al tallo de la <i>M. nivea</i>, que no tiene uso.</p> <p>Cuetzalan Náhuat: M. Gorostiza: " Algunas personas dicen que es un tipo de <i>ehkaw</i>."</p>

Wakuh | Mikania spp.

Hasta el momento se han hecho cinco colectas de *Mikania* de las cuales dos han sido identificadas a especie: *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. y *Mikania hookeriana* DC. La primera fue identificada por los asesores como *wakuh tawan* y el segundo no. De las tres colectas adicionales de esta especie una no fue llamada *wakuh tawan*, otra si (#21640) y una tercera fue designada como *xalak tlanka wakuh tawan* (los grande *wakuh* hierba) por sus hojas grandes. Se podría llevar a cabo investigaciones adicionales para determinar el grado a que los *Mikania* reciben el nombre *wakuh tawan*, y si algunos hablantes usan este nombre totonaco más ampliamente que otros. El uso medicinal de por los menos algunas *Mikania* se reporta bajo.

Finalmente, en San Miguel Tzinacapan algunos asesores llamaban a una *Mikania wa:koh*, un nombre que por lo menos uno consideraba como un término español. Puede ser que el nombre en náhuatl proviene del totonaco, quizá después de haber pasado primero por el español regional. Es más probable que el origen sea el totonaco que el náhuatl porque en Zongozotla el nombre *wakuh tawan* es bastante conocido. Sin embargo se puede también investigar más la extensión de este término o un cognado para los *Mikania* en pueblos nahuas y totonacos de la Sierra.

**Asteraceae***Mikania cordifolia* (L. f.) Willd.

Colecta: 74050








Totonaco de Zongozotla*wakuh tawan*
(sin análisis, hierba)**Cuetzalan Náhuatl***wakoh*









Usos: Esta planta tiene uso medicinal. Se hierva la planta completa. La persona afecta se baña con el agua que resulte para tratar las ronchas del cuerpo provocado por hongos o insolación.





Aparentemente hay dos o más especies de *wakuh tawan*. Este puede ser el más común y fácil de reconocer aun es estado estéril por las hojas en forma de delta.








El nombre de esta *Mikania* puede ser un préstamo del náhuatl aunque también es posible que la dirección del préstamo sea del totonaco al náhuatl.








			<p>Asteraceae <i>Mikania</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74549</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka wakuw tawan</i> (los grande <i>wakuw</i> hierba)</p> <p>Notas: Otro tipo de <i>wakuw tawan</i>. No tiene el uso medicinal que el <i>wakuw tawan</i> que es el <i>Mikania cordifolia</i>.</p>
			<p>Asteraceae <i>Mikania</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21640</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>wakuw tawan</i> (<i>wakuw</i> hierba)</p> <p>Notas: Aunque se le refiere como un tipo de <i>wakuw</i>, no tiene uso conocido.</p>
		<p>Asteraceae <i>Mikania hookeriana</i> DC.</p> <p>Colecta: 22317</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	










			<p>Asteraceae <i>Mikania</i> sp.</p> <p>Colecta: 21786</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Montanoa</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74408</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaqaloqot ju:ki'</i> (sus.astas venado)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>k^mernaba:kaxo:chit</i></p> <p>Notas: Hay 2 tipos de esta flora, el otro es de flores boludas consideradas como "dobles". Por ser rasposas, las hojas se utilizan como sustituto de fibra para lavar utensilios de cocina. La planta misma se usa en los solares como cerca viva.</p>	
		<p>Asteraceae <i>Neomirandea araliifolia</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22365</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maq^tawalhá: kiwi'</i> (que.posa árbol)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>maq^tawalhá: kiwi'</i> (que.posa árbol)</p> <p>Notas: En una colecta de esta planta los asesores de Zongozotla no le tuvieron nombre. Cuando después se colectó en Atlequizayán el asesor de este pueblo le dio el nombre de <i>maq^tawala: kiwi'</i> y uno de los asesores de Zongozotla (que previamente no había tenido un</p>	







		<p>74559</p>	<p>nombre para esta planta) le dio es mismo nombre. No tiene uso. <i>Maqtawalhá: kiwi'</i> hace referencia al carácter epífita de esta planta y es nombre que se aplica a muchas plantas epífitas que crecen sobre los árboles.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Neurolaena</i> sp.</p> <p>Colecta: 21796</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
			<p>Asteraceae <i>Parthenium hysterophorus</i> L.</p> <p>Colecta: 74659</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>


		<p>Asteraceae <i>Perymeniopsis ovalifolia</i> (A.Gray) H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74289</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa sananka kú:chaxa'</i> (el amarillo tallo.de.milpa)</p> <p>Náhuatl de San Miguel Tzinacapan <i>xi:keslichikilu:n</i></p> <p>Notas: Para los de Zongozotla el nombre hace referencia a lo algodonoso del interior del tallo, similar a esta característica de los tallos de la milpa. Mariano Gorostiza (Tzinacapan) menciona que crece en el monte sobre sitios rocosos. Anteriormente se usaba como una esponja para lavar jícaras. Apparently the name that he gives is an alternative, perhaps erroneous of <i>xi:kalihchikilo:ni</i>, a name given by Ernesto Vázquez.</p>
		<p>Asteraceae <i>Piptothrix areolaris</i> (DC.) R.M. King & H. Rob. (sin. <i>Ageratina areolaris</i> (DC.) Gage ex B.L.Turner)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74479</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>

		<p>Asteraceae <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G.Don in Sweet</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74110</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paxkat tsikan</i> (humilde mujer.de.carácter.fuerte)</p> <p>Notas: Según los asesores e esta planta que crece en sitios abiertos. Se aprovecha la planta completa, tallo y hojas, para prepara agua para hacer un baño con que se alivia la fiebre y el espanto provocado por eventos traumáticos.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Pluchea salicifolia</i> (Mill.) S.F.Blake</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22366</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Podachaenium eminens</i> (Lag.) Sch. Bip.</p> <p>Colecta: 74619</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	

				
			<p>Asteraceae <i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss. ex Aubl.) C.F. Baker</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74544</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ksi:maqa:t chachaq</i> (su.lengua sapo)</p> <p>Notas Se conoce solamente un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos y cafetales. Medicinal, se toma en té para las personas que padecen de presión arterial alta (2 plantas enteras/1 litro de agua).</p>
		<p>Asteraceae <i>Pseudognaphalium leucocephalum</i> (A. Gray) Anderb.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21454</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtonqno: tawan</i> (que.se.estira/resortera hierba)</p> <p>Notas: Se hicieron 3 colectas de plantas con este nombre, todas del género <i>Pseudognaphalium</i>. Hasta el momento no se ha determinado cuantas especies podrían representar.</p> <p>El nombre de la planta hace referencia al caracter de sus hojas que se pueden estirar sin que se revienten fácilmente. Crece en sitios abiertos y perturbados. No presenta ningún uso.</p>	

			<p>Asteraceae <i>Pseudognaphalium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74443</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtonqno: tawan</i> (que.se.estira/resortera hierba)</p> <p>Notas: Véase nota anterior.</p>
			<p>Asteraceae <i>Pseudognaphalium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74445</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtonqno: tawan</i> (que.se.estira/resortera hierba)</p> <p>Notas: Véase nota anterior.</p>
			<p>Asteraceae <i>Roldana</i> cf. <i>chapalensis</i> (S. Watson) H. Rob. & Brettell</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74485</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre o <i>xji:ni chichí'</i> (su.<i>Piper.auritum</i> perro)</p> <p>Notas: El nombre hace referencia a que es la 'hoja santa' del perro porque, según Isac Pérez, las hojas de esta <i>Roldana</i> se parecen algo a las de <i>Piper auritum</i>. Solamente él, de los tres asesores, tuvo un nombre para esta planta. No tiene uso alguno.</p>

		<p>Asteraceae <i>Roldana</i> sp.</p> <p>Colecta: 21641</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Roldana</i> sp.</p> <p>Colecta: 21732</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Roldana</i> sp.</p> <p>Colecta: 21861</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>




Asteraceae
Salmea scandens (L.) DC.

Colecta: 22454

Totonaco de Zongozotla
Sin nombre conocido.







Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.



22481



			<p>Asteraceae <i>Schistocarpa bicolor</i> Less.</p> <p>Colecta: 21475, 21458, 74016, 74384, 107412</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>japat</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ko:nkilit</i></p>
		<p>Notas: Donde se ha colectado esta planta tiene el mismo nombre (o un cognado) sea en totonaco o náhuat. En Mecatlán, Veracruz, se llama kapa'. En Ecatlán, mpio. Jonotla, Puebla, se llama igual al nombre en Zongozotla: <i>japat</i>.</p> <p>En náhuat se ha documentado el nombre de ko:nkilit (olla.quelite) tanto en el municipio de Cuetzalan como en el de Huitzilán de Serdán (con asesores de Xinacachapan).</p> <p>Según los asesores de Zongozotla hay 2 tipos. El otro (esto es, no esta colecta) tiene tallo de apariencia algodonosa. Pero es probable que sea una variación dentro de la especie. Crece en milpas, cafetales y lugares húmedos o cerca de cuerpos de agua. Se aprovecha como forraje para cerdos, mulas, conejos y aves de corral.</p> <p>Osbel López sugirió que <i>japat</i> proviene de la onomatopeya <i>japa japa'</i>, sonido que se produce por los venados al masticar esta planta.</p>		
		<p>Asteraceae <i>Sclerocarpus</i> sp.</p> <p>Probablemente las 3 colectas son de <i>Sclerocarpus uniserialis</i> (Hook.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74106</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtili: tawan</i> (redonda hierba)</p> <p>Notas: Crece a orilla de caminos y cafetales, no presenta ningún uso. Hay varias plantas que se llaman de esta manera (cf. <i>Aldama dentata</i>). En Ecatlán la también Asteraceae <i>Hymenostephium cordatum</i> (Hook. & Arn) S. F. Blake utiliza el término para redondo y se llama <i>stiliki tastuy</i>.</p> <p>En una colecta, #22198, ningún asesor le dio un nombre a esta</p>	

			<p>planta.</p>
		<p>Asteraceae <i>Sclerocarpus</i> sp. Descripción: Colecta: 22115</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtili: tawan</i> (redonda hierba) Totonaco de Atlequizayán <i>lahna: kiwi'</i> (delgado árbol)</p>
		<p>Asteraceae <i>Sclerocarpus</i> sp. Colecta: 22198</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>

			<p>Asteraceae <i>Senecio</i> sp.</p> <p>Colecta: 21873</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
			<p>Asteraceae <i>Sigesbeckia jorullensis</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74566</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chixi: tawan</i> (peluda hierba)</p> <p>Notas: Se aprovecha como forraje para aves de corral, conejos y cerdos.</p> <p>Esta colecta, de <i>Sigesbeckia jorullensis</i>, fue designada con el mismo nombre totonaco que <i>Aldama dentata</i> La Llave, por la pubescencia que las dos plantas tiene.</p>
			<p>Asteraceae <i>Sinclairia discolor</i> Hook. & Arn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74472</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qantsi: miya:k</i> (<i>Smilax</i> bejuco)</p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta: <i>qantsi: miya:k</i>.</p> <p>La mimsa palabra <i>qantsi: miya:k</i> se usa para designar a <i>Smilax subpubescens</i> A. DC. Parecd que <i>qantsi</i>: se relacion con <i>qan</i> 'antena' y <i>tsilli:lh</i> 'camarrón', (véase discusión bajo los <i>Smilax</i>). Lo llamó así Sebastián López Cano porque las brotes de la guia de este Asteraceae se parecen a los retoños del <i>qantsi:lh</i>.</p>




















		<p>Asteraceae <i>Sinclairia</i> sp. o <i>Liabum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21778</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Smallanthus maculatus</i> (Cav.) H. Rob.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21458, 74043</p> <p>Foto 21458</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tanchichi</i>: <i>tawan</i> o <i>tanchich</i> (nalgas.perro? hierba)</p> <p>Notas: Antiguamente esta planta se usaba para exterminar las pulgas a los perros. Se tendían las plantas formando una cama en el echadero del animal y esto provocaba el exterminio de los parásitos.</p> <p>Se le dice <i>tanchich</i>, con la pérdida de la <i> final si no le sigue otra plabra. Crece en orilla de caminos y cafetales.</p>
			









Foto 74043















			<p>Asteraceae <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L.</p> <p>Colecta: 74037</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>Ihtakát kak</i> (filoso quelite)</p> <p>Notas: Esta es una planta comestible, se aprovechan las hojas y los tallos tiernos. Se prepara en forma de caldo con sal al gusto o simplemente crudo acompañado de un taco. Conocen un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos y en sitios abiertos. Se llama así por las hojas.</p>
			<p>Asteraceae <i>Stevia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74436</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqsi: taman</i> (dulce postrado)</p> <p>Notas: Hay un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos y cafetales, no presenta ningún uso. Note que ningún asesor ha probado la hoja de esta planta para saber si es dulce.</p>
				







			<p>Asteraceae <i>Symphyotrichum expansum</i> (Poepp. ex Spreng.) G.L. Nesom</p> <p>Colecta: 22160</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
<p style="text-align: center;">qalhpúxam / <i>Tagetes erecta</i> L. y <i>Tagetes patula</i> L. (que algunos botánicos consideran sinónimo a <i>T. erecta</i>)</p> <p>Una de las flores más conocidas en Mesoamerica, y más usada como adorno de los altares, santos e iglesia es el <i>Tagetes erecta</i> L. Las plantas varían por el color de sus lígulas (pétalos) y por su cantidad. En Zongozotla no se distingue lexicalmente entre los <i>qalhpúxam</i> que flores dobles (las primera dos en continuación) y las de flores sencillas. En el pueblo vecino de Atlequizayán se les llama a las <i>T. erecta</i> de lígulas sencillas, <i>xa xpipileqe qalhpúxum</i> (lit., 'la mariposa <i>qalhpúxum</i>), aparentemente por asemejarse sus flores de rayo a las alas de mariposa. En Cuetzalan se distingue el segundo, sencillo, como <i>nakastapal</i>.</p> <p>La palabra totonaca <i>qalhpúxam</i> proviene de la palabra para vientre, <i>aqpuxám</i> precedido por el clasificador de humanos, <i>qalh-</i> que también se utiliza para flores. Pero 20 personas se expresa mediante la palabra <i>qalhpuxám</i>, con acento final, mientras que el término para <i>T. erecta</i> es <i>qalhpúxam</i>.</p> <p>En Zongozotla no se cultiva el <i>qalhpúxam</i> sino que crece solito en sitios abiertos particularmente en las milpas y a veces en los solares. Si brotano no los quitan, pero tampoco los siembran. Se emplean para ornamental específicamente en día de muertos en el pantaón, la iglesia y altares caseros. Se hacen arreglos florales amarradas con dos hojas de <i>Chamaedorea</i> (particularmente <i>Chamaedorea schiedeana</i> Mart.)</p>				
		<p>Asteraceae <i>Tagetes erecta</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22138, 74406</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhpúxam</i> (clasificador.personas.veinte)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qalhpúxum</i> (clasificador.personas.veinte)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>sempowalxo:chit</i></p> <p>Notas: Véase texto introductorio a estas flores.</p>	

		<p>Asteraceae <i>Tagetes erecta</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22135, 74409</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhpúxam</i> (clasificador.personas.veinte)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>sempowalxo:chit</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qalhpúxum</i> (clasificador.personas.veinte)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio a estas flores.</p>
		<p>Asteraceae <i>Tagetes erecta</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22137, 22140, 74405</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhpúxam</i> (clasificador.personas.veinte)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>sempowalxo:chit / nakastapal</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xa xpileqe qalhpúxum</i> (la mariposa <i>qalhpúxum</i>)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio a estas flores.</p>
			








			
		<p>Asteraceae <i>Tagetes erecta</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22136, 74407</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhpúxam</i> (clasificador.personas.veinte)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>sempowalxo:chit / nakastapal</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xa xpipileqe qalhpúxum</i> (la mariposa <i>qalhpúxum</i>)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio a estas flores.</p>
			

		<p>Asteraceae <i>Tagetes filifolia</i> Lag.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21563, 107445</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>áni:s tawan</i> (anís hierba)</p> <p>Notas: Ocupan las hojas para preparar un té.</p>
		<p>Asteraceae <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.</p> <p>Colecta: 74599</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Asteraceae <i>Telanthophora grandifolia</i> (Less.) H. Rob. & Brettell</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21484, 21800, 74334</p> <p>Foto de 21484</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qopan</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>po:chne</i></p> <p>Notas: M. Gorostiza comenta que el S.M. Tzinacapan las hojas se aprovechan para inducir la germinación de las semillas de maíz antes de la siembra. En Zongozotla no se les dan este uso a las hojas, quizá principalemnte porque la gente no siembra la maíz en esta comunidad. Pero un señor</p>

			<p>grande, mayor de edad sabía de esto uso, quizá por haber salido a otros pueblos a trabajar.</p>
		<p>Asteraceae <i>Tithonia</i> sp. Colecta: 22150, 74082</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xku:la'</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: Este nombre no tiene interpretación semántica; se aplica solamente a la (o las) <i>Tithonia</i>. Esta planta crece a las orillas de los caminos. Apparently hay dos tipos que se distinguen por las hojas: partidas con tres lóbulos o enteras (#74094).</p> <p>Las flores del <i>xku:la'</i> se aprovechan para elaborar collares que sirven para dar la bienvenida a personalidades en eventos sociales.</p>
			

		<p>Asteraceae <i>Tithonia</i> sp.</p> <p>Colecta: 74094</p>	
		<p>Asteraceae <i>Tridax procumbens</i> (L.) L.</p> <p>Colecta: 22164</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. Aparentemente no es común ya que los asesores dijeron que no la habían visto o notado.</p>
		<p>Asteraceae <i>Verbena pseudovirgata</i> B.L. Turner</p> <p>Colecta: 21517</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>

			<p>Asteraceae <i>Verbessina turbacensis</i> Kunth in HBK.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74383</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puxtaktay</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>iyakowit</i></p> <p>Notas: Crece entre la milpa y en sitios perturbados. Se aprovechan las hojas como forraje para mulas; se corta y se lleva a la casa para esta finalidad. También se emplea como cerca viva.</p> <p>Nótese que hay un término en Zongozotla, <i>xtakta:yíy</i> que se aplica a las plantas que siempre están verdes durante todo el año. No queda claro si el nombre de <i>V. turbacensis</i> tiene relación con este término.</p>
			<p>Asteraceae <i>Vernonanthurus patens</i> (Kunth) H. Rob.</p> <p>Colecta: 21828, 74064</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsáhpala'</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>okma</i></p> <p>Usos: Esta planta crece a la orilla de caminos y en cafetales. Es muy común y conocida en la sierra. Las hojas tienen uso medicinal: se hierven y se toma como té para controlar la diarrea y el dolor de estómago (10 hojas/1 litro de agua).</p>

		<p>Asteraceae <i>¿ Eremosis heydeana (J.M.Coult.) Gleason</i></p> <p>Colecta: 22353</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>	
		<p>Asteraceae <i>Xanthium strumarium L.</i></p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74385</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhxtanqala:n</i> (sin interpretación)</p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores, Isac Pérez Núñez, sabía un nombre para esta planta. Comentó que crece a orilla de caminos, no presenta ningún uso.</p>	
			<p>Asteraceae <i>Youngia japonica (L.) DC.</i></p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21356, 74340, 107445</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>klhtakat kaka lawá:n</i> (su.<i>Sonchus oleraceus</i> persona.no.totonaca)</p> <p>Notas: El nombre de esta planta hace referencia a lo que se considera el parecido de esta planta al <i>Sonchus oleraceus</i> aunque a diferencia de <i>S. oleraceus</i> las hojas del <i>Youngia japonica</i> no son comestibles.</p>

		<p>Asteraceae <i>Zinnia elegans</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22139, 74362</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ski:ti: xanat</i> (pez/pescado flor) o <i>xpipile:q xanat</i> (mariposa flor)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xpipileqe xanat</i> (mariposa flor)</p> <p>Notas: Se dejan crecer donde brotan o bien esparciendo las semillas en los solares y terrenos de cultivo. Se aprovecha como ornamental. Se llevan y se ponen en floreros para adorno en el panteón o sobre altares caseros en todos santos.</p> <p>Algunos lo llaman <i>xki:ti: xanat</i> porque los filarios parecen como escamas de pez, como se observa en la última imagen.</p>
		<p>Nota adicional: Tom Croat acompañó al equipo por un día de colecta en Zongozotla. No hay fotos de sus colectas que están por determinar. Los números de las Asteraceae que colectó son: 107370, 107371, 107374, 107414, 107421, 107451 y 107453.</p>	

		<p>Basellaceae <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>o:misalh</i></p>
		<p>Descripción:</p>	<p>Totonaco de Atlequizayán <i>u:misalh</i></p>
		<p>Colecta: 22127, 74173</p>	<p>Cuetzalan Náhuat: <i>omisa:l</i></p>
<p>Notas: El nombre totonaco es un préstamo del náhuat <i>omisal</i> (<i>omi-</i> 'hueso' y <i>sal-</i> 'juntar', 'pegar'). Crece sobre otras plantas herbáceas en orillas de las veredas. El <i>o:misalh</i> es medicinal. Se aprovecha para la desinflamación y torceduras, las raíces modificadas en tubérculos se machacan y se aplican en la zona afectada, apoyado con una venda.</p>			

***xkutni'* / *Begonia* spp.**

El término *xkutni'* se aplica como nombre genérico para todos los *Begonia*. Se relaciona con la palabra *xkut* 'agrio'. Esta asociación entre 'agrio' y *Begonia* es común en varias lenguas mexicanas y se relaciona con el sabor del tallo de estas plantas algunos de los cuales se comen agregándole trozos de *Begonia* a caldo de frijol negro. En Zongozotla la mayoría de las *Begonia* silvestres se comen de esta manera en Zongozotla. En Cuetzalan hasta se vende en los mercados un tipo de *Begonia* comercializada y cultivada.

En el náhuat de la Sierra Nororiental el término para *Begonia* es *xokoyo:lin* que se relaciona con la raíz *xoko-* 'agrio' (cf. *xoko:k* 'agrio'; *xokot*, 'naranja');. En el mixteco de Yoloxóchitl también en término para *Begonia* hace referencia a lo agrio de su tallo: *i³ta² i³ya⁴* (lit., 'flor agrio'). En las tres lenguas y culturas también se conoce una Melastomataceae comestible, *Arthrostemma ciliatum* Pavón ex D. Don, cuyas hojas y tallo son agrios. En el totonaco de Zongozotla se le llama a este *Arthrostemma* como *xkutni tawan* (*Begonia* hierba). En el náhuat de la Sierra Nororiental el mismo Melastomataceae se conoce como *eskina:doh xokoyo:lin* (esquinado *Begonia*) por su tallo cuadrado. Y finalmente, en Yoloxóchitl se llama *ndu³ku² ndu¹xa³² i³ya⁴* literalmente 'vara *ndu¹xa³²* agrio' con la palabra *ndu¹xa³²*, un término que se aplica solamente a los *Arthrostemma* modificado también por *i³ya⁴* 'agrio'.

Hasta el momento se han colectado 8 especies de *Begonia* en Zongozotla y pueblos vecinos. Hay tres colectas por determinar que bien pueden ser repeticiones de lo colectado o bien otras especies no documentadas en este proyecto.

Begonias colectadas en Zongozotla

- *Begonia fischeri* Schrank
- *Begonia fusca* Liebm.
- *Begonia glabra* Aubl.
- *Begonia glandulosa* A. DC. ex Hook.
- *Begonia heracleifolia* Cham. & Schltldl.
- *Begonia incarnata* Link & Otto
- *Begonia manicata* Brongn. ex F. Cels
- *Begonia nelumbiifolia* Cham. & Schltldl.
- *Begonia wallichiana* Lehm.

Otras *Begonia* probablemente existentes en Zongozotla

- *Begonia gracilis* Kunth
- *Begonia ludicra* A. DC.
- *Begonia multistaminea* Burt-Utley
- *Begonia oaxacana* A. DC.





Begoniaceae
Begonia fischeri Schrank

Colecta: 74636

Totonaco de Zongozotla
xkutni'
(< agrio)

Notas: Se llama por el nombre
g nerico solamente. No presenta
ning n uso.


















Begoniaceae
Begonia cf. fischeri Schrank







Colecta: 22250

Totonaco de Zongozotla
xkutni'
(< agrio)








Notas: Se desconoce esta planta.








		<p>Begoniaceae <i>Begonia fusca</i> Liebm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21929</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa chixixi xkutni'</i> (el peludo begonia)</p> <p>Notas: Las hojas y el tallo son muy pubescentes. No tiene uso alguno.</p>	
			<p>Begoniaceae <i>Begonia cf. fusca</i> Liebm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74192</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa pumuma: xkutni'</i> (el suave begonia)</p> <p>Notas : El nombre de esta begonia hace referencia a la pubescencia del tallo que le da un sentir suave. <i>Pumumah</i> es una palabra que refiere a la textura suave, particularmente en cuanto a la piel de algunos animales. Esta begonia no tiene uso.</p>
			<p>Begoniaceae <i>Begonia glabra</i> Aubl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21715, 74556</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stalanqa: tawan (laqa qawás)</i> (transparente hierba [cara de niño])</p> <p>Notas: Hay dos tipos, el otro es de flores con tinte de rosa. Cada variedad tiene la misma aplicación medicinal pero la de flores blancas es para varones y la de flores con tinte rosado para mujeres. Se aprovechan las hojas para tratar las ronchas provocadas por sol o por hongos. Se machan y se aplica la pasta que resulte directamente en la zona afectada. La gente que tiene estas ronchas se aplica esta planta cada vez que vayan al campo y lo encuentren.</p>








			<p>Begoniaceae <i>Begonia glabra</i> Aubl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74557</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stalanqa: tawan (laka tsamá:t)</i> (transparente hierba [cara de niña])</p> <p>Notas: Esta <i>Begonia glabra</i> es la de flores con tinte rosita. Tiene la misma aplicación que el anterior con el solo cambio que esta planta es para mujeres, no hombres.</p>
		<p>Begoniaceae <i>Begonia glandulosa</i> A. DC. ex Hook.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22275</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkutni'</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xaktsihtsiriki puyu</i> (cresta de gallo)</p>	
		<p>Begoniaceae <i>Begonia wallichiana</i> Lehm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22104</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkutni'</i> (< agrio)</p> <p>Notas: Ningún asesor reconoció a esta planta ni en el momento de la colectó lo consideraba un tipo de <i>xkutni'</i> aunque después se aclaró que sí así se debe designar, pero sin más información.</p>	








				
			<p>Begoniaceae <i>Begonia</i> cf. <i>wallichiana</i> Lehm. Colecta: 74617</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido. Notas: Se desconoce esta planta.</p>
<p><i>xkutni'</i> comestibles</p>				
<p>En Zongozotla se acostumbra comer los tallos de tres begonias silvestres</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Begonia heracleifolia</i> Cham. & Schltld. • <i>Begonia manicata</i> Brongn. ex F. Cels • <i>Begonia nelumbifolia</i> Cham. & Schltld. 				
<p>En todos los casos primero se pela la capa superior del tallo que luego se corta en trozos pequeños de 3–5 cm., Luego se hierven los trozos en agua mezclada con cal o sal caliza para reducirle lo agrio. Una vez listos se agregan al caldo de los frijoles enchilados junto con hojas de <i>kuksasan</i> (<i>Peperomia maculosa</i> y <i>P. peltilimba</i>).</p>				
<p>Otro <i>xkutni'</i> comestible es <i>Begonia incarnata</i> pero este caso son las hojas que se usan como condimento a las salsas perparadas al hervir.</p>				







			<p>Begoniaceae <i>Begonia heracleifolia</i> Cham. & Schlttdl.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa spilili xkutni'</i> (el pinto begonia)</p>
<p>Colecta: 21690, 22474, 74040</p>			<p>Cuetzalan Náhuatl: <i>pe:sahxokoyo:lin</i></p>	<p>Náhuatl Zoquiapan <i>takwa:wak xokoyolin</i></p>
<p>Notas: El nombre de esta planta se deriva por el aspecto "pinto" del tallo. Los tallos son comestibles (véase arriba). En Zoquiapan también se comen los tallos con frijoles. Pero además utilizan las hojas que se echan al chilpoonte, una salsa para en que se guisa carne de puerco.</p>			<p>Begoniaceae <i>Begonia manicata</i> Brongn. ex F. Cels</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pixtsatsoqo xkutni'</i> (cuello.rojo begonia)</p>
		<p>Colecta: 21638, 21691, 74526</p>	<p>Cuetzalan Náhuatl <i>teko:seh</i></p>	<p>Notas: El nombre totonaco hace referencia al color del tallo. Los tallos son comestibles (véase arriba).</p>
<p>Foto: 74526</p>			<p>Foto: 21691</p>	







		<p>Foto: 21638</p>		
			<p>Begoniaceae <i>Begonia nelumbifolia</i> Cham. & Schltl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74143</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalaj ka:kiwi:ni xkutni'</i> (los bosque begonia)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>xokoyo:lin</i></p> <p>Notas: Se llama <i>xalaj ka:kiwi:ni</i> porque se concentra más en el monte y no es tan común en lugares cercanos a la comunidad. Así que aunque es de las begonias más codiciadas por sus tallos comestibles requiere se encuentra más lejos del pueblo. Para una discusión de la preparación de sus tallos, véase arriba.</p>
		<p>Begoniaceae <i>Begonia incarnata</i> Link & Otto</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21493, 21571, 21637, 74487</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsihtsiliki xkutni'</i> (sin.interpretación begonia)</p> <p>Notas: La palabra <i>tsiliki'</i> se aplica a hojas partidas o lobuladas en general. Esta planta es comestible pero no se utilizan los tallos que son muy delgados. Pero sí se aprovechan las hojas para darle un toque ácido a las salsas de chile, echandolas en forma completa mientras la salsa esté hirviendo.</p>	







		<p>Betulaceae <i>Alnus acuminata</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21896, 74287</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>mi:t</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>i:lit</i></p>			
<p>Notas: Un término cognado ha sido documentado en Tepetzintla de Galeana (mpio. Huauchinango): <i>'ma:yit</i>. Su habitat es en zonas altamente perturbadas. Donde desmontan es de los primeros especies de crecer. Tiene uso medicinal: La corteza se utiliza para preparar agua que se le aplica en forma de baño para la recuperación de mujeres con recién paridas. Su madera se utiliza para los morillos que van desde la pared al caballete actualmente en casas de cartón y, antes, de zacate. La madera también se utiliza en la fabricación de utensilios de cocina y para leña.</p>					<p>Betulaceae <i>Carpinus tropicalis</i> (Donn.Sm.) Lundell subsp. <i>tropicalis</i></p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21784, 74255</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>yoq</i> (sin interpretación)</p> <p>Notas: Crece en zonas conservadas. Antiguamente se desprendía la corteza del árbol que por su atributo fibroso se creaban distintos calibres de lasos, principalmente para amarrar cercas. No se ha colectado esta especie en otros pueblos totonacos.</p>
		<p>Betulaceae <i>Ostrya virginiana</i> subsp. <i>guatemalensis</i> (H.J.P.Winkl.) A.E.Murray</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21864, 74509</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xwaqpalh</i> (sin análisis)</p> <p>San Juan Tahitic Náhuat <i>tepe:i:li:t</i></p> <p>Notas: La madera maciza se aprovecha como leña y como morillos en las casas de cartón (y antes, de zacate). Pero su uso principal de que las ramas delgadas y flexibles se emplean en la elaboración de los marcos de cunas rústicas y huacales (la palabra regional náhuat para cuna</p>			








			<p>es <i>waka</i>).</p> <p>El término no tiene análisis aunque el elemento <i>-palh</i> se utiliza en el significado verbal de 'barrer con escoba'.</p> <p>No se ha colectado esta especie en otros pueblos totonacos.</p>	
			<p>Bignoniaceae <i>Dolichandra quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G. Lohmann</p> <p>Colecta: 74322, 74622</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmakasiyin wa:yá'</i> (su.garra gavilán)</p> <p>Notas: El tallo de este bejuco se emplea para los marcos que cunas rústicas y para guacales. Hay otro dos bejuco que reciben el mismo nombre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg. • <i>Pisonia aculeata</i> L. <p>En el náhuatl de Tacuapan (mpio. Cuetzalan) un calco se aplica a dos plantas. Unas es la misma <i>Pisonia aculeata</i>; otra es un Leguminosae: <i>Machaerium</i> cf. <i>pittieri</i> J.F.Macbr. ambos llamados <i>kwi:xistit</i>, literalmente gavilán.uña.</p>
				

		<p>Bignoniaceae <i>Dolichandra quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G. Lohmann</p> <p>Colecta: 22426</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. Según Osbel López éste se distingue de <i>D. quadrivalvis</i> por tener el <i>D. unguis-cati</i> las hojas y flores más pequeñas y ser más afin a lugares rocas, trepando sobre estas. Pero aunque se consideró en el campo distinto de las otras dos colectas resulta ser la misma especie.</p>
		<p>Bignoniaceae <i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74126</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puxni'</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>kowxi:lo:t</i></p> <p>Notas: El fruto de este árbol es comestible, se puede ingerir crudo cuando ya está completamente deshidratado. Se corta el fruto y en forma completa se deja secar en sol hasta que ya no le quede jugo. Se pone a hervir, en rajas o completo. Algunos le echan azúcar. Así se come.</p> <p>El mismo nombre <i>puxni'</i> se ha documentado con colectas en Chicontla (mpio. Jopala) y en Mecatlán, Veracruz.</p>
			

		<p>Bignoniaceae <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22456</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. No se ha documentado en otro pueblo totonaco.</p>
		<p>Bignoniaceae <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22116</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. No se ha documentado en otro pueblo totonaco.</p>
		<p>Bixaceae <i>Bixa orellana</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74444</p>	<p>Totonaco de Zongozotla á:waw (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Ecatlán a:wah kiw o a:wah</p> <p>Náhuat de Cuetzalan ma:chiyo:t</p> <p>Notas: Medicinal, se aprovechan únicamente las semillas, se espera a que el fruto quede completamente seco y posteriormente se les extrae las semillas, estas se echan en alcohol</p>



			<p>y se dejan reposar unas 8 horas (48 semillas/1 litro de alcohol). Una vez listo se unta en todo el cuerpo para personas que padecer de sarampión, entre tres o cuatro veces al día.</p> <p>No se usa con ningún fin de pintar o colorear.</p>
		<p>Boraginaceae <i>Heliotropium angiospermum</i> Murray</p> <p>Colecta: 22109, 22156</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. No se ha documentado en otro pueblo totonaco.</p>
			

		<p>Boraginaceae <i>Lithospermum</i> sp.</p> <p>Colecta: 22437</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>ma:xaxakachxo:chit</i></p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. No se ha documentado en otro pueblo totonaco. El nombre náhuat hace referencia (<i>xaxakachtik</i>) a lo rasposo de las hojas pubescentes.</p>
		<p>Boraginaceae <i>Nama</i> cf. <i>linearis</i> D.L. Nash</p> <p>Colecta: 22106</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno. No se ha documentado esta especie en otro pueblo totonaco. Pero si se ha colectado <i>Nama jamaicensis</i> L. en Mecatlán y Zihuateutla. En este último pueblo se llama <i>xlikuchupix</i> (x-likuchu-pix; su-medicina-mezquino). Es medicinal y los frutos se usan para tratar a los mezquinos.</p>
		<p>Boraginaceae <i>Tournefortia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21802</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se han hecho colectas de 4 especies de <i>Tournefortia</i> en Zongozotla y pueblos vecinos. Para ninguno se ha proporcionado ni nombre ni uso. Es posible que todas las colectas en esta guía sean de la misma o de dos, tres o cuatro especies. Sin embargo ninguno tiene nombre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tournefortia acutiflora</i> Mart. & Gal. • <i>Tournefortia bicolor</i> Sw. • <i>Tournefortia hirsutissima</i> L. • <i>Tournefortia mutabilis</i> Vent.

		<p>Boraginaceae <i>Tournefortia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21927</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase nota anterior.</p>	
			<p>Boraginaceae <i>Tournefortia</i> sp.</p> <p>Colecta: 74623</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase nota anterior.</p>
		<p>Boraginaceae <i>Tournefortia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74579</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase nota anterior.</p>	

***Varronia spinescens* (L.) Borhidi**

El mismo nombre, *qalhni: miya:k* ('sangre bejuco'), que se aplica a esta planta en Zongozotla se le da en Tepetzintla de Galeana, pueblo totonaco en el municipio de Huauchinango obviamente por lo llamativo de la savia rojizo de esta planta. Se le da un uso medicinal casi igual: sirve para combatir los bichos. Se toma como agua de tiempo, se prepara en té. Se utiliza en contra la amebiasis ó disentería (*taqalh ni' stintit*, 'disentería'). Un cognado de este nombre se aplica en Patla (mpio. Jopala): *ha'lhni:ma:yá:k*. En este pueblo también las hojas se utilizan para curar la disentería (diarrea). La misma especie se ha colectado en Coahuilán y Mecatlán, pueblos totonacos en Veracruz cerca de la frontera con la Sierra Norte/Nororiental de Puebla. En Mecatlán se le llama *xliskakni xtila:n* (su. (instrumento.para.secar). El sustantivo poseído se compone de *x-* (3a persona poseedor, 'su'), el instrumental *li-*, el verbo *skak* ('secar o sanarse [una herida]'). Finalmente *xtila:n* significa 'gallina'. En muchos pueblos tanto nahuas como totonacos de las sierra una derivación de Castilán se utiliza para significa 'gallina'. El nombre hace referencia a la utilización de esta planta para aliviar o curar, en forma de baño, la varicela entre los niños. El nombre de la varicela de por si tiene relación con pollos ya que es *kxpupunut toqnó'* (su.grano clueca) 'grano de clueca'. El nombre de la *Varronia* hace referencia a la gallina como tropo para la varicela. En Coahuilán se le llama *xlitsanqa:n xtila:n* (su.intrumento.para.que.se.pierda gallina; el verbo base del sustantivo parece ser un cognado de *tsanqá:y* 'perderse'). Podría ser que el nombre tiene relación con la varicela ya que parte del nombre es también *xtila:n*. Pero su uso medicinal es distinto, más relacionado con los usos reportados en otros pueblos: las hojas se prepara una infusión (virtiendo agua hervida sobre la planta) para producir un té que se usa para tratar la diarrea.



Boraginaceae
Varronia spinescens (L.) Borhidi


Descripción:

Colecta: 74133

Totonaco de Zongozotla

qalhni: miya:k
(sangre bejuco)

Notas: El nombre se deriva de la savia roja que sale de este arbustivo de corte un tallo. Es medicinal, se aprovechan los tallos y raíces en té, para el tratamiento contra la diarrea o disentería. Se hierben aproximadamente tres trozos de tallo de 10 cm por cada litro de agua.



Brassicaceae
Brassica rapa L.

Descripción:

Colecta: 74516

Totonaco de Zongozotla









ku:lax
(sin análisis pero quizá préstamo del español 'col')









Notas: Comestible, las hojas se provechan como condimento para distintos platillos.

En Tepetzintla de Galeana se llama '*kulax wan xana*. Comentó el asesor que se come con tortillas.

La palabra *ku:lax* se aplica a varias especies de Brassicaceae con hojas comestibles que se dice sabe a col. Podría ser que la palabra totonaca es un préstamo del español.

Véase *Rapistrum rugosum* (L.) All.

		<p>Brassicaceae <i>Brassica oleracea</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22191</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ku:lax</i> (sin análisis pero quizá préstamo del español 'col')</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>ku:lax</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: Probablemente <i>B. rapa</i> pero con flores blancas. Es comestible. Las hojas se provechan como condimento para distintos platillos.</p>	
			<p>Brassicaceae <i>Cardamine occulta</i> Hornem. (sinónimo <i>C. flexuosa</i> With.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74356, 74358</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puxqa: tawan</i> (arroyo hierba)</p> <p>Notas: Tiene nombre pero no se le ha documentado ningún uso. En una colecta los asesores comentaron que hay dos tipos, este (hablando de la colecta #74358) que es de color verde opaco y otro de color verde transparente. Podría ser variaciones dentro de la misma especie.</p>
				

		<p>Brassicaceae <i>Cardamine</i> sp.</p> <p>Colecta: 21502</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puxqa: tawan</i> (arroyo hierba)</p> <p>Notas: Aunque tiene nombre no tiene uso reportado. Es posible que sea la misma especie, <i>C. occulta</i>, que las dos colectas anteriores.</p>	
			<p>Brassicaceae <i>Lepidium virginicum</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74553</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
			<p>Brassicaceae <i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton</p> <p>Colecta: 74640</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>peroh kak</i> (sin.análisis quelite)</p> <p>Notas: <i>Peroh</i> no tiene interpretación ni otro significado menos en referencia a esta planta. Quizá proviene de una palabra española (¿berro?). Se conoce un tipo de esta planta que crece a orilla de ríos y arroyos. Las hojas son comestibles (por eso se clasifica como un <i>kak</i>, 'quelite'), y se preparan las hojas guisadas o en caldo.</p>

			<p>Brassicaceae <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22443</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ku:lax</i> (sin análisis pero quizá préstamo del español 'col')</p> <p>Totonaco de Atlequizayán Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Es comestible. Como la <i>Brassica rapa</i>, las hojas se provechan como condimento para distintos platillos. Véase <i>Brassica rapa</i> L.</p>
--	--	--	---	--

Bromeliaceae

Epífitas

Los nombres de la gran mayoría de Bromeliaceae epífitas, que excluye las plantas de la subfamilia *Pitcairnioideae* (que son terrestres y rupícolas), incluye una referencia a 'su bebedero' (*xpu:qotno*) con el 'poseedor' siendo uno de dos animales principales

- lagartija (*slaluk*)
- tejón (*xkut*)

Aparentemente la distinción se base en el tamaño de la planta, particularmente las hojas: las largartijas "beben" de plantas de menor tamaño que los tejones. Se dice "bebedero" pero es posible que aparte de agua para beber los animales buscan a insectos y otras presas pequeñas entre los huecos donde las hojas se juntan con el tallo principal. Según han comentado algunos asesores han visto a tejones, largartijas, ardilla y víboras frecuentar estos lugares. También se ha observado que algunos pájaros ahí se bañan.

Un estudio preliminar sugiere que las Bromeliaceae llamadas 'bebedero de lagartija' se concentran en los *Catopsis* sp. (o quizá sea más de una especie) y algunas *Tillandsia* (*Tillandsia filifolia* Schldl. & Cham., *Tillandsia juncea* (Ruiz & Pav.) Poir. que se caracterizan por hojas muy largas y delgadas.

Mientras tanto, las Bromeliaceae clasificadas como 'bebedero de tejón' son de los género *Aechmea*, *Pseudalcantarea* y, particularmente, *Tillandsia*.

Finalmente, un asesor en particular, Sebastián López Cano, utilizaba también el término *xpu:qotno stayi* ('bebedor de ardilla') para dos *Tillandsia* de hojas delgadas (*Tillandsia limbata* Schldl. y otra todavía no identificada, #22382). Al dar este nombre comentó que ha visto a las ardillas tomar agua de estas Bromeliaceae.

Terrestre y rupícolas

Se han hecho 6 colectas de Bromeliaceae terrestres y rupícolas, abarcando un total de 4 especies:

- *Pitcairnia amblyosperma* L.B. Sm.
- *Pitcairnia* cf. *densiflora* Brong. ex Lem.
- *Pitcairnia imbricata* (Brongn.) Regel.
- *Pitcairnia ringens* Link, Klotzsch & Otto

En 4 de las colectas se les dio el nombre de *xli:xtaq tsank^wan* (su.bastón San.Juan) y es muy probable que este nombre se aplique a todos los *Pitcairnia* y su ausencia en algunas colectas es por falta de rigor en la anotación de datos o bien omisiones de los asesores. Un señor de Zongozotla, Mariano Franciso Hernández comentó que los *Pitcairnia* se llaman *xtso:qot tsank^wan* (su.pene San Juan) por la forma de la planta y su inflorescencia. En particular se considera que la *Pitcairnia* más común (dizque prototípico) es el *Pitcairnia* cf. *densiflora* Brong. ex Lem. y si tiene parecido

a un pene.

Usos: El único uso que se le da a los Bromeliaceae en Zongozotla es como ornamental vivo en los jardines de las casas. En cuanto a las pequeñas si brotan por casualidad o naturalmente se dejan crecer para embellecer el jardín. Pero también mucha gente cuando van al bosque y encuentran una Bromeliaceae grande y llamativa, como algunas Tillandsia, las traen para colocar sobre un árbol. No se ponen en macetas.

Comparativo

En Mecatlan y Coahuilán (Veracruz) se hicieron dos colectas de *Pitcairnia amblyosperma* L.B. Sm. En Mecatlán el asesor no le tenía nombre pero el asesor de Coahuilán comentó que la planta crece en paredes rocosas pero no present ningún uso. Sin embargo tenía un nombre para la planta: *kilhwantalaqaju:y*. Este nombre se le aplica más comúnmente a una orquídea muy conocida en la región (y de que hay una historia o cuento): *Sobralia macrantha* Lindl. Un cognado de este término también fue utilizada en Chicontla para la misma especie, *P. amblyosperma*.

En Tepetzintla de Galeana se colectó una *Catopsis* que fue llamado *taqoxni xanat* ('trenza flor'). En el español local se llama 'flor de trenza' pero no se sabe si la dirección de préstamo fue del totonaco al español o viceversa. Lo utilizan como adorno en las cruces durante la semana santa. Finalmente se colectó una Tillandsia en el mismo pueblo. Fue llamado *maqskat xanat*. En Zongozotla un término parecido, makskat xanat, se usa para designar al *Bejaria aestuans* L. (Ericaceae).


Finalmente en los pueblos de habla náhuatl de las sierras norte y nororiental de Puebla hay poca evidencia de influencia totonaca en la nomenclatura. Pero una posible es el nombre *ko:nsolkakawat* para una *Tillandsia*. El término contiene las raíces *ko:n-* ('olla') y *-sol* ('viejo') de esta forma reconociendo la forma como recipiente de la planta. Pero no se documentó ningún creencia u observación acerca de animales que podrían tomar agua de los huecos que se forman donde las hojas se juntan.









xpu:qotno slaluk / bebedero de lagartija



<p>Bromeliaceae <i>Catopsis sessiliflora</i> (Ruiz & Pavon) Mez</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22015</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (su.bebedero lagartija)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no elaborado.</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
--	---









			<p>Bromeliaceae <i>Catopsis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74218</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (su.bebedero lagartija)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>po:po:yoh</i></p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
			<p>Bromeliaceae <i>Catopsis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74220</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (su.bebedero lagartija)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>po:po:yoh</i></p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
		<p>Bromeliaceae <i>Catopsis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21999</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (su.bebedero lagartija)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	

		<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia filifolia</i> Schltdl. & Cham.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (su.bebedero lagartija)</p>	
		<p>Colecta: 21852, 74098</p>	<p>Cuetzalan Náhuat <i>po:po:yoh</i></p>	
<p>Notas: Véase texto introductorio.</p>			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia juncea</i> (Ruiz & Pav.) Poir.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (su.bebedero lagartija)</p>
<p>Colecta: 21824, 74091</p>	<p>Tipos: Hay varios tipos, sin más especificación.</p>	<p>Usos: Sin uso.</p>		








			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22333</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno slaluk</i> (bebedero de lagartija)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
<i>xpu:qotno xkut</i> / bebedero de tejón			<p>Bromeliaceae <i>Aechmea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22241</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (su.bebedero tejón)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
		<p>Bromeliaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22408</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (su.bebedero tejón)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xpu:qotno xkuti'</i> (su.bebedero tejón)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
				






			<p>Bromeliaceae <i>Pseudalcantarea grandis</i> (Schltdl.) Pinzón & Barfuss</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (su.bebedero tejón)</p>
			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia gymnobotrya</i> Baker</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (bebedero de tejón)</p>
			<p>Colecta: 21625</p>	<p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
			<p>Colecta: 21648</p>	<p>Notas: Véase texto introductorio.</p>





		<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia leiboldiana</i> Schlttdl.</p> <p>Colecta: 22016</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (bebedero de tejón)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia punctulata</i> Schlttdl & Cham.</p> <p>Colecta: 21518</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (bebedero de tejón)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia schiedeana</i> Steud.</p> <p>Colecta: 21767</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno xkut</i> (bebedero de tejón)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
<i>xpu:qotno stayi'</i> / bebedero de ardilla				

		<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia limbata</i> Schlttdl.</p> <p>Colecta: 74102</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno stayi'</i> (su.bebedero ardilla)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22382</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:qotno stayi'</i> (su.bebedero ardilla)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan magueyito (nombre español)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
<i>xli:xtoq tsank^wan</i> / bastón de San Juan				
			<p>Bromeliaceae <i>Pitcairnia amblyosperma</i> L.B. Sm.</p> <p>Colecta: 22108</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>

			<p>Bromeliaceae <i>Pitcairnia</i> cf. <i>densiflora</i> Brong. ex Lem.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22007, 74678</p> <p>Foto: 2207</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>
		<p>Foto: 74678</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:xtoq tsank^wan</i> (su.bastón San.Juan)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
			<p>Bromeliaceae <i>Pitcairnia imbricata</i> (Brongn.) Regel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74228</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:xtoq tsank^wan</i> (su.bastón San.Juan)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>

		<p>Bromeliaceae <i>Pitcairnia imbricata</i> (Brongn.) Regel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21996</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:xtoq tsank^wan</i> (su.bastón San.Juan)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
		<p>Bromeliaceae <i>Pitcairnia ringens</i> Link, Klotzsch & Otto</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21791</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:xtoq tsank^wan</i> (su.bastón San.Juan)</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
sin nombre				
			<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21844</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>

		<p>Bromeliaceae <i>Tillandsia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22019</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Véase texto introductorio.</p>	
			<p>Brunelliaceae <i>Brunellia mexicana</i> Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22092, 74141, 107399</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qa:xi: kiwi'</i> (jícara árbol)</p> <p>Totonaco de Nanacatlán <i>qaxi: kiwi'</i> (jícara árbol)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>la:qax kiwi'</i> (quetzal árbol)</p> <p>Notas: Este árbol se utilizaba para la elaboración de bancos y escaleras rústicas, asimismo, se elaboraban bandejas y artesas de amasar con el tallo de este árbol. Aunque a una distancia significativa, en Nexpan y Ahuatepec (mpio. Hueyapan) se documentó un calco como nombre de este árbol: <i>kwetsalkowit</i>. Solamente sirve para leña ya que no crece derecho. Nadie mencionó si los pájaros comen las semillas.</p>

		<p>Burmanniaceae <i>Apteris aphylla</i> (Nutt.) Barnhart ex Small</p> <p>Descripción</p> <p>Colecta: 22061 (col. Xochitlán)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido alguno.</p>
		<p>Burseraceae <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74060</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tasan</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Nanacatlán <i>tusun</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan <i>chakaykowitz</i></p> <p>Notas: En Zongozotla se aprovecha como cerca viva en los potreros. También se puede usar para leña. Nombres cognados para este árbol se han documentado en Chicontla (<i>ta'sú'n</i>) y Mecatlán (<i>tusu:n</i>).</p>








ta:ji xanat ('flor de rayo')*: *Disocactus*, *Epiphyllum* y *Selenicereus (Hylocereus)








En Zongozotla las Cactaceae se dividen en tres grupos principales que representan o captan diferencias significativas en la morfología de las especies de esta familia:

- *ta:ji xanat* (rayo flor; *Disocactus*, *Epiphyllum* y *Selenicereus [Hylocereus]*)
- *xtasi:n chichini'* ('cuerda del sol'; *Rhipsalis* y *Kimnachia [ex Pseudorhipsalis]*)
- *a:xilh* (los nopales, *Opuntia* spp.)

Aparte se ha documentado una *Mammillaria*, pero no le tienen nombre en Zongozotla, quizá porque es una Cactaceae poco común.

El primero grupo se llama *ta:ji xanat* que significa 'flor de rayo', compuesto de las palabras *ta:ji* 'rayo' y *xanatl* 'flor'. Se conocen para un solo nombre pero está muy presente que varían por el color de las flores. Las cuatro especies hasta ahora clasificadas en este grupo son cactaceas epífitas y rupícolas (creciendo sobre árboles y rocas). Se caracteriza por flores muy llamativas, muchas de las cuales se abren de noche y cierran la madrugada y se polinizan por murciélagos. Las *ta:ji xanat* son silvestres pero mucha gente las trae a sus casas para colocarlas como ornamentos vivos. Se puede propagar por esqueje (trozos) que se empotran en tierra para que echen raíces. Mucha gente las comparte de esta manera. Una especie, *Selenicereus spinulosus* (DC.) Britton & Rose, fue considerada algo periférico a los *ta:ji xanat*: en el momento de la colecta no recibió nombre pero se comentó que parecía a los *ta:ji xanat* así conocidas. El *Selenicereus spinulosus* no es tan común, aparentemente, como el *Selenicereus undatus* (Haw.) D.R. Hunt.

		<p>Cactaceae <i>Disocactus ackermannii</i> (Haw.) Ralf Bauer</p> <p>Colecta: 21930, 74618</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:ji xanat</i> (rayo flor)</p> <p>Totonaco de Tonalixco <i>yixi: xana'</i> (? flor)</p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>	
				
			<p>Cactaceae <i>Disocactus phyllanthoides</i> (DC.) Barthlott</p> <p>Colecta: 21843 f</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:ji xanat</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>

		<p>Cactaceae: <i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.</p> <p>Observador pero no colectado</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:ji xanat</i></p> <p>Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido o <i>yowalxo:chit</i></p> <p>Notas:</p>	
			<p>Cactaceae <i>Selenicereus undatus</i> (Haw.) D.R. Hunt. (sinónimo de <i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose)</p> <p>Colecta: 74679</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:ji xanat</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
				

			<p>Cactaceae <i>Selenicereus spinulosus</i> (DC.) Britton & Rose</p> <p>Colecta: 22462</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido pero se comentó que por la forma de las flores se conoce como <i>ta:ji xanat</i>.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>tepe:mekat</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
---	---	--	--	---

***xtasi:n chichini'* ('cuerda del sol'); *Rhipsalis* y *Kimnachia* (ex *Pseudorhipsalis*)**

El segundo grupo de Cactaceae en Zongozotla se llama *xtasi:n chichini'* (su.látigo sol). Abarca dos especies, *Kimnachia ramulosa* (Salm-Dyck) S. Arias & N. Korotkova y *Rhipsalis baccifera* (J.S. Mueller) Stearn que son bastante parecidas en morfología (véanse fotos). De hecho el género llamado *Kimnacia* es monotípico; incluye solamente el antes llamado *Pseudorhipsalis ramulosa* (Salm-Dyck) Barthlott cuyo nombre de género indica claramente su parecido al *Rhipsalis*. Así no es de sorprender que las dos especies reciben en mismo nombre en Zongozotla.

Usos: Los tallos se aprovechan para que machucados alivian enfermedades de la piel. Este uso ha sido reportado en la colecta del *Rhipsalis*. Había que confirmar que el mismo uso se aplica al *Kimnachia*. Aunque las dos especies reciben el mismo nombre los asesores si distinguen entre ellas por lo cuadrado del tallo del *Kimnachia*.

Comparativo: En Zongozotla estas dos especies se llaman *xtasi:n chichini'* ('cuerda del sol'; *Rhipsalis* y *Kimnachia* [ex *Pseudorhipsalis*]). En otros pueblos totonacos también algunos nombres hace referencia a látigos o colas. En Chicontlan se llama *i'staján kawa:yúj* (su.cola caballo) mientras que en el pueblo vecino, Zihuateutla, se llama *staján páru* (su.cola burro). En Ecatlán se llama *xli:tasnokna: tehe:n* (su.látigo rayo) Los asesores comentaron que los niños no lo deben tocarlo porque les puede pegar un rayo. En Patla el nombre de esta cactacee tiene el mismo significado: *i'xli:ta:snó'hnu' ta:'jín*. 'Su látigo' es una traducción general para *xli:tasnokna: / i'xli:ta:snó'hnu'*. El primer elemento es *ix-/x-* que es el posesivo de tercera persona ('su') y el sustantivo se compone del prefijo derivacional instrumental *li:-*, y un nominalizador *-nV*. El verbo principal se compone de dos elementos *tas/ta:s* 'nalgas' y *snok/sno'h* 'dar látigos'. Así estas cactáceas son el látigo o vara flexible para azotar las nalgas que es propiedad de los rayos. Finalmente, en Nanacatlan *xtlaqtla spu:n* (su.elote pájaro).

En resumen hay, entonces dos (grupos de) nombres principales. El primero refiere a látigos, varas flexible, mecates que son de los rayos o el sol. El segundo refiere a colas de bestias (caballos y burros). El Nanacatlán su nombre hace referencia al fruto, quizá, considerado como maíz. Es de notar que el significado 'el elote del pájaro' se aplica en Zihuateutla (*ixta'qtza'q spu:n*) y Nanacatlán (*xtlaqtla spu:n*) a *Anthurium scandens*. Es de notar que en Cuetzalan el nombre común para *A. scandens* es *ma:sakatao:l* 'maíz del duende' y que un asesor de San Miguel Tzinacapan una vez dió este mismo nombre, *ma:sakatao:l*, al *Rhipsalis baccifera*.

Usos: Los frutos son comestibles y aparentemente en todos lados se comen. En Ecatlán tienen la creencia que si un niño toca uno, corre el peligro de ser pegado por un rayo. Se han reportado dos usos medicinales. En Patla se usa como cataplasma para aliviar dolores de piel. Finalmente, en Zongozotla también se reporta este uso, se aprovechan los tallos para tratar las enfermedades de la piel provocado por la insolación, hongos o por alguna otra vía, se machacan los tallos y se aplica en la piel infectada.


			<p>Cactaceae <i>Kimnachia ramulosa</i> (Salm-Dyck) S. Arias & N. Korotkova</p> <p>Colecta: 22155</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtasi:n chichini'</i> (cuerda de sol)</p> <p>Usos:</p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
		<p>Cactaceae <i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Mueller) Stearn</p> <p>Colecta: 21573, 74032</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtasi:n chichini'</i> (cuerda de sol)</p> <p>Náhuat de Cuetzalan: <i>mo:sa:sa:lowa:ni</i> (Tacuapan)</p> <p>Notas: Para el uso medicinal, véase texto introductorio.</p>	

a:xilh (sin análisis): Opuntia spp.

El último grupo clasificatorio de cactáceas en Zongozotla son las *Opuntia*. Las dos especies que se han colectado se han designado como *a:xilh*. En este proyecto todavía no se ha colectado muchas cactáceas en otros pueblos totonacos y casi todas han sido de una sola especie: *Rhipsalis baccifera* (J.S. Mueller) Stearn. Tampoco se han colectado otras especies de cactáceas en Zongozotla que podría ampliar las referentes del término *a:xilh* a otros géneros que no fueran *Opuntia*.




Comparativo: Existen unos datos publicados que sugieren que el término *a:xilh* y cognados es ampliamente usado en lenguas totonacas para referirse a los *Opuntia* o nopales. En Papantla el término *a:xi:t* es glosado como 'nopal' [4] y en Chicontla/Patla el término *a:xi:lh* es glosado como *Opuntia* spp. Dado la gran distancia entre estos pueblos la evidencia sugiere que esta palabra proviene de una proto-lengua de bastante antigüedad. La palabra en tepehua de Pisaflores para 'nopal' es *ukxdak'án* que sugiere que quizá *a:xilh* no se reconstruye a proto-Totonaco-Tepehua (aunque se necesitará más estudio).

Usos: En Zongozotla se conocen un tipo de esta planta que crece en sitios abiertos y rocosos. Comestible, se prepara guisado con verduras y carne.

			<p>Cactaceae <i>Opuntia lasiacantha</i> Pfeiff.</p> <p>Colecta: 21902</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:xilh</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>
		<p>Cactaceae <i>Opuntia cochenillifera</i> (L.) Mill.</p> <p>Colecta: 74594</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:xilh</i></p> <p>Notas: Véase nota introductoria.</p>	

***Mammillaria* spp.**

Se ha colectado solamente una *Mammillaria* en la Sierra Nororiental y Norte de Puebla y no hay suficiente evidencia si existe un nombre para este género. Sería interesante investigar la flora en pueblos totonacos de tierras más cálidas para determinar la nomenclature y clasificación que podría usarse para los *Mammillaria*.

		Cactaceae <i>Mammillaria wiesingeri</i> Boed.	Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.
		Colecta: 22302	

Calceolariaceae: *Calceolaria* spp.

Solamente dos especies de *Calceolaria* han sido documentado en el estado de Puebla: *Calceolaria mexicana* Benth. y *Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav. Una tercera especie (*Calceolaria chelidonioides* Kunth) ha sido encontrado en los estados vecinos de Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí y por eso es posible que se encuentre también en Puebla. Las dos especies tienen flores muy distintivas a las flores de otros géneros. La manera más fácil de distinguirlos es por las hojas. En *C. mexicana*, una planta decumbente que no crece más de 40 cm; *C. tripartita* es una planta más erecta, de 25 a 150 cm. con hojas muy disecadas que hasta parecen hojas compuestas.

La *Calceolaria mexicana* es una de dos plantas que recibe el nombre de *tlantana: tawan* (hierba pateadora): *Aristolochia* cf. *variifolia* Duch. y *Calceolaria mexicana* Benth. Tienen el mismo uso y preparación que se documenta en la entrada de cada una de estas plantas. Cada planta tiene una variante para aliviar a las mujeres pateadas por los hombres y otra para los hombres pateados por mujeres. En las dos especies la planta con las hojas más verdes es para tratar a los hombres (por eso se llama *laqa qawa:s*, 'cara de muchacho') y la otra con hojas más moradas es para tratar a las mujeres (por eso le dicen *llaka tsamá:t*, 'cara de muchacha'). El artículo de Landrum y McVaugh [12] específicamente menciona que a veces las hojas de *C. mexicana* tienen tinte morado por el envés. Todavía no se tiene datos si la misma variación de color de las hojas se encuentra en *Aristolochia valiifolia*.

			<p>Calceolariaceae <i>Calceolaria mexicana</i> Benth.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21709, 74571</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tlantana: tawan (laqa qawa:s)</i> (pateadora hierba [cara de muchacho])</p> <p>Notas: Es medicinal, se utiliza como remedio cuando una mujer recibe una patada de alto impacto por un hombre. Se machaca la planta y luego triturada la planta se pone en agua y se deja reposar por una noche. La paciente se toma el extracto reposado en ayunas. Hay otra planta que recibe el mismo nombre; véase <i>Aristolochia</i> cf. <i>variifolia</i> Duch.</p>
		<p>Calceolariaceae <i>Calceolaria tripartita</i> Ruiz & Pav.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21459, 74534</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xtoq xu:tax</i> (su.bolso judas)</p> <p>Notas: Crece a orilla de caminos y suelos muy húmedos, no presenta ningún uso.</p>	
		<p>Campanulaceae <i>Centropogon grandidentatus</i> (Schltdl.) Zahlbr.</p> <p>Colecta: 21875</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido.</p>	






Lobelia cardinalis L. y hemorragias nasales

La asociación de *Lobelia cardinalis* con hemorragias nasales es extensa en los pueblos totonacos y (por lo menos en el municipio de Cuetzalan) y nahuas de las sierras Norte y Nororiental de Puebla. Siempre que hay un nombre o creencia/uso en común entre pueblos de lenguas no relacionadas surge la pregunta acerca de que lengua/cultura es el original y que lengua/cultura tomó el término o creencia/uso como préstamo. Cuando el intercambio es de una palabra el propio análisis lingüístico generalmente proporciona evidencias sobre una u otra dirección de préstamo. En casos como este, el análisis de orígenes es más complicado. A primera vista parece que es más probable que la asociación de esta planta con las hemorragias nasales es de origen totonaco. La creencia se reporta en muchos pueblos y el nombre es más compartido. Algo interesante entre los nahuas del municipio de Cuetzalan es que aunque la creencia se ha comentado entre casi todos los entrevistados acerca de esta planta, que es muy común en terrenos abiertos y perturbados, no parece haber un nombre compartido. Más bien al ser preguntado acerca de un nombre para *L. cardinalis* los hablantes de náhuatl(o) o bien no tienen un nombre o dan un nombre que parece una explicación del efecto de la planta. Así se ha documentado *te:ekaeski:xtia:ni* literalmente 'la que provoca hemorragia nasal a la gente' y nombres cercanos: *te:ekaeski:xtia* , *te:yekatsoleski:xtia* y *yekaeski:sani*).

En todos los pueblos totonacos existe la creencia de que la *L. cardinalis* provoca hemorragia nasal. Los nombres que se han reportado en estos pueblos son los siguientes:

Comunidad	Término	Análisis y significado
Zongozotla	<i>xmaqaxqaa:nat chichini'</i>	x-ma-qa-xqaa:nat chichini' su-causativo-?-luz(solar) sol rayos del sol o ma:qanqa-chuwa-tná' causativo-nariz-fluir-nominalizador provoca hemorragia nasal
Ecatlán	<i>lima:qanqa:cha:watna'</i>	li-ma:-qanqa-cha:wa-tna' instrumental-causativo-nariz-fluir-nominalizador lo que provoca hemorragia nasal
Nanacatlán	<i>ma:qanqachawatna'</i>	ma:-qanqa-chawa-tna' causativo-nariz-fluir-nominalizador provoca hemorragia nasal
Coahuatlán	<i>li:qantastajni'</i>	li:-qanta-staj-ni' instrumental-nariz-fluir-nominalizador lo que hace hemorragiar la nariz
Zihuateutla	<i>li:qenqastajkán</i>	li:-qenqa-staj-kán instrumental-nariz-fluir-nominalizador

Finalmente en Zongozotla existe un remedio a las hemorragias, que son periodicas, así provocadas en los niños. Al momento de sacrificar un cerdo, casi siempre en la madrugada, al estarle quitando los pelos y pezuñas con fuego se levanta al niño que padece de hemorragias nasales y se le pone una pezuña de cerdo en la nariz. Este proceso se sigue cada que sacrifican un cerdo hasta que el niño quede totalmente curado.

			<p>Campanulaceae <i>Lobelia cardinalis</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21375, 74176</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmaqaxqaqa:nat chichini'</i> (su.rayo sol) o <i>ma:qanqachuwatná'</i> (caus.nariz.fluir.nomlz)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>te:ekaeski:xtia:ni</i></p> <p>Notas: Esta planta no tiene uso pero se cree que al tocar la se le provoca a uno, particularmente a los niños, una hemorragia. Por eso se les prohíbe a los niños que la jueguen. En los pueblos nahuas del municipio de Cuetzalan se tiene la misma creencia y por eso algunos llaman al <i>L. cardinalis</i> como <i>te:ekaeski:xtia:ni</i> 'lo que le provoca hemorragia de sangre por la nariz'.</p>
		<p>Campanulaceae <i>Lobelia laxiflora</i> Kunth subsp. <i>laxiflora</i></p> <p>Colecta: 21392, 74000</p> <p>Descripción:</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqstah tawan</i> (gotear hierba)</p> <p>Notas: El nombre hace referencia al latex de esta planta que sale luego que se rompe el tallo. De uso solamente se aprovecha como forraje para conejos: se corta y se lleva a los conejos domésticos. Nombres cognados se han documentado en Tonalixco (<i>laqstan</i>) y Tepetzintla de Galeana (<i>laqstaj</i>).</p>	

Lobelia spp. xcha:lasa tsikts

Aparte de las dos *Lobelia* descritas arriba (*L. cardinalis* y *L. laxiflora*) que son muy distintivas y comunes se encuentra otras siete especies (de 8 colectas) que son menos distintivas, por lo menos a primera vista. Algunas reciben el nombre de *xchá:lasa tsikts* ('pata de ave') y otras no han recibido ningún nombre. Durante las colectas 21370, 21703, 21717 y 22203 ningún asesor presente tuvo un nombre para la *Lobelia* colectada (un promedio de 2 asesores en cada colecta).

Pero para otras colectas los asesores si tuvieron un nombre, y en algunos casos un uso (comestible) para las plantas. El nombre general es *xchá:lasa tsikts* (su.pata pájaro). Una colecta recibió el nombre modificado de *xalak tlanka xcha:lhasa tsikts* con la calificación de *xalak tlanka* ('los grandes') para indicar que esta especie se consideraba una variedad grande de *xcha:lhasa tsikts*. La siguiente tabla muestra la información obtenida:

# de colecta	nombre dado	# de asesores que tuvieron nombre	comentarios
21501	xchá:lasa tsikts	1 asesor de 2 tuvieron nombre para la planta	Reconoce 1 tipo. Crece en la orilla del camino y cafetal. Se consumen las hojas de forma cruda.
21830	xcha:lasa tsikts	2 asesores de 3 tuvieron nombre para la planta	No uso descrito.
74329	xcha:lasa tsikts	3 asesores de 3 tuvieron nombre para la planta	Conocen dos tipos de esta planta que crece en sitios abiertos con suelo húmedo, el otro es de flores más grandes. Comestible, se aprovechan las hojas y los tallos tiernos, se puede preparar en forma de caldo, se hierven las hojas con sal al gusto, también se pueden ingerir las hojas crudas con un taco.
74465	Xalak tlanka xcha:lhasa tsikts	1 asesor de 3 tuvo nombre para la planta	<i>Xalak tlanka xcha:lhasa tsikts</i> se interpreta como patas de pájaro grande, proviene de las palabras, <i>xalak</i> de, los, <i>tlanka'</i> grande, alto, <i>cha:lasa'</i> patas de ave y <i>tsikts</i> pájaro, ave. Conocen dos tipos de esta planta que crece en sitios abiertos con suelo húmedo, el otro es de flores más pequeñas. No presenta ningún uso.

En resumen, no está claro cuales características motivan la clasificación de algunas *Lobelia* como *xchá:lasa tsikts*. Viendo todas las colectas no es obvio y quizá se tiene que seguir con entrevistas más enfocadas a esta pregunta con los asesores principales. Lo que si queda claro es que cuando se designa a una *Lobelia* como *xchá:lasa tsikts*. Como en general las *Lobelia* colectadas con asesores de Zongozotla pero en pueblos circunvecinos no recibieron el nombre *xcha:lasa tsikts* puede ser simplemente por ser especies afines pero morfológicamente distintas a las que se conocen en tierras propiamente dichas de Zongozotla.



Campanulaceae
Lobelia sp.

Descripción:

Colecta: 21717, 74465

Totonaco de Zongozotla
xalak tlanka xchá:lasa tsikts
(los grandes sus.patas ave)





Notas: Entre los asesores presentes para la colecta 74465, solamente uno, Isac Pérez Núñez, entre los presentes en la colecta #74465 tuvo un nombre para esta planta.

La llamó *xalak tlanka xcha:lhasa tsikts* ('la planta pata de pájaro que es grande'). Conoce dos tipos de esta planta que crece en sitios abiertos con suelo húmedo, el otro es de flores más pequeñas. No presenta ningún uso.

			<p>Campanulaceae <i>Lobelia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21830</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xchá:lasa tsikts</i> (su.pata ave)</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Campanulaceae <i>Lobelia xalapensis</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21501, 74329</p> <p>Foto: 21501</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xchá:lasa tsikts</i> (su.pata ave)</p> <p>Notas: Durante la colecta de #21501, un asesor comentó que las hojas se comen crudas. Crece en la orilla del camino y en cafetal.</p> <p>Durante la colecta de 74329 los asesores volvieron a dar el mismo nombre y comentaron que Conocen dos tipos de esta planta que crece en sitios abiertos con suelo húmedo, el otro es de flores más grandes. Comestible, se aprovechan las hojas y los tallos tiernos, se puede preparar en forma de caldo, se hierven las hojas con sal al gusto, también se pueden ingerir las hojas crudas con un taco.</p>	
			<p>Foto: 74329</p>	

			<p>Campanulaceae <i>Lobelia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21370</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido.</p>
			<p>Campanulaceae <i>Lobelia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21703</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Campanulaceae <i>Lobelia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22203</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>selikxiwit</i></p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido.</p>	

		<p>Campanulaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21565</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: No tiene nombre ni uso conocido.</p>	
			<p>Campanulaceae <i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl. subsp. <i>perfoliata</i></p> <p>Colecta: 21829, 74608</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
			<p>Cannabaceae <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22112, 22446</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmakasiyin wa:ya'</i> (su.garra gavilán)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>ksiyan wa:ya'</i> (su.garra gavilán)</p> <p>Notas: Este nombre se aplica a dos especies además de la <i>Celtis iguanaea</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dolichandra quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G. Lohmann • <i>Pisonia aculeata</i> L.

			<p>Aunque la referencia es a las púas el <i>Dolichandra quadrivalvis</i> no las tiene.</p> <p>Este nombre, o un calco es náhuat es común. En Ecatlan xtsiyan wa:ya se aplica a <i>C. iguanaea</i> y a otra planta, no colectada, sin espinas. El <i>C. iguanaea</i> se utiliza en hacer los marcos de cunas (llamadas huacales en español local).</p> <p>En Xinacachapan (Nahuat: mpio. Huitzilán de Serdán) <i>C. iguanaea</i> se llama <i>kwi:xwits</i> (gavilán.espina) un calco del término totonaco. En Tacuapan <i>kwi:xwits</i> se aplica tanto a <i>Pisonia aculeata</i> como a <i>Machaerium pittieri</i> J.F.Macbr. (Leguminosae).</p>
		<p>Cannabaceae <i>Lozanella enantiophylla</i> (Donn. Sm.) Killip & C.V. Morton</p> <p>Colecta: 21815</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p> <p>Esta especie también fue colectada en San Juan Tahitic, pueblo de habla náhuat (mpio. Zacapoaxtla). Ahí un asesor lo nombró <i>tsi:tsika:s</i>, un término por lo común asignado a varias especies de Urticaceae (particularmente <i>Myrocarpa</i>, <i>Ureara</i> y <i>Urtica</i>).</p>

Cannabaceae: *Trema micrantha* (L.) Blume / *chi:qa:t* y cognados

La *Trema micrantha* es una de las plantas más comunes de las sierras Nororiental y Norte de Puebla. También es una planta cuyo nombre no varía, tanto dentro de los pueblos totonacos como los de habla náhuatl(l).

Comunidad Totonaca	Término	Uso
Zongozotla	chí:qa:t	Corteza para amarre; troncos para construcción de casas y corrales; leña
Nanacatlán	che:qat	Construcción. El tronco se emplea como material de construcción de viviendas como la viga principal del techado. Labores del hogar. Las ramas, tronco, hojas y demás órganos de la planta son usados como leña.
Ecatlán	cha:qat	Hay un solo tipo de este árbol. Crece en cualquier lado. Es como jonote colorado. sirve como jonote. Sirve para leña. Sirve para armazón de casa, sirve pero se patea y ya no queda bien. Hay un solo tipo. Crece dondequiera. Sirve para leña, para amarrar un corral (su jonote). No mancha las manos pero el jonote (<i>Helicarpus</i>) si mancha.
Tonalixco	xu:níj kiw	Conoce un tipo de este árbol que crece en el monte, se emplea solo para leña.
Mecatlán	cha:qa:t	<i>Cha:kga:t</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de este árbol que crece entre cafetales, de la corteza se le extrae la fibra para elaborar distintos calibres de laso y el tallo se emplea en la construcción de casas rústicas.

Coahuilán	cha:qa:t	<i>Cha:kga:t</i> no tiene interpretación. Conocen dos tipos de este árbol que crece en el monte y cafetal, el otro es de interior blanco, este es el rojo. Se emplea como alfarda en la construcción de cabañas y casas rústicas.
Chicontla	cha'há:na'	La madera es utilizada para construir casas y como leña. La corteza se utiliza como fibra.
Tepetzintla de Galeana	cha:qat	Significa "porque también es jonote". Reconoce 2 tipos; el otro es <i>cha:qat</i> lisa. Esta planta crece en lugares fríos, mientras que el otro tipo crece en zonas más cálidas. En español lo conocen como "chaca". Los pájaros se alimentan de esta planta, ixta'wakat- la fruta.
Comunidad Nahua	Término	Uso
Xinacachapan	to:to:kwawit kwetaxkwawit	Lo considera un tipo de <i>xo:no:t</i> . Un asesor menciona tres tipos de <i>xo:no:t</i> : (1) <i>Heliocarpus</i> sp. (<i>xo:no:t</i> prototípico); 2), <i>Hibiscus</i> sp. (conocido como <i>wilakaxo:no:t</i>); 3) <i>kwetaxkwawit</i> (incluido por un asesor como un tipo de <i>xo:no:t</i>).
Nexpan (mpio. Hueyapan)	to:to:kwawit	Sirve, según todos los asesores, para leña y, las ramas redonditas y algo gruesas, alfardas.
Tepetzintla	mo:ras	Los pájaros se comen los frutos.
Cuetzalan	to:to:kowit (algunos conocen el término kwetaxkowitz)	Construcción de casas, leña y su corteza para jonote.
San Juan Tahitic	kwetaxkowitz	Se reconocen 2 tipos; el otro tiene el leño rojizo. Crece en la orilla de arroyos y entre el monte. Se utiliza como leña.
Cauhtemoc	to:to:kowit	Crece en chaparrales y sitios abiertos. Se utiliza como leña. Significa pájaro. árbol.

En resumen se nota que todos los pueblos totonacos, menos Tonalixco, usan el término *cha:qat* o un cognado para *T. micrantha*. En los pueblos nahuas se conocen dos nombres: *to:to:kowitz* (pájaro. árbol), quizá porque los pájaros se alimentan mucho de sus frutos, y *kwetaxkowitz* (cuero. árbol), probablemente por la característica de su corteza como resistente y algo que se puede estirar. Existe en las dos lenguas y culturas una clara asociación de este árbol con el jonote (fibra de amarre), una palabra que proviene del totonaco *xu:nik* que fue origen al náhuatl *xo:no:t*.

Esta asociación y clasificación de la *T. micrantha* con los jonotes (*Heliocarpus* spp.) queda obvia en el nombre asignado a este árbol en Tonalixco: *xu:nij kiw* ('jonote árbol') en lugar de un cognado de *cha:qat*. En los pueblos nahuas muchos utilizan con corteza para jonote y un asesor de Xinacachapan (mpio. Huitzilán de Serdán) comentó que era uno de tres tipos de jonote (*xo:no:t*) los otros dos siendo Malvaceae tanto de (1) árbol (*Heliocarpus appendiculatus* Turcz., el prototípico, y *Heliocarpus donnellsmithii* Rose) como de arbustos (2) los *Hibiscus* (y quizá *Malvaviscus*) que son arbustos que también proporcionan jonote. Más evidencia de esta clasificación está en la respuesta de un asesor de Tepetzintla de Galeana que al ser preguntado el significado de *cha:qat* respondió que se llama así (el *Trema micrantha*) "porque también es jonote", una frase difícil de descifrar pero que sugiere que él considera a *T. micrantha* como un tipo de jonote, sin duda porque produce fibra que se usa para amarres. Siguió diciendo que él reconoce dos tipos: el otro es *cha:qat* lisa. Éste (*T. micrantha*) Crece en lugares fríos, mientras que el otro tipo crece en zonas más cálidas. En español lo conocen como "chaca". Los pájaros se alimentan de la fruta (*ixta'wakat*) de este árbol.

Este comentario aparentemente sugiere que en Tepetzintla de Galeana 'chaca' se usa en español para referirse a *T. micrantha*. Si esto es cierto es probable que este uso proviene de un préstamo del totonaco (*cha:qat* y cognados). Nótese que 'chaca' también es un término común en la costal oriental de México para referirse a *Bursera simaruba* (L.) Sarg. pero en este caso se ha considerado que proviene de maya. En cuanto al uso de 'chaca' para *T. micrantha* se ha documentado tal nomenclatura en el pueblo otomí San Pablo Pahuatlán donde se usa la fibra para producir papel de corteza (amate). En Pahuatlán el nombre español para *T. micrantha* es tanto 'chaca' como 'jonote', dos palabras de origen totonaco.



Cannabaceae
Trema micrantha (L.) Blume

Descripción:

Colecta: 21508, 74031, 74175,
107400

Totonaco de Zongozotla
chi:qa:t
(sin análisis)

Cuetzalan Náhuat:
to:to:kowit (y menos usual pero
conocido como otro nombre:
kwetaxkowit)

Notas: Se aprovecha la corteza
como laso para amarrar cercas. La
madera se utiliza como leña.



***Canna indica* L. y *Canna tuerckheimii* Kraenzl.**

A pesar de la similitud entre *C. indica* y *C. tuerckheimii* tanto en los pueblos totonacos como nahuas la gente las distinguen claramente a menudo lexicalmente y aún más el cuanto al aprovechamiento (o falta de, en cuanto a *C. indica*). En ambas lenguas *C. tuerckheimii* se considera el más importante y prototípico. Éste es la especie que con hojas más grandes se emplea para la envoltura de tamales y recibe el nombre principal: *chikichi* en el totonaco de Zongozotla y *nexkoko:k iswat* en el náhuat de Cuetzalan.

En Zongozotla *C. tuerckheimii* se llama *chikichi* (con acento en la primera sílaba mientras que el nombre de *C. indica* incluye un calificativo de color, *xa sananka* ('el que es amarillo'). Esto sugiere que la especie prototípica es la primera una interpretación apoyado por el hecho de que solamente las hojas de ésta se utilizan para envolver a tamales. El *C. indica* es ornamental. Según Osbel López fue introducido por tal fin aunque se ha escapado y se encuentra en los campos alrededor del pueblo. Según dicen, el nombre proviene del sonido de las sonajas que se llenan de las semillas de esta planta.









Usos: En general ambas *Canna* proporcionan semillas que sirven para llenar sonajas para los 'bailables' (danzas religiosas) pero en general hay mucha preferencia para las hojas de *C. tuerckheimii* en cuanto a la utilidad de envolver tamales (asesores totonacos en Zongozotla, Nanacatlán, Tepetzintla de Galeana, Patla [donde se llama, *li:ma'hchi:n*], Tonalixco). En Zongozotla también se usa para envolver tortillas para mantenerlas calientes al llevar al campo (el mismo uso fue reportado en el pueblo nahua de San Juan Tahitic). No se colectaron muchas *C. indica* en pueblos totonaco. Pero en Zihuateutla la única *Canna* colectada fue *C. indica* y la asesora comentó que se utilizaban las hojas para envolver tamales. En Zongozotla fue colectada y reportada sin uso menos como ornamental vivo, cultivado en los jardines caseros.








En Pueblos nahuas se nota la misma división funcional y lexicosemántico entre *C. indica* y *C. tuerckheimii*. Por ejemplo en Xinacachapan fue colectado una *C. indica* (llamado *iswatsitsi:n*). Pero los asesores no estuvieron de acuerdo en cuanto a la utilidad de las hojas de esta *Canna* para envolver tamales. Algunos dijeron que eran demasiado pequeñas. Es significativo que Hermelindo Salazar, de San Miguel Tzinacapan, no tuvo nombre para esta colecta: es común en el municipio de Cuetzalan que el nombre *nexkoko:k iswat* se aplica solamente a *C. tuerckheimii* y que para muchos *C. indica* no tiene nombre. Pero en el municipio de Huitzilán de Serdán también fue colectado una *C. tuerckheimii*. Todos los asesores le dieron el nombre *tamalíswat* (lit. 'tamal hoja') y estuvieron de acuerdo que sus hojas se emplean para envolver cualquier tipo de tamal. En Nexpa (mpio. Hueyapan) una *C. indica* fue colectada y llamada *pahpata* ('plátano') sin reportar ningún uso. En Tepetzintla se colectó una *C. tuerckheimii* que fue llamada *pa:pahtla*. Era de flor roja. Comentaron que hay otra variedad con flores anaranjadas (probablemente una variante de *C. tuerckheimii*). Las dos tienen el mismo uso de envolver tamales, pero solamente los de carne. Finalmente en los varios pueblos nahuas del municipio de Cuetzalan donde se hicieron colectas en general no se documentó ningún uso para *C. indica*. De los 12 veces que un asesor pudo comentar sobre su nombre 3 veces dijeron no tener un nombre (comentando que no era *nexkoko:k iswat*), 3 veces dieron el nombre *nexkoko:k iswat*, y 6 veces calificaron el nombre como *ta:lpan nexkoko:k iswat* (*nexkoko:k iswat* chaparrito). En San Juan Tahitic el mismo nombre, *i:tspahpata* (cf. *pahpata*, 'plátano') se emplea para las dos *Canna* pero solamente *C. tuerckheimii* tiene uso: para envolver tamales y para llevar comida al campo (prob. tacos y tortillas).







En cuanto a *C. tuerckheimii*, casi siempre fue reconocido y nombrado en pueblos nahuas. De 8 veces que asesores en el municipio participaron en colectas, 7 veces dieron el nombre de *nexkoko:k iswat* y 4 veces ofrecieron que se conoce también como *nakatamalíswat* (carne.tamal.hoja-ancha). Sea lo que sea el nombre, las hojas se usan para envolver tamales de carne y las semillas para sonajas.

Nombres comparativos totonacos: En Zihuateutla y Chicontla-Patla existe el término *chikichi* (con solamente el cambio de acento al *chikichi* de Zongozotla). Una asesora de Zihuateutla lo utilizó para designar a *C. indica* cuyas hojas, dijo, se emplean para envolver tamales. El mismo término se encuentra en el diccionario de Chicontla-Patla [1] y aunque no se identifica la planta que nombra es sin duda una *Canna*. En una colecta de campo un asesor de Chicontla utilizó para *C. tuerckheimii* el término *li:ma'hchi:n* (*li*:- [instrumental], *ma*: ['cuerpo'], *chi*: ['amarrar'], -*n* [nominizador]), que significa 'lo que se usa para envolver'. Así es posible que utilizan allí *chikichi* para *C. indica* y *li:ma'hchi:n* para *C. tuerckheimii*. En Tonalixco el término *che:q* se utiliza para *C. indica* y se comenta que se usa para envolver tamales. Finalmente, el Tepetzintla de Galeana *paqaseaqna* probablemente con el significado de 'hoja plátano'. Ahí también las hojas se utilizan para envolver tamales.

Distinción morfológica: En general se considera que la distinción más importante entre las dos especies es el tamaño, tanto en lo alto como en el tamaño de las hojas, y el habitat, siendo *C. indica* más común en tierras bajas. Pero si hay características distintivas de cada especie [14]. Más notablemente *C. indica* tiene un estaminodio (estambre infértil) recurvado (como se ve por la derecha de la foto grande abajo) y su color tiende a amarilla y roja mientras que *C. tuerckheimii* tiene los estaminodios erectos y las flores de color anaranjado a rojo. En envés de la hoja es glabra en *C. indica* y lanosa en *C. tuerckheimii*. Pero, como observan los asesores, hay una clara diferencia en tamaño: *C. tuerckheimii* puede crecer más alto (3.5 hasta 5 m de alto) que *C. indica* (3 m máximo). Y las hojas de *C. tuerckheimii* miden 30–100 cm de largo y 15–40 cm de ancho, en comparación a las hojas de *C. indica*: 20–35 cm de largo y 15–25 de ancho.

			<p>Cannaceae <i>Canna indica</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74263</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa sananka chikichi'</i> (el amarillo onomatopeya: sonido.de.sonaja)</p> <p>Totonaco de Nanacatlán <i>xalhak tsu chikichi'</i> (los pequeños <i>chikitchi'</i>)</p> <p>Notas: En Zongozotla esta <i>Canna</i> se emplea solamente como ornamental vivo en los jardines caseros. Según Osbel López es de introducción reciente aunque se ha escapado y ya se encuentra en el campo cercano.</p>
			<p>Cannaceae <i>Canna tuerckheimii</i> Kraenzl.</p> <p>Colecta: 21496, 74012</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chikichi'</i> (onomatopeya: sonido.de.sonaja)</p> <p>Totonaco de Nanacatlán <i>chikitchi'</i> onomatopeya: sonido.de.sonaja</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>nexkoko:kiswat</i></p> <p>Usos: Se aprovechan las hojas de esta planta para la elaboración de tamales y también para envolver tacos, pues esta hoja los conserva frescos y no permite que el alimento se agrié.</p>
				

			<p>Capparaceae <i>Capparidastrum</i> cf. <i>mollicellum</i> (Standl.) X.Cornejo & H.H.Iltis</p> <p>Colecta: 22196</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Capparaceae <i>Capparidastrum</i> <i>quiriguense</i> (Standl.) Cornejo & Iltis</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21920, 22010, 74578</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>	
				

		<p>Capparaceae <i>Capparis</i> sp.</p> <p>Colecta: 22447</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Capparaceae <i>Forchhammeria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74575</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
			

Caricaceae

Carica papaya L. y *Vasconcellea cauliflora* (Jacq.) A. DC.

Aparte de *Jacaratia mexicana* A. DC. ('bonete' en español) y la herbaceae *Jarilla heterophylla* (Cerv. ex La Llave) Rusby hay dos Caricaceae en Puebla: *Carica papaya* L. y *Vasconcellea cauliflora* (Jacq.) A. DC. Aparentemente uno de estos dos comparte un nombre indígena, *kochoni* o una variante de este nombre. Dado que hasta ahora las colectas no han sido positivamente identificadas a especie, cada grupo de fotos está presentado aparte en lo que sigue.

Nota: En Ecatlán hay dos colectas, no fotografiadas

72086 **tutunchich** Significa según etimología local, "tres perros". Hay un solo tipo. Crece en los caminos. Se puede comer pero a veces tiene gusanos. Otro asesor dice que no se come.

72097 **tsiki:t xanat** [éste es el que en náhuat se le conoce como *kochonih*] Se come pero sin comerse las semillas, que son dañinas.

Fruto

Carica papaya: Fruto es una sola cámara interna; frutos de cómo 7 cm diam.

Vasconcellea cauliflora: Fruto de 5 cámaras internas con las semillas separadas por carne. Tamaño de la fruto como 4-5 cm diam

Flor masculino

Carica papaya: pedúnculo de inflorescencia mascula hasta 20 cm

Vasconcellea cauliflora: pedúnculo de inflorescencia mascula hasta 12 cm

Flor femenina

Carica papaya: hasta 3 flores en la inflorescencia

Vasconcellea cauliflora: 4 a 7 flores en la inflorescencia

Hojas

Carica papaya: 7 o mas venas y 7 a 11 lóbulos de la hoja



Vasconcellea cauliflora: 5 venas principales y 5 lóbulos








Comparación de colectas de Caricaceae en pueblos totonacos

70170	<i>C. papaya</i> (masc)	slajna: tonchí'	Patla	Sin uso. Probablemente slajna: es una forma nominalizada del verbo intransitivo slaj, 'escurrir' (cf. <i>sta'ja</i> 'escurrir' en Xicotepec). Así significa 'el <i>tonchi</i> ' que escurre'. Véase col. #72097
70074	<i>V. cauliflora</i> (fem)	to:nchi'chí'	Chicontla	
70009	<i>C. papaya</i> (fem)	to:nchi'chí'	Chicontla y Patla	
70008	<i>C. papaya</i> (masc)	to:nchi'chí'	Chicontla y Patla	
76261	<i>V. cauliflora</i> (masc)	tutunchichi'	Mecatlán	Conocen dos tipos de este árbol que crece entre los cafetales, el otro es de frutos grandes. El fruto maduro es comestible.
		tanchich	Zongozotla	
		papa:yah	Tacuapan, mpio. Cuetzalan (náhuat)	
76322	<i>V. cauliflora</i> (masc)	turrunchich	Coahuilán	
		tanchich	Zongozotla	
		kowtah pa:payah	S. Mig. Tzinacapan, mpio. Cuetzalan (náhuat)	
74374	<i>V. cauliflora</i> (masc)	tanchich	Zongozotla	
72086	(falta foto)	tutunchich	Ecatlán	Un asesor dijo que significa "tres perros". Hay un solo tipo, crece en los caminos. Se puede comer pero a veces tiene muchos gusanos. Otro asesor







				dijo que hay dos tipos, el otro se llama tsiki: xanat (cf. <i>tsiki:t</i> 'leche de pecho [de cualquier mamífero]'). Crece por lo común en cafetales, donde no se chapea. No se come.
		pa:payah simarró:n	S. Mig. Tzinacapan, mpio. Cuetzalan (náhuat)	
72097	falta foto	tsiki:t xanat	Ecatlán	Significa 'lecho flor'. Se come el fruto, sin semilla porque es mala o peligrosa.
		kochonih	S. Mig. Tzinacapan, mpio. Cuetzalan (náhuat)	
----	de diccionario	to:nchi'chi	Xicotepec de Juárez	Glosa es 'papaya cimarrona'





En todos los pueblos parece que no se distingue, por lo menos en nomenclatura, entre *C. papaya* y *V. cauliflora*. Ni entre masculino y femenino. El nombre constante es *tanchich*, sin un significado transparente, o un cognado. En dos casos el nombre hace referencia a la amplia latex de los Caricaceae. En Patla un asesor agregó *slajna*: al nombre para *C. papaya* (masc); en Ecatlán probablemente se hace una distinción entre las dos especies llamanda a una tutúñchich y el otro (prob. *V. cauliflora* [masc]) como *tsiki: xanat* con referencia al latex. El nombre náhuat *kochonih* probablemente sea un préstamo del totonaco. Se analiza más profundamente la clasificación náhuat de los Caricaceae en la guía de Cuetzalan.





		<p>Caricaceae <i>Vasconcellea cauliflora</i> (Jacq.) A. DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74374</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tanchich</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>kowtah papa:yah</i></p> <p>Notas: El fruto es comestible.</p>
Sin registro fotográfico		<p>Caryophyllaceae <i>Drymaria</i> sp.</p> <p>Colecta: 107438, 107452</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin asesor presente</p>

		<p>Caryophyllaceae <i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.</p> <p>Colecta: 21833</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>	
			<p>Caryophyllaceae <i>Stellaria</i> sp.</p> <p>Colecta: 21348</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Caryophyllaceae <i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.</p> <p>Colecta: 21707</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>	

		<p>Caryophyllaceae Caryophyllaceae: <i>Stellaria prostrata</i> Baldwin ex Elliott (= <i>Stellaria cuspidata</i> Willd. ex Schlecht. subsp. <i>prostrata</i> (Baldwin ex Elliott) J.K. Morton)</p> <p>Description: No pubescente, hojas pecioladas con ápice agudo o acuminado. Crece más erecta que los <i>tūsankuāēwat</i>.</p> <p>Colecta: 21351, 74314</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sq:ma'</i> (cf. <i>sqama'</i>, 'sabroso')</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>pachkilit</i></p> <p>Usos: Es comestible. Se aprovecha la planta entera preparándola en caldo. Primero se hierve agua mezclada con sal caliza. Luego se agregan las plantas, se escurre y se termina de hervir con agua limpia y sal al gusto.</p>
		<p>Caryophyllaceae <i>Stellaria ovata</i> Willd. ex Schtdl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21471, 21470, 21491, 74318</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmu:xuwa sakah</i> (su.frente.piel tuza)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>tusak^wa:e:wat</i> (tuza.cabeza.corteza)</p> <p>Nota: Quizá se llama así, según Sebastián López, porque se ha visto que la tuza se lo come. También tapiza el suelo y lo hace muy duro y difícil de cortar con machete. Cuando limpian un terreno lo arrancan con las manos. No tiene ninguna utilidad y de por sí la gente lo considera como maleza.</p>

		<p>Celastraceae <i>Wimmeria concolor</i> Schltl. & Cham.</p> <p>Colecta: 22449, 22499</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>chi:chil tekowit</i></p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Celastraceae <i>Zinowiewia integerrima</i> (Turcz.) Turcz.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21788, 74548</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsasná n kiwi'</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Nanacatlán <i>tsisni: kiwi'</i></p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>chechelo:texokowit</i></p> <p>Notas: Solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para este árbol. En Zongozotla se notó que su única utilidad es como leña. En Nanacatlán los dos asesores comentaron que los troncos se</p>
			

			<p>emplean en la construcción de viviendas como horcones.</p> <p>En Ecatlán se colectó una Celastraceae (prob. <i>Zinowiewia</i> o <i>Quetzalia</i>) llamado <i>tsasní:x kiw</i>.</p>
		<p>Chrysobalanaceae <i>Couepia polyandra</i> (Kunth) J. N. Rose yyy</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74202</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pij(a)</i> (sin análisis)</p> <p>Nota: Este árbol se encuentra en las zonas medio calorasas de Zongozotla a altitudes < 1000 m. El fruto es comestible al madurar. La madera, seca, sirve solamente.</p> <p>La vocal final que se pierden el Zongootla cuando se pronuncia aisladamente es <a>: <i>pija</i>. Por ejemplo wama xpija iyma n qawás ('está comiendo su <i>pij</i> este niño')</p> <p>El nombre para <i>C. polyandra</i> documentado en el náhuatl de los municipios de Cuetzalan y Huitzilán es <i>olo:pió</i>: que no tiene significado claro. Es posible que la parte <i>pió</i> proviene del totonaco aunque el mismo nombre, <i>pió</i> se reporta [15] para <i>Couepia dodecandra</i> en Tabasco, Chiapas y Yucatán..</p>

		<p>Chrysobalanaceae <i>Hirtella triandra</i> Sw.</p> <p>Colecta: 22417</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta. No tiene nombre ni uso conocido.</p>
		<p>Chrysobalanaceae <i>Licania platypus</i> (Hemsl.) Fritsch</p> <p>Descripción: Las colectas de este proyecto están en el punto más septentrional de la extensión de esta especie, que se encuentra en Panamá y algunos puntos de Colombia.</p> <p>Colecta: 22098</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqchixit ja:k</i> (cabello mamey)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>aqchixit ja:ka'</i></p> <p>Notas: El nombre de este árbol es un calco (cabello zapote) que abarca no solamente el totonaco y el náhuatl sino también en español, por lo menos el español local. En Chicontla/Patla se llama <i>ahachixit ja:ka</i> y en San Miguel Tzinacapan y San Juan Tahitic se llama <i>tsontsapot</i> (cabello.zapote), el mismo calco. Se reporta <i>tsontsapotl</i> en la documentación de Hernández para el náhuatl del siglo XVI. Aunque generalmente se considera que el nombre español es un calco del náhuatl es posible que por su distribución fue un calco originalmente del totonaco u otra lengua mesoamericana.</p>


Cleomaceae: *Cleoserrata speciosa* (Rafinesque) H.H. Ittis

La *Cleoserrata speciosa* crece a orilla de caminos y en suelos húmedos. Es una hierba muy común y conocida en toda la región la colecta. Solamente en Coahuilán los asesores que acompañaba la colecta no tuvieron nombre para esta planta. En otros si hubo nombre y en casi todos se consideraba un ornamental para poner en florero y adornar altares caseros.

Mecatlán	qoxqew xanat Manihot.esculenta flor	xqalchixit la:pani:t su.barbilla.pelo bestia.silvestre	
Ecatlán	tsi:ki xanat aromático?/milk flor	tsi:ki xa sqayanqa aromático?/milk la morada	tsi:ki xa xanat xa tsaqaqa aromático flor la blanca
Nanacatlán	pu:tluaná xanat lodo flor		
Zongozotla	xa sqawáwa xqalhsat tintsan (la rosa su.barbilla.canas chivo)	xa snapapa: xqalhsat tintsan (la blanca su.barbilla.canas chivo)	santa maría xanat

Varios de los nombres documentados hacen referencia a los estambres muy largos que se consideran como 'barba o bigote de chivo' (Zongozotla) o de 'bestia silvestre' (Mecatlán). En Nanacatlán el nombre sugiere su habitat preferencia de tierras húmedas y en Mecatlán otro nombre la considera parecida a la *Manihot esculenta* (*qoxqew*) por las hojas de formas parecidas. Finalmente, otro nombre de Zongozotla hace referencia a su uso como adorno en los altares caseros (a menudo a la Virgen María).

Nótese que un nombre común en náhuat es *te:ntsoxo:chit* ('barbilla.pelo.flor')



Cleomaceae
Cleoserrata speciosa (Rafinesque)
H. H. Ittis

Colecta: 21652







Totonaco de Zongozotla
santa maría xanat





Cuetzalan Náhuat:
te:ntsoxo:chit

Notas: Hay 2 tipos según el color de las flores. La rosita es más común y es la más codiciada para los altares.

Tiene dos nombres locales. Uno, *santa maría xanat*, refiere a su uso religioso en los altares. El otro nombre es común para esta planta por asemejarse, según dicen, a las barbas de un chivo. Se modifica por *sqawáwa* ('rosa') o *snapapa* ('blanco') según el color de la flor.

		Foto: 74027	<p>Nombres para 74027 <i>xa sqawáwa xqaltsasat tintsan o santa maría xanat</i> (la rosa su.barbilla.canas chivo)</p>
			<p>Cleomaceae <i>Cleoserrata speciosa</i> (Rafinesque) H. H. Iltis</p> <p>Colecta: 74033</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xa snapapa: xqalhtsasat tintsan</i> (la blanca su.barbilla.canas chivo)</p> <p>Notas: Se conoce dos tipos de esta planta, la otra es de flores rosas, esta es de flores blancas. Crece en sitios húmedos o cerca de cuerpos de agua. No presenta ningún uso.</p>

			
		<p>Clethraceae <i>Clethra mexicana</i> DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74150</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:lpatat</i> (sin análisis)</p> <p>Nanacatlán <i>li:lpatat</i></p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>tamamalwa:skowit</i></p> <p>Notas: Conocen sólo un tipo de este árbol. Se emplea para la construcción de casas rústicas y cabañas. También se aprovecha para leña. Según los asesores de Nanacatlán Los troncos se usan como viga principal en casas de cartón.</p>
		<p>Clethraceae <i>Clethra pringlei</i> S.Watson</p> <p>Colecta: 22508</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>temamalwa:s</i></p> <p>Notas: Los asesores de Zongozotla presente en esta colecta de Zoquiapan no tuvieron nombre para esta <i>Clethra</i>. No lo asociaron con la <i>Clethra mexicana</i> que es muy común y conocido en Zongozotla. Un asesor de habla náhuat de San Miguel Tzinacapan tampoco lo reconoció como <i>tamamawa:s</i> (nombre para <i>C. mexicana</i>)</p>

		<p>Clusiaceae <i>Clusia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74371</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ma:paqlqa:t</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: Se conoce solamente un tipo de este árbol. Es rupícola, creciendo sobre rocas en zonas conservadas. Se aprovecha solo como leña.</p>
			

Distinciones morfológicas entre las especies de Commelinaceae en Zongozotla y tierras cercanas

Commelina diffusa* y *C. erecta | Los *Commelina* se distinguen por las brácteas grandes que envuelven la base de la flor, algo que se ve claro en la tercera foto de *C. erecta*. *C. diffusa* es generalmente rastrera y relativamente postrada con tres pétalos azules del mismo tamaño. *C. erecta* es más propensa a estar parada. Dos pétalos son azul fuerte y redondas mientras que el pétalo inferior es más pequeño, blanco y ligeramente lobulado.

Gibasis oaxacana* y *Gibasis pellucida: Los *Gibasis* se reconocen la inflorescencia en forma de 'cima' con las flores central primeras en abrir. Dos de los tres *Gibasis* mexicanos con flores blancas están documentados en Zongozotla y comunidades cercanas: *G. oaxacana* tiene hojas pecioladas y arregladas en espiral sobre el tallo; *G. pellucida* (foto) tiene hojas sésiles (directamente pegadas al tallo) y arregladas paralelamente en dos filas en un solo plano (esto es, no rodeando el tallo). La inflorescencia de *G. oaxacana* tiene más ramificaciones (como se ve en la primera foto) mientras *G. pellucida* tiene la inflorescencia estrictamente con dos tallitos.

Tradescantia commelinoides*, *T. poelliae*, *T. zanonía*, *T. zebrina: *T. zebrina* no se confunde con ninguna otra especie de este género por sus hojas con el envés púrpura y la haz verde rayado.

Etnobotánica totonaca de Commelinaceae

Hay una consistencia en el nombre para Commelinaceae en los pueblos totonacos donde se han colectado especies de esta familia. Todas las especies se llaman *aqasmal* (o un cognado) menos *Tinantia erecta* que recibe su propio nombre, no relacionado etimológicamente con *aqasmal*. Beck [6] analiza el término cognado de Chicontla/Patla, *a'hasmá:lh*, como *a'ha-* 'oreja', -s diminutivo, *ma:lh* 'estar postrado'. En Zongozotla algunos asesores consideran que la etimología de *aqasmal* es de *aqán* 'parte anterior, extremidad', y *smalhwa'* 'endebile, tierno'.

En seguida se dan los nombres para todas las colectas aparte de las ilustradas abajo:

Commelina diffusa

- Mecatlán (76219) = *xa tsutsuw aqasmal* ('el *aqasmal* pequeño') | Se emplea como forraje para cerdos y equinos
 Chicontla y Patla (70022) = *xa smatá'ha' a'hasmá:lh* (el *a'hasmá:lh* púpura) | Se utiliza como condimento para los frijoles y tamales
 Zihuateutla (86035) = *aqasmá:lh* | Se utiliza para curar la diarrea

Commelina erecta

- Coahuatlán (76159) = *xa saqaaq aqasmalh* (el *aqasmalh* blanco) | Se emplea como forraje para animales
 Ecatlán (72032) = *spupuku qásma:l* (el *qásma:l* azul) | Crece por lo común en cafetales. Cuando entra una impureza en el ojo se usa el tallo: su jugo es babosa y sirve para que se pegue la impureza y salga. Se puede usar cualquier *qásma:l*. Otro asesor dijo que hay 4 *qásma:l* verdes y 1 morado. Los verdes se distinguen porque tienen más jugo. Es común en cafetales y si uno no chapea crece como un metro. Se treapa a los cafetos. Puede servir como forraje para caballos.
 Ecatlán (72088) = *qásma:l*
 Patla (70020) = *xa smata'aha a'hasmá:lh* (el *a'hasmá:lh* púpura) | Sin uso.
 Chicontla (70164) = *xa smata'aha a'hasmá:lh* (el *a'hasmá:lh* púpura) | Sin comentario sobre uso pero dijo que hay como 6 tipos de *a'hasmá:lh*
 Patla (70164) = *xa lakatstin a'hasmá:lh* (el *a'hasmá:lh* pequeño) | Se utiliza como alimento para puercos

Gibasis pellucida

- Mecatlán (76275) = *saqaaq aqasmal* (*aqasmal* blanco) | Crece en cafetales y milpas. Hay 4 tipos de esta planta. Se emplea como forraje para cerdos y equinos. Otro asesor de Mecatlán comentó que conoce 2 tipos de esta planta: de flor blanca y de flora azul. Da el mismo habitat y uso que el asesor anterior.

Tradescantia zebrina

- Nanacatlán (77095) = *aqasmal* | Es medicinal. Se realiza una infusión de las hojas se que bebe para tratar la hepatitis.
 Chicontla/Patla [1] = *xa spi'lili' a'hasmá:lh* (el pinto *a'hasmá:lh*) Aunque tomado de un diccionario que lo define como "Dayflower" (*Commelina* spp.) usado en ceremonias para aplacar a los muertos" es mucho más probable, por el nombre y el uso, que la referencia es a *T. zebrina*.

Tripogandra serrulata

- Chicontla (76007) = *xa tzu'tzo'ho' a'hasmá:lh* (el *a'hasmá:lh* rojo) | Sin uso.
 Mecatlán (76033) = *aqasmal* | Se conocen dos tipos de esta planta, uno blanco y otro azul. Crece por las orillas de los caminos. Se aprovecha como forraje para cerdos.
 Nanacatlán (77166) = *aqasmal* | Sin uso.
 Tepetzintla de Galeana (78078) *ti'j yaqasmalh* matlalin (camino *yaqasmalh* ma:tlalin) | Se fija que el modificador *ti'j* ('camino') sin duda indica el lugar de colecta o el hecho de que estas plantas por lo común se encuentran en sitios abiertos y al lado de caminos. dSe lo comen los conejos. Nótese que se incluye el nombre náhuatl (ma:tlalin) en el nombre totonaco pero no se sabe porque. Quizá sea un préstamo. As posible que su significado sea 'azúl' y no una Commelinaceae.

Sin identificar (72069): rastrera de 3 pétalos blancos). Posiblemente *Callisia multiflora*

- Ecatlán = *qásma:l* | Un asesor comentó que esta planta se la comen los pollos. En la mañana huelen bien las flores. Nótese que un asesor de Zongozotla en cuanto a una colecta de *Callisia multiflora* comentó que las flores son aromáticas. Así es posible que esta colecta de Ecatlán (72069) sea esta especie. Una examinación del voucher aclarará la duda.

Tinantia erecta (70177, 72037, 72131, 76276, 77085, 77221)

Esta especie es la única de la familia Commelinaceae que en la mayoría de los casos reportados recibe un nombre distinto a los demás de esta familia. La única excepción es en Chicontla y Patla.

Chicontla y Patla (70177): *xa stalánha' a'hasma:lh* (el *a'hasma:lh* blanco). Este nombre para *T. erecta* lo incluye dentro de la clasificación de los demás *a'hasma:lh* (Commelinaceae) algo que no ocurre en los demás pueblos totonacos estudiados. Los de estos dos pueblos comentaron que las hojas se consumen aunque no elaboraron sobre su preparación.

Mecatlán (76276) = *kilxtak* | Crece entre cafetales y milpas. Las hojas se emplean en la elaboración de tamales. Se despedazan y se mezclan con la masa.


Ecatlán (72037, 72131) = *kí:xtak* | Crece en chilares y cafetales principalmente. Para comer en tamales se mezcla la hoja pica con masa. Un asesor comentó que se asa en comal. Otro asesor explicó que se revuelve con suyu: *kaka* (*Ipomoea dumosa*), *tatu:lqát* (*Jaltomata repandidentata*), frutos inmaduros (que no tienen espinas fuertes) de *cha:wana:káhni'* (*Cnidocolus multilobus*), masa y algunos usan frijoles. La comida se acompaña con salsa (taxpata) de chiltepín, sin agua, se tuesta y se muele en molcajete.

Nanacatlán (77085) = *kitchkit* (planta) / *akskuna:t* (flor) | Las hojas se consumen hervidas. Las hojas se trituran y luego se mezclan con masa y se prepara en tamales. Las flores se preparan con frijoles. La colecta en Nanacatlán proporcionó el único caso en que hubo nombres distintos para la planta y para la flor.

Resumen: En general los *Commelina* spp. tiene poca utilidad aunque en varios pueblos se reporta su uso como forraje para varios animales. En una ocasión se comentó que se comen las hojas y en otra que se emplea su jugo del tallo para quitar basura de los ojos. En Zongozotla se considera una maleza, particularmente en su habitat preferido: cafetales y milpas. Los *Gibasis* (véase abajo) se consumen en Zongozotla pero no hay mucha información de otros pueblos sobre este uso. El consumo de *Tinantia erecta* es general y probablemente explica porque recibe un nombre distinto. En los pueblos nahuas esta división que lexicalmente separa a *Gibasis* spp. también se nota. En el municipio de Cuetzalan se nombran *owakilit* (lit., 'caña quelite') mientras que en el municipio de Hueyapan se llama *to:topo*. En San Juan Tahitic (Zacapoaxtla) se llama *a:kaselo:t*.

El nombre *aqasmal* y sus cognados se extiende a casi todos los pueblos estudiados. Los nombres a menudo incluyen un modificador para distinguir las especies aunque el uso de tales términos puede ser resultado del impacto de la elicitación de nombres y preguntas acerca de las diferencias entre una y otra especie. No parece ser un sistema lexicalizado. Generalmente *aqasmal* y sus cognados abarca todos los Commelinaceae menos *Tinantia erecta*. Es posible que en Chicontla/Patla el termino *a'hasmá:lh* se extiende a otras plantas. En el diccionario de estos pueblos [1] se define como 'cualquier planta que crece como bejuco rastroo y que tiene hojas alternas por lados contrarios del tallo'. La colecta #70168 es *Persicaria* cf. *hydropiperoides* (Michx.) Small y fue llamado *a'hasmá:lh* por un asesor de Chicontla que dijo que se usa para curar mal de aire. Como es dudoso que un asesor confundiera *Persicaria* con un Commelinaceae es probable que en este caso el nombre fue extendido fuera de su significado central.

Finalmente, el término *kilhxtik* también es común en los pueblos totonacos de la región para *Tinantia erecta*. No tiene una etimología clara.











Commelinaceae
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson









Colecta: 22367







Totonaco de Zongozotla
aqasmal
(oreja diminutiva.prostrada)







Totonaco de Atlequiyayán
sin nombre conocido







Notas: Ambos asesores de Zongozotla comentaron que hay varios tipos de esta planta, que no tiene uso.

			
			<p>Commelinaceae <i>Callisia monandra</i> (Sw.) Schult. & Schult. f. (flor dímera)</p> <p>Colecta: 74586</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xa stalanqa aqasmal</i> (el transparente <i>aqasmal</i>)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qasmal</i></p>
			<p>Commelinaceae <i>Callisia multiflora</i> (M.Martens & Galeotti) Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74554</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xa smuklhani aqasmal</i> (el aromático <i>aqasmal</i>)</p> <p>Notas: Conocen varios tipos de esta planta que crece en cafetales y en suelos húmedos, no presenta ningún uso. Su nombre se debe a que las flores son aromáticas.</p>







			<p>Commelinaceae <i>Callisia multiflora</i> (M. Martens & Galeotti) Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22322</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qasmal</i></p> <p>Tipos: Hay 5 tipos, se diferencian por el color de las flores. Usos: Sin uso.</p>
			<p>Commelinaceae <i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22280</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qasmal</i></p> <p>Notas: Crece en sitios abiertos, perturbados y cultivos. No tiene uso.</p>
			<p>Commelinaceae <i>Commelina diffusa</i> Burm f.</p> <p>Colecta: 21377, 74035</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> o <i>xa spupuku aqasmal</i> (el azul <i>aqasmal</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ma:talín</i></p> <p>Notas: Se diferencian varios tipos por el tallo, hojas y flor. Crece en cafetales, maizales y lugares cerca de cuerpos de agua. Se considera una maleza.</p>







		<p>Commelinaceae <i>Commelina erecta</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74212, 74359</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal/xtaq:n tsi:ya'</i> (oreja.diminutiva.prostrada / su.oreja ratón)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>ma:talin</i></p> <p>Notas Varios, se diferencian por los rasgos particulares de cada planta. No tiene ningún aprovechamiento. El nombre alternativo dado para <i>C. erecta</i> en la colecta 74539, 'orejas de ratón' probablemente proviene de la apariencia muy marcada presentada por los dos grande pétalos azules. No se ha notado este nombre para ningún otro Commelinaceae.</p>
		<p>Commelinaceae <i>Commelina rufipes</i> var. <i>glabrata</i> (D.R. Hunt) Faden & D.R.Hunt</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22415</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán sin nombre reconocido</p> <p>Notas: Aunque esta colecta es de una planta solamente con fruto los asesores de Zongozotla no tuvieron dificultad ninguna para asignarle un nombre. El único asesor de Atlequizayán, sin embargo no le dio nombre a pesar de tener un cogado de <i>aqasmal</i> para designar los Commelinaceae.</p>
			









		<p>Commelinaceae <i>Gibasis oaxacana</i> D.R. Hunt</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21712</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qasmal</i></p> <p>Tipos: Hay 5 tipos, se diferencian por el color de las flores. No tiene uso.</p>
		<p>Commelinaceae <i>Gibasis oaxacana</i> D.R.Hunt</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74573</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa stalanqa aqasmal</i> (el transparente <i>aqasmal</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Comestible, se aprovechan únicamente las hojas, se puede preparar en forma de caldo, se hierbe en agua con sal al gusto, también se puede preparar en forma de tamal, se mezclan las hojas crudas con la masa y se envuelven en hojas de plátano o puede ser mesclado nuevamente con masa y hacerlo en forma de tortillas gruesas, una última preparación se hace asado, se envuelven las hojas en hojas de plátano y se ponen a asar en el comal.</p> <p>Crece principalmente en cafetales y lugares de alta humedad. Planta comestible, se echa directamente a la olla de frijol hirviendo y se mezcla con el caldo para que se impregne el sabor de la planta. dd Planta comestible, además de la combinación hecha con el frijol, se hierve la planta completa y se prepara en forma de tamal.</p>
			


		<p>Commelinaceae <i>Gibasis pellucida</i> (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt</p> <p>Colecta: 21378, 21483, 74039</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah aqasmal</i> (el blanco <i>aqasmal</i>)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ma:talín</i></p>
		<p>Commelinaceae <i>Tinantia</i> aff. <i>anomala</i> (Torr.) C.B.Clarke</p> <p>Col. 21504</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kilxtik</i> (sin análisis)</p> <p>Notas: Se reconoce 2 tipos, el otro es de flores moradas. Crece en sitios abiertos. Es comestible, se consume la planta completa, se puede preparar en caldo ó guisado, se hierven las hojas con sal caliza.</p>
			


		<p>Commelinaceae <i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Fenzl</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21653, 22262, 74174, 74377, 107426</p> <p>Foto: 21653</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kilxtik</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>owakilit</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kilxtak</i> (para la planta entera) / <i>akskuna:t</i> (para la flor)</p> <p>Notas: Crece en sitios abiertos, a orilla de camino y entre los cultivo, particularmente en suelos húmedos. Es comestible, las hojas se consumen en tamal como en forma de tortila. También se prepara en caldo o guisado. Se hierven las hojas con sal caliza.</p>
		<p>Foto (izquierdo): 21653 Foto (derecho): 22262</p>	
		<p>Foto: 74174</p>	<p>Notas: Crece en cafetales y suelos húmedos. Esta planta es comestible, se aprovechan las hojas y los tallos tiernos, se puede preparar en forma de caldo, se hierven en agua con sal al gusto, también se hacen en tamales, se prepara la masa y se le agregan las hojas a la mezcla, posteriormente se envuelven en hojas de plátano.</p>

		<p>Commelinaceae <i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Fenzl.</p> <p>Descripción: yyy</p> <p>Colecta: 74377</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kihxtik</i></p> <p>Notas: Comestible, se aprovechan las hojas y los tallos tiernos, se puede preparar en forma de caldo, se hierben en agua con sal al gusto, también se hacen en tamales, se prepara la masa y se le agregan las hojas a la mezcla, posteriormente se envuelven en hojas de plátano.</p>
		<p>Commelinaceae <i>Tradescantia commelinoides</i> Schult. & Schult.f.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22043</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qasmalh</i></p> <p>Tipos: Aunque clasificaron a esta hierba como aqasmal, todos los asesores de Zongozotla dijeron que no conocen ésta en particular.</p>
		<p>Commelinaceae <i>Tradescantia poelliae</i> D.R. Hunt</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22319, 74543</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>ma:talín</i></p> <p>Notas: Crece en cafetales, sitios abierto y en suelos húmedos. No presenta ningún uso; más bien se considera maleza.</p>

		<p>Foto: 74543</p>	
		<p>Commelinaceae <i>Tradescantia zanonía</i> (L.) Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21572, 21713</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Notas: Crece en cafetales y por las orillas de caminos. No tiene uso.</p>
			

		<p>Commelinaceae <i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse</p> <p>Colecta: 22193, 74030</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xa smantahwa aqasmal</i> (el morado <i>aqasmal</i>)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kilxtak</i></p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ma:talín</i></p> <p>Notas: Esta planta es medicinal, las hojas son preparadas en forma de té, para aliviar el malestar provocado por los riñones. (15 hojas/1 litro de agua).</p>
			
		<p>Commelinaceae <i>Tripogandra purpurascens</i> (S. Schauer) Handlos</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74325</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Notas: Conocen varios tipos de esta planta que crece en cafetales y en suelos húmedos, no presenta ningún uso, es considerado maleza.</p>

		<p>Foto: 20194 (de San Juan Tahitic)</p>	
		<p>Commelinaceae <i>Tripogandra purpurascens</i> (S. Schauer) Handlos (de flor blanca)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22435</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>ma:talín</i></p> <p>Notas:</p>
		<p>Commelinaceae <i>Tripogandra serrulata</i> (Vahl) Handlos</p> <p>Col. 21385</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqasmal</i> (oreja.diminutiva.prostrada)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>ma:talín</i></p> <p>Notas: Se mencionan 3 tipos de <i>aqasmal</i>. diferenciados por el tallo y flores. Se desarrolla en cafetales y maizales. Es planta comestible, se prepara con frijoles de olla y con masa en forma de tamales.</p>



Commelinaceae
Tripogandra serrulata (Vahl)
Handlos

Colecta: 21554, 21823, 74041

Foto: 21554

Foto (file abajo): 21823

Totonaco de Zongozotla
xa chaspupuku aqasmal
(el pie azul *aqasmal*)







Cuetzalan Náhuat:
ma:talín






Notas (21554 y 21823): Crece en cafetales y en suelos húmedos. No presenta ningún uso; es considerado maleza.












Foto: 74041




Notas: Significa su nombre *aqasmal* de tallo azul, proviene de *chaxpán* 'pierna, pata, corteza, exterior', + *spupúk* 'azul'. Conocen varios tipos de esta planta que crece en cafetales y en suelos húmedos. No presenta ningún uso, es considerado maleza.


			
		<p>Convolvulaceae <i>Cuscuta</i> sp.</p> <p>Descripción: yyy</p> <p>Colecta: 21632, 74404</p> <p>Nanacatlan Labores del hogar. El tallo se dobla o enrolla y se usa como estropajo para tallar el cuerpo de los niños durante el baño.</p> <p>Medicinal. La planta entera se hierve para prevenir enfermedades infecciosas en niños.</p> <p>Tonalixco Conoce un tipo de esta planta que crece en todos los sitios. Medicinal, se emplea para baño contra la hinchazón y el cansancio en cualquier zona del cuerpo.</p> <p>Conoce un tipo de esta planta que crece en todos los sitios. Medicinal, se hierve la planta entera y con ello se</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqlalna:wat</i> (cabello rubio)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>sakapal</i></p> <p>Usos: Medicinal, se aprovecha la planta completa en forma de baño para prevenir enfermedades en bebés y para el espanto provocado por eventos traumáticos.</p>
			









		lavan los mezquinos, después de varias aplicaciones estos se caen.		
		<p>Convolvulaceae <i>Dichondra sericea</i> Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74347</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmu: xuwa sakah</i> (solamente uno de tres asesores dieron este nombre) (arruga de tuza)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Convolvulaceae <i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74417</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>munchalo: tawan</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea aristolochiifolia</i> G. Don</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74403</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi siyu'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea batatas</i> L.</p> <p>Colecta: 21389, 21522, 22261, 74002, 74361</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapah miya:k</i> (bejuco [blanco]) Cuetzalan Náhuat: <i>ka:xtapa:n</i> Náhuat de Zoquiapan <i>tapacho:lkamoh</i> Tipos: Hay 4 tipos, diferenciados por los colores de la flor. Usos: Esta planta es aprovechada con fines de forraje para puercos, mulas y conejos.</p>









				
		<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea batatoides</i> Choisy</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74288</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasqawawa siyu: miya:k</i> (bejuco entrelazado rosa)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de flor morado, este es rosa</p> <p>Usos: Comestible, se aprovechan únicamente las hojas, la planta se consume en forma de caldo, se hierben las hojas con bicarbonato de sodio mezclado o sal caliza. También se puede preparar con frijoles, después de que se hierbe con bicarbonato o sal caliza, se escurren y se le agrega a los frijoles.</p>	
				

		<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea cholulensis</i> (HBK) G. Don.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21492, 74299</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:sqolh cha:n</i> (trompeta de hormiga)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento, se considera maleza.</p>		
					
				<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea dumosa</i> (Benth) L. O. Williams</p> <p>Colecta: 22413, 22493, 74001</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasmantahwa siyu: maya:k</i> (bejuco entrelazado [morado]) Cuetzalan Náhuat: <i>so:yo:kilit</i> Totonaco de Atlequizayán <i>suyu: kaka'</i> Usos: Comestible, se aprovechan únicamente las hojas, la planta se consume en forma de caldo, se hierben las hojas con bicarbonato o sal caliza. También se puede preparar con frijoles.</p>

			
		<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.</p> <p>Colecta: 21506, 74026</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaspupuku miya:k</i> (bejuco [azúl]) Cuetzalan Náhuat: <i>kaxtapa:n</i> Tipos: Hay 4 tipos, se diferencian por el color de la flor. Usos: Esta planta es aprovechada con fines de forraje para puercos, mulas y conejos.</p>
			






			<p>Convolvulaceae <i>Ipomoea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22130</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:sqolh cha:n</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>maya:k</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Convolvulaceae <i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.</p> <p>Colecta: 22283</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>miya:k</i> (bejuco)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Convolvulaceae <i>Merremia tuberosa</i> (L.) Rendle</p> <p>Colecta: 22228</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido. (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>a:qa:wa'</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>	







			
		<p>Cornaceae <i>Cornus excelsa</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22044</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Costaceae <i>Costus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21992</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xchankat paxni'</i> (caña de cerdo)</p> <p>Usos: Medicinal.</p>


		<p>Costaceae <i>Costus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22087</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xchankat paxni'</i> (caña de cerdo)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xchankat paxni'</i> (caña de cerdo)</p> <p>Usos: Medicinal.</p>	
			<p>Costaceae <i>Costus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74203</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xchankat paxni'</i> Cuetzalan Náhuat <i>masa:owat</i></p> <p>Usos: Medicinal, se utiliza para tratar los malestares de los riñones como dolor en el costado y sangrado al orinar, se pueden preparar las hojas en forma de té (2 hojas/1 litro de agua), también se aprovechan los tallos, sin embargo estas no requieren preparación, se pueden masticar crudas.</p>
			<p>Crassulaceae <i>Bryophyllum delagoense</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74498</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhkuya:t xanat</i> (flor de fuego)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de hojas anchas.</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornamento para jardines.</p>








			<p>Crassulaceae <i>Echeveria rosea</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 21700</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Crassulaceae <i>Echeveria</i> sp.</p> <p>Colecta: 21698</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Crassulaceae <i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21696, 74542</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhkuya:t xanat</i> (flor de fuego) Cuetzalan Náhuat <i>sese:kpahxiwit</i></p> <p>Usos: Sin uso. Nota: M. Gorostiza comenta que en S.M. Tzinacapan es medicinal, para curar la fiebre.</p>







			<p>Crassulaceae <i>Sedum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22360</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kilhtsitsi: tawan</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>
			<p>Crassulaceae <i>Sedum orbatum</i> Moran & J. Meyrán</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21697</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kilhtsitsi: tawan</i> (sin análisis)</p> <p>Usos:</p>
		<p>Cucurbitaceae <i>Cucurbita okeechobeensis</i> subsp. <i>martinezii</i> (L.H. Bailey) Walters & Deck.-Walt.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22093, 74316</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:sasa:t</i> Cuetzalan Náhuat <i>mohchi</i> Totonaco de Atlequizayán <i>a:sat</i> Usos: El fruto seco se utiliza para la elaboración de las sonajas para danzantes de Quetzal, una vez que el fruto se encuentra totalmente seco, se le hace una abertura, con el fin de retirar todo el interior, posteriormente se rellena con</p>	







			<p>semillas de <i>Canna tuerckkeimii</i>. También, con el fruto se elaboran unos juguetes artesanales, conocidos como trompos chifladores, al fruto seco se le hacen cuatro orificios circulares y se le agrega una vara como eje principal, con apoyo de una cuerda enrollada se provoca la fuerza necesaria para que el objeto gire, la entrada de aire sobre los orificios produce un sonido peculiar.</p>
		<p>Cucurbitaceae <i>Cyclanthera gacillima</i> Cogn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21551</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkulu:n</i> (sin análisis)</p> <p>Usos: Esta planta es comestible, se preparan las hojas y la punta de la planta en caldo, también se puede consumir crudo acompañado de tortillas</p>
		<p>Cucurbitaceae <i>Cyclanthera langaei</i> Cogn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22349, 74300, 74555</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqe:wa'</i> (falta analizar)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>ma:k^wi:lkilit</i></p> <p>Usos: Comestible, se preparan las hojas y la punta de la planta en caldo, también se puede consumir crudo acompañado de tortillas.</p>








			
		<p>Cucurbitaceae <i>Cyclanthera ribiflora</i> (Schltdl.) Cogn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21577, 21656, 22192, 22195, 22277, 74411, 74137, 74412</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkulu:n</i> (falta anlaizar) Cuetzalan Náhuat <i>tsohpikilit</i> Totonaco de Atlequizayán <i>xkulu:n</i> (sin análisis)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, se distinguen por el color de las flores, esta es verde, los otros con amarillos y blancos Usos: Comestible, las hojas se pueden consumir crudas o en caldo.</p>
			








		<p>Cucurbitaceae <i>Echinopepon racemosus</i> (Steud.) C. Jeffrey</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74432</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpupa tsi:ya'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Cucurbitaceae <i>Hanburia mexicana</i> Seem.</p> <p>Colecta: 22060, 22220</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>chichi:k witsti</i></p>
			









		<p>Cucurbitaceae <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74306</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akchukut</i> (cabeza cortada) Cuetzalan Náhuat <i>xikal</i> (jícara)</p> <p>Nota: En casi todo Cuetzalan lo conocen como <i>mohchi</i>.</p> <p>Usos: De esta planta se aprovecha el fruto como contenedor de tortillas. Al madurar el fruto se corta y se le hace una abertura en el extremo pegado al pedúnculo, se le agrega agua y se deja reposar hasta que todo el interior del fruto se pudra, posteriormente se lava y se pone a secar al sol.</p>
		<p>Cucurbitaceae <i>Melothria pendula</i> L.</p> <p>Colecta: 21456, 74078</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xqaya tsikts</i> (chilacayote de pájaro)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>xa:xantiah</i></p> <p>Usos: El fruto de esta planta se comestible, y han observado que las aves también se alimentan de este fruto.</p> <p>Nota: M. Gorostiza no menciona que es comestible.</p>
			




		<p>Cucurbitaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22295</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Cucurbitaceae <i>Peponopsis adhaerens</i> Naudin</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74577</p>
			




		<p>Cucurbitaceae <i>Psiguria triphylla</i> (Miq.) C. Jeffrey</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74291</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xalo:qwat xkut</i> (granada de tejón)</p> <p>Usos: El fruto es comestible.</p>
			
		<p>Cucurbitaceae <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74366</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maklhtaku:n</i> (espinoso) Cuetzalan Náhuat <i>witsti</i></p> <p>Tipos: Hay varios, se diferencian por las características de los frutos. Este es cultivado.</p> <p>Usos: El fruto es comestible, los brotes tiernos se consumen en caldo, se hierve primeramente con sal caliza y después con sal refinada al gusto.</p>






		<p>Cucurbitaceae <i>Sicydium</i> cf. <i>schiedeanum</i> Schltdl.</p> <p>Colecta: 22039</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Cucurbitaceae <i>Sicydium</i> sp.</p> <p>Colecta: 22452</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Cucurbitaceae <i>Sicyos microphyllus</i> HBK.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74547</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpupa tsi:ya'</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay 1 solo tipo, aunque hay varias plantas con el mismo nombre.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	




			
			<p>Cupressaceae <i>Cupressus benthamii</i> Endl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21884</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>paxni kiwi'</i> (árbol puerco)</p> <p>Usos: Este árbol es aprovechado para extracción de madera y posteriormente para la elaboración de muebles</p>
		<p>Cupressaceae <i>Cupressus lusitanica</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74195</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paxni kiwi'</i> (árbol puerco)</p> <p>Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (M. Gorostiza agrega que lo ha visto en tierras frías)</p> <p>Usos: Este árbol es aprovechado para extracción de madera y posteriormente para la elaboración de muebles</p>









			<p>Cyperaceae <i>Carex</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74420</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqat</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>sakat</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Cyperaceae <i>Carex</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74504</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chastu:tatu choq:tno'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Cyperaceae <i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standley</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74135</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chastu:tatu choq:tno'</i> (de tres esquinas)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>









			<p>Cyperaceae <i>Cyperus hortensis</i> (Salzm. ex Steud.) Dorr</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74422</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chastu:tatu choq:tno'</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se especifican.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Cyperaceae <i>Cyperus</i> sp.</p> <p>Colecta: 107384</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Cyperaceae <i>Cyperus</i> sp.</p> <p>Colecta: 107439</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>








Sin registro fotográfico	<p>Cyperaceae <i>Cyperus</i> sp.</p> <p>Colecta: 107440</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>		
Sin registro fotográfico	<p>Cyperaceae <i>Cyperus</i> sp.</p> <p>Colecta: 107441</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>		
			<p>Cyperaceae <i>Eleocharis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74360</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xnoqonqo:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:lilisto:n</i></p> <p>Usos: Se utilizaba para la recreación, al aplastar la estructura del tallo, genera un sonido atractivo.</p>







		<p>Cyperaceae <i>Eleocharis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74421</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laktsu: xnoqonqo:t</i> Cuetzalan Náhuat <i>a:li:li:ston</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es una planta más grande (más del doble de tamaño)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Cyperaceae <i>Fimbristylis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74418</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqatsasni: saqat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Cyperaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 107390</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>








Sin registro fotográfico	<p>Cyperaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 107391</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>		
Sin registro fotográfico	<p>Cyperaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 107418</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>		
			<p>Cyperaceae <i>Rhynchospora polyphylla</i> Vahl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74491</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi choq:tno'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. San Juan Tahitic Náhuat <i>sakat</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>








		<p>Cyperaceae <i>Scleria gaertneri</i> Raddi</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74416</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chastu:tatu choqo:tno'</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Al parecer todas las ciperáceas tienen el mismo nombre, las personas piensan que se trata del mismo individuo.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Cyperaceae <i>Scleria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74492</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>choqo:tno'</i> (falta analizar)</p> <p>Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido.</p> <p>San Juan Tahitic Náhuat <i>sakat</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Dioscoreaceae <i>Dioscorea convolvulacea</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22102, 22118, 22120, 22172, 22227</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:chaqana: miya:k</i> (bejuco de jabón)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>maya:k</i></p> <p>Usos: Las raíces se aprovechan como sustituto de jabón para lavar ropa.</p>







				
			<p>Dioscoreaceae <i>Dioscorea nelsonii</i> Uline ex R. Knuth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22189</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:chaqana: miya:k</i> (bejuco de jabón)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>maya:k</i></p> <p>Usos: Las raíces se aprovechan como sustituto de jabón para lavar ropa.</p>
			<p>Dioscoreaceae <i>Dioscorea remotiflora</i> Uline ex Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22131, 22345</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:chaqana: miya:k</i> (bejuco de jabón)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>maya:k</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>ta:Imekat</i></p> <p>Usos: Las raíces se aprovechan como sustituto de jabón para lavar ropa.</p>








		<p>Dioscoreaceae <i>Dioscorea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74400</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:chaqana: miya:k</i> (bejuco de jabón)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de hojas más grandes (triple)</p> <p>Usos: Las raíces se aprovechan como sustituto de jabón para lavar ropa.</p>	
			<p>Dioscoreaceae <i>Dioscorea</i> sp.</p> <p>Colecta: 74666</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:chaqana: miya:k</i></p> <p>Notas: <i>Li:chaqana: miya:k</i> se interpreta como bejuco de jabón, proviene de las palabras, <i>li:chaqan</i> jabón y <i>miya:k</i> bejuco. Conocen dos tipos de esta planta que crece a orilla de caminos, el otro es de hojas más pequeñas. Las raíces se aprovechan como sustituto de jabón para lavar ropa.</p>
		<p>Dipentodonaceae <i>Perrottetia longistylis</i> Rose</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21489, 74270</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsawa: kiwi'</i> (árbol pequeño) Cuetzalan Náhuat <i>wa:wkowit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>	

		<p>Ebenaceae <i>Diospyros nigra</i> (J.F. Gmel.) Perr. (syn. <i>D. digyna</i> Jacq.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74128</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>swalh</i> (negro) Cuetzalan Náhuat <i>ti:Itsapot</i> Usos: Fruto comestible, además, cuando el fruto aún es inmaduro, estos se molían y utilizaban en la pesca, los frutos machacados se echaban a las pozas y provocaba la muerte de todos los organismos que allí habitaban, actualmente esta práctica pesquera está prohibida.</p>
		<p>Ericaceae <i>Agarista sleumeri</i> Judd</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74258</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqotnán kiwi'</i> (uno de tres asesores) (árbol agridulce)</p> <p>Usos: Se aprovecha solo como leña.</p>
		<p>Ericaceae <i>Bejaria aestuans</i> L.</p> <p>Colecta: 74061, 74062</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>masksat xanat</i> Cuetzalan <i>koyo:po:lxo:chit</i> Tipos: Hay 2 tipos, Flores rosas y blancas.</p> <p>Usos: Planta ornamental y cultural, se aprovechan las flores como ornato para mesas. El tallo y raíces se utilizan para la elaboración de baleros artesanales.</p>







			
			<p>Ericaceae <i>Comarostaphylis</i> sp.</p> <p>Colecta: 21866</p> <p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			





		<p>Ericaceae <i>Gaultheria erecta</i> Vent.</p> <p>Colecta: 21869</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Ericaceae <i>Monotropa uniflora</i> L.</p> <p>Colecta: 22306</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Ericaceae Pendiente.</p> <p>Colecta: 21699</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqotnán kiwi'</i> (árbol agridulce)</p> <p>Usos: El tallo es aprovechado para la elaboración de baleros artesanales y como combustible en forma de leña.</p>	







		<p>Ericaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21877</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Ericaceae <i>Vaccinium confertum</i> Kunth</p> <p>Colecta: 21871</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Ericaceae <i>Vaccinium leucanthum</i> Schlttdl.</p> <p>Colecta: 74071</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqotnán kiwi'</i> (árbol agridulce)</p> <p>Usos: El tallo es aprovechado para la elaboración de baleros artesanales y como combustible en forma de leña.</p>

			<p>Euphorbiaceae <i>Acalypha arvensis</i> Poepp. & Endl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21836, 74219</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaxtakni qantsapu: xanat</i> (flor gusano) Cuetzalan Náhuat <i>si:sipotsitsi:n</i></p> <p>Usos: Esta planta es medicinal, se utiliza para el tratamiento contra la próstata, se prepara el forma de té, haciendo una infusión con cantidades aproximadas de (3 ramas de 20 cm/1 litro de agua).</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Acalypha schlechtendaliana</i> Müll. Arg.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21460, 21781, 22498</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:naq</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>ti:ltako:t</i></p>	
				







		<p>Euphorbiaceae <i>Acalypha</i> sp.</p> <p>Colecta: 22000</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Euphorbiaceae <i>Acalypha</i> sp.</p> <p>Colecta: 22410</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Acalypha</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74125</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo qantsapu: xanat</i> (flor de gusano [rojo]) Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de inflorescencia verde Usos: Esta planta es medicinal, se utiliza para el tratamiento contra la próstata, se prepara el forma de té, haciendo una infusión con cantidades aproximadas de (3 ramas de 20 cm/1 litro de agua).</p>	

		<p>Euphorbiaceae <i>Acalypha</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22011</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo qantsapu: xanat</i> (flor de gusano [rojo])</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de inflorescencia verde</p> <p>Usos: Esta planta es medicinal, se utiliza para el tratamiento contra la próstata, se prepara el forma de té, haciendo una infusión con cantidades aproximadas de (3 ramas de 20 cm/1 litro de agua).</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Alchornea latifolia</i> Sw.</p> <p>Colecta: 21801, 74021</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tu:xkatat</i> (sin interpretación)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>xi:kalkowit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como leña.</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Bernardia mexicana</i> (Hook. & Arn.) Müll. Arg.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22033, 74319, 74321</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:su:t kiwi'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>







			
<p>Sin registro fotográfico</p>		<p>Euphorbiace <i>Chamaesyce</i> sp. Colecta: 107435</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Cnidoscolus</i> sp. Colecta: 22363</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qahni'</i> Totonaco de Atlequizayán <i>qahni'</i> Tipos: Hay 2 tipos, uno tiene flor agachada y el otro erecto Usos:</p>





		<p>Euphorbiaceae <i>Croton draco</i> Schltld. & Cham.</p> <p>Colecta: 74022</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puklhnan kiwi'</i> (árbol nublado) Cuetzalan Náhuat: <i>eskowit</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, uno tiene flor agachada y el otro erecto Usos: En la antigüedad al no existir dentistas, de este árbol se aprovechaba el látex para controlar el dolor y extraer los dientes dañados, se aplicaba una o dos gotas de látex en el diente dañado, este provocaba que los dientes se destruyeran por completo.</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Croton stipulaceus</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22042</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			







			<p>Euphorbiaceae <i>Dalechampia heteromorpha</i> Pax & Hoffmann</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74348</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akswa: tawan</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>temekat</i></p> <p>Usos: Medicinal, se utiliza para tratar la tosferina, se hierve el bejuco y se toma en forma de té (10 hojas/1 litro de agua).</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia cyathophora</i> Murr.</p> <p>Colecta: 21467, 21853</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia graminea</i> Jacq.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21469, 22180, 74431, 107443</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqstah tawan</i> (hierba que gotea)</p> <p>Tipos: Hay un solo tipo aunque existe otra planta con el mismo nombre (<i>Lobelia laxiflora</i>).</p> <p>Usos: Sin uso.</p>










			
		<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia heterophylla</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22086</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tampu:nu: xanat</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>lak tsu palhtuh xanat</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia hirta</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22490</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74518</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>palhtoh xanat</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>k^we:k^wetaxo:chit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como ornamento y como cerca viva para delimitar terrenos.</p>	
			<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74271</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puxqa: tawan</i> (hierba de arroyo) Nota: Según los asesores crece cerca de cuerpos de agua y zonas húmedas</p> <p>Usos: Medicinal, se utiliza para tratar la Hepatitis B, se administra en forma de té, se hierven las plantas con una bráctea de mazorca morada (12 hojas + 1 bráctea de maíz/1 litro de agua).</p>
			<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74346</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqaspitah tawan</i> (solamente uno de tres asesores dio este nombre) (hierba volteada)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>







			<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74540</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tampu:nu: xanat</i> (flor de fondo) o xalak tsuwi palhtoh xanat (flor de fondo)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21507</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107398</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin registro de datos.</p>







Sin registro fotográfico		<p>Euphorbiaceae <i>Euphorbia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107436</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin registro de datos.</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Gymnanthes actinostemoides</i> Müll.Arg.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21995</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>Ihkutapiks</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Gymnanthes riparia</i> (Schltdl.) Klotzsch</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22448, 74561</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>Ihkutapiks</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>

		<p>Euphorbiaceae <i>Gymnanthes</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21792</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>Ihkutapiks</i></p>
		<p>Euphorbiaceae <i>Gymnanthes</i> sp.</p> <p>Colecta: 74095</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>Ihkutapiks</i> (que truena al quemarse)</p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como leño.</p>
			







			<p>Euphorbiaceae <i>Jatropa curcas</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74201</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chu:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>kowach</i></p> <p>Nota: En Tzinacapan se conoce <i>Ricinus communis</i> L. con el mismo nombre, no es así en totonaco.</p> <p>Usos: De esta planta se aprovechan las semillas para la elaboración de distintos platillos.</p>
			<p>Euphorbiaceae <i>Manihot esculenta</i> Crantz</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74324</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tasani: qoxqawi'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>kowkamoh</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de raíces color café, esta es de coloración rojiza</p> <p>Usos: Comestible, se aprovechan únicamente las raíces, se inicia retirando la corteza de los tubérculos, se troza y por último se pone a hervir con azúcar o panela al gusto.</p>
				







		<p>Euphorbiaceae <i>Ricinus communis</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74116</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo qahni'</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat <i>kowach</i> (nota que el mismo nombre se aplica a <i>Jatropha curcas</i> L.)</p> <p>Usos: Anteriormente, se compraba los frutos de esta planta para la extracción de aceites.</p>	
		<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Bauhinia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22110</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmaqachupi ju:ki'</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xmaqachupi ju:ki'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Chamaecritsa</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74188</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqslile:q</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Chamaecritsa</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22222</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqslile:q</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Chamaecritsa</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21361</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqslile:q</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Senna</i> sp.</p> <p>Colecta: 22091</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmaqaxat ni:n</i> (mugre de muerto)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kstapu luwa'</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Senna</i> sp.</p> <p>Colecta: 22175</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmaqaxat ni:n</i> (mugre de muerto)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kstapu luwa'</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Caesalpinioideae <i>Senna</i> sp.</p> <p>Colecta: 74083</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmaqaxat ni:n</i> (mugre de muerto)</p> <p>Cuetzalan Náhuatl <i>mike:mahpil</i></p> <p>Usos: Sin uso. Nota: Según M. Gorostiza en S.M. Tzinacapan Esta planta se utiliza para tratar el salpullido.</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Acacia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74189</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:ma:katli:n</i> (para fermenta)</p> <p>Usos: De esta planta se aprovechan las raíces para elaborar tepache. Se comienza por la extracción de las raíces, posteriormente estas se asan a las brasas con el único fin de que se le pueda desprender la corteza, después se machan y se ponen en una vasija de barro (0.5 q de raíz/20 litros de agua), se endulza con 2 q de panela y se deja reposar por 4 días y listo.</p>








			<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Albizia tomentosa</i> (M. Micheli) Standl. var. <i>purpusii</i> (Britton & Rose) L. Rico & S. Gale Descripción:</p> <p>Colecta: 22113</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsatsan</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>stapun kiwi'</i></p>
			<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl. Descripción:</p> <p>Colecta: 21447, 74104, 107431</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsatsan</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat: <i>tsonto:toya</i></p> <p>Usos: Se aprovecha el tallo únicamente como combustible en forma de leño.</p>
				







		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Calliandra</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74438</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqslile:q</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Aunque hay un solo tipo de esta planta, hay otra planta con el mismo nombre.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth.</p> <p>Colecta: 22008, 74668</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsatsan</i></p> <p>Notas: <i>Tsatsan</i> no tiene una interpretación. Conocen dos tipos de este arbusto, el otro es de flores rojas, este es de color rosa con blanco. Crece a orilla de caminos y se aprovecha como leña.</p>







				
			<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Cojoba arborea</i> (L.) Britton et Rose</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22482</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>stapun kiwi'</i></p> <p>Usos:</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Inga jinicuil</i> Schltld.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74108, 74243</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tala:xqa'</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuatl <i>xonek^wil</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de vainas aplastadas</p> <p>Usos: Las semillas del fruto de esta planta son comestibles y se emplea como generador de sombra en los cultivos de café y para filtrar el nitrógeno atmosférico al subsuelo, esto les permite a las plantas de</p>	









			<p>café tener mayor producción</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Inga</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22077</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqlha:t kálama'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xalak tsuw kalama'</i></p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Inga</i> sp.</p> <p>Colecta: 74093</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kálama'</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat <i>chalawih</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de tallo rojo en el interior. Usos: Las semillas del fruto de esta planta son comestibles y se emplea como generador de sombra en los cultivos de café y para filtrar el nitrógeno atmosférico al subsuelo, esto</p>








			<p>les permite a las plantas de café tener mayor producción. Nota: M. Gorostiza, en el mpio. Cuetzalan se usa para dar sombra a café y para leña.</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Inga</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74273</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqlha:t kálama'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>chalawih</i></p> <p>Usos: Fruto comestible, el recubrimiento de las semillas se consume, además se aprovecha para provocar sombra al cultivo de café.</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22149, 74114</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lile:q</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat <i>wa:xin</i> Totonaco de Atlequizayán <i>lele:q</i></p> <p>Usos: Las semillas del fruto son comestibles, también las hojas tiernas y brotes se consumen crudas.</p>







				
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Leucaena</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22151</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lile:q</i> (sin interpretación)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>tsutsun</i></p> <p>Usos: Las semillas del fruto son comestibles, también las hojas tiernas y brotes se consumen crudas.</p>	
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Leucaena</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74311</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>neqsi:s</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (Nota: Es sorprendente que M. Gorostiza no nombra ni clasifica este <i>Leucaena</i>)</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>	







		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Mimosa albida</i> H. & B. ex Willd.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21452, 74382, 107427</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ma:xana: tawan</i> (hierba penosa) Cuetzalan Náhuat <i>pi:na:wits</i></p> <p>Usos: De esta planta se aprovechan las raíces para elaborar tepache. Desconoce las cantidades necesarias para la elaboración de la bebida.</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Mimosa somnians</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74282</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsiji:tñi'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>sie:rrahwits</i></p> <p>Usos: Sin uso. Se considera maleza.</p>
		<p>Fabaceae: Mimosoideae <i>Zapoteca</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22147</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>le:qoqot tsutsun</i></p> <p>Usos: Las semillas del fruto son comestibles, también las hojas tiernas y brotes se consumen crudas.</p>








Sin registro fotográfico			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Aeschynomene</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107365</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Amicia zygozeris</i> DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74253</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpipile:q tawan</i> (hierba mariposa)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Amphicarpea bracteata</i> (L.) Fernald</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22221</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsilli: stap</i></p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>ta:let</i></p>









			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74414</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kiwi: stap</i> (frijol de árbol) Cuetzalan Náhuat <i>kowet</i></p> <p>Usos: El fruto es comestible, se consume hervido o las semillas en caldo. Nota: Según M. Gorostiza hay dos tipos, el otro es de flores naranjas. Para los de Zongozotla hay un solo tipo.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth.) C. Wright</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22412</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Canavalia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21726</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que se distinguen por el color y tamaño de las flores.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>

		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Canavalia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22041</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que se distinguen por el color y tamaño de las flores.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Canavalia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22240</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Canavalia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74245</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que se distinguen por el color y tamaño de las flores.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	

			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Canavalia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22405</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que se distinguen por el color y tamaño de las flores.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Centrosema macrocarpum</i> Benth.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107380</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Centrosema plumieri</i> (Turp. ex Pers.) Benth.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22162</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja)</p> <p>Tipos: Varios tipos distinguidos por el color y tamaño de las flores, esta es de flor morada</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento. (niños).</p>

		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Centrosema</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74242</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor molleja) Cuetzalan Náhuat <i>ma:tapa:nxiwit</i> Nota: M. Gorostiza comenta que en Tzinacapan se tiene la creencia, si se juega o manipula la planta, uno tenderá a romper los trastes (niñas) y herramientas de trabajo (niños).</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Chaetocalyx</i> cf. <i>brasiliensis</i> (Vogel) Benth.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22219</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido. Náhuat de Zoquiapan <i>chichi:k et</i></p>
			










		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Clitoria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22049, 74386</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki: xanat</i> (flor de molleja)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Cologania</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74301</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xta:xwiki: tsikts</i> (molleja de pájaro)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria acapulcensis</i> Hook. & Arn.</p> <p>Colecta: 22258</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n</i></p>

			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria bupleurifolia</i> Schltl. & Cham. var. <i>bupleurifolia</i></p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n</i></p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria sagittalis</i> L.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n</i></p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria</i> sp.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puyoh xanat</i> (flour de pollo)</p>	<p>Usos: Anteriormente se utilizaba el tallo de esta planta para elaborar jaulas trampa, para la cacería de codornices.</p>

			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74107</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n</i> (frijol de muerto) Cuetzalan Náhuatl <i>ihchayakani</i> Usos: Es una planta medicinal, en la antigüedad, a los niños que se orinaban en la cama por no poder controlar su cuerpo, se les daban a comer los frutillos de esta planta cada vez que se toparan con esta hasta que el niño quede totalmente curado.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74451</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n / makatsikilh</i> (frijol de muerto / sonaja) Tipos: Originalmente solo existe una planta con este nombre (<i>Crotalaria pumila</i>), sin embargo, las personas reconocen a esta con el mismo nombre, debido a las similitudes que tiene con respecto a la original.</p>







			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74453</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n / makatsikilh</i> (frijol de muerto / sonaja)</p> <p>Nota: Los asesores consideran esta planta con el ejemplar 74451 como la misma especie. Originalmente solo existe una planta con este nombre (<i>Crotalaria pumila</i>), sin embargo, las personas reconocen a esta con el mismo nombre, debido a las similitudes que tiene con respecto a la original.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Crotalaria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74454</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu ni:n / makatsikilh</i> (frijol de muerto / sonaja)</p>	
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium caripense</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21509, 74237</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamanqa:t</i> (pagajoso)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>ta:la:mat</i></p> <p>Usos: Ésta no presenta ningún aprovechamiento.</p>







			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) J.F. Macbr.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22143</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamaŋa:t</i> (pagajoso)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>snoqtaya'</i></p> <p>Usos: Ésta no presenta ningún aprovechamiento.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium nicaraguense</i> Oerst.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22142</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamaŋa:t</i> (pagajoso)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>snoqtaya'</i></p> <p>Usos: Ésta no presenta ningún aprovechamiento.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium plicatum</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21702</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamaŋa:t</i> (pagajoso)</p>	







			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74326</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamaŋa:t</i> (pegajoso) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (Nota: M. Gorostiza no lo considera un tipo de <i>ta:la:mat</i>)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, pero no se especifican. Usos: Sin aprovechamiento.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74327</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamaŋa:t</i> (pegajoso) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (Nota: M. Gorostiza no lo considera un tipo de <i>ta:la:mat</i>)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, pero no se especifican. Usos: Sin aprovechamiento.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74337</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>snoqta:y</i> (sin análisis)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>








			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74425</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>snoqta:y</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: <i>Las personas creen que este ejemplar y el #74337 son el mismo individuo.</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74466</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>snoqta:y</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay 3 tipos, uno es una planta más pequeña que esta y la otra del doble de tamaño.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74529</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>snoqta:y</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se especifican.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Desmodium</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74588</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamaŋa:t</i> (pegajoso)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se especifican.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>		
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Dioclea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74576</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stapu: miya:k</i> (bejuco frijol)</p> <p>Tipos: Hay un solo tipo.</p> <p>Usos: En la antigüedad, el tallo se aprovechaba en la elaboración de casas rústicas como laso para realizar los amarres en cada esquina.</p>	
				<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Dioclea</i> sp.</p> <p>Colecta: 74650</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stapu: miya:k</i></p> <p>Notas: <i>Stapu: miya:k</i> se interpreta como bejuco frijol, proviene de <i>stap</i> frijol y <i>miya:k</i> bejuco. Conocen un tipo de esta planta que crece sobre árboles en zonas conservadas. En la antigüedad, el tallo se aprovechaba en la elaboración de casas rústicas como laso para realizar los amarres en cada esquina.</p>







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Diphysa americana</i> (Mill.) M. Sousa</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74244</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi ma:tankah</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se utiliza como cerca viva.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Dussia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22440</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>simarrón</i></p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Eriosema diffusum</i> (Kunth) G. Don</p> <p>Colecta: 74101</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu tsikts</i> (frijol de pájaro)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>









			
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina</i> aff. <i>coralloides</i> DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21770, 74535</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasqawawa lalhne'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. Usos: Comestible, se aprovechan las flores para preparar distintos platillos, se preparan con frijoles enchilados o refritos, además se pueden preparar capeados con huevo. Además, esta planta se utiliza como cerca viva para delimitar terrenos.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina americana</i> Mill.</p> <p>Colecta: 21768</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo lalhne'</i> (sin análisis) Tipos: Hay 7 tipos, se diferencian por el color de la inflorescencia. Usos: De esta planta se aprovechan las inflorescencias para preparar distintos platillos, se preparan con frijoles enchilados o refritos, además se pueden preparar capeados con huevo. Además, esta planta se utiliza como cerca viva para delimitar terrenos.</p>

		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina berenices</i> Krukoff et Barneby</p> <p>Colecta: 21657</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqátalo'</i> (sin análisis)</p> <p>Tipos: Hay 7 tipos, se diferencian por el color de la inflorescencia.</p> <p>Usos:</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina salviiflora</i> Krukoff et Barbeby</p> <p>Colecta: 22232</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqátalo'</i> (sin análisis)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>laqátali'</i></p>
			









		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina</i> sp.</p> <p>Colecta: 74025</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo lalhne'</i> (gásparo [rojo]) Cuetzalan Náhuat: <i>ekimit</i> o <i>ekimikowit</i> Tipos: Hay 7 tipos, se diferencian por el color de la inflorescencia. Usos: De esta planta se aprovechan las inflorescencias para preparar distintos platillos, se preparan con frijoles enchilados o refritos, además se pueden preparar capeados con huevo. Además, esta planta se utiliza como cerca viva para delimitar terrenos.</p>	
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74505</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqátalo'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Existe una creencia similar de que si se llega a utilizar el tallo de este árbol como leña, el que lo queme provocará que su gallina quede ciega de por vida. Se aprovecha como cerca viva para delimitar parcelas.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74505</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqátalo'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Existe una creencia similar de que si se llega a utilizar el tallo de este árbol como leña, el que lo queme provocará que su gallina quede ciega de por vida. Se aprovecha como cerca viva para delimitar parcelas.</p>	






		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Erythrina</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74536</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapa lalhne'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (nota que M. Gorostiza no lo clasifica con los <i>Erythrina</i>).</p> <p>Usos: Comestible (véase entrada anterior).</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Flemingia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21834, 22169</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			








		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Galactia</i> sp. (or possibly <i>Teramnus</i> sp.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22299</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22158, 74363</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu luwa'</i> (frijol de víbora/serpiente)</p> <p>Usos: Sin uso.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kstapu luwa'</i></p>
			







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Lonchocarpus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74396</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kinsih</i> (es un intento de decir "quince")</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>	
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Melilotus albus</i> Medik.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22492</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Mucuna argyrophylla</i> Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22347</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qolompi:p</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos más grandes. Nota que M. Gorostiza dijo que lo había visto en zonas cálidas.</p> <p>Usos: Las semillas se utilizan como juguetes o para elaborar artesanías.</p>

			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Mucuna cf. holtonii</i> (Kuntze) Moldenke</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qolompi:p</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>Alampepe</i></p>
		<p>Descripción:</p>	<p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos más grandes. Nota que M. Gorostiza dijo que lo había visto en zonas cálidas.</p>	
			<p>Colecta: 22069, 74197, 74649</p>	<p>Usos: Las semillas se utilizan como juguetes o para elaborar artesanías.</p>







			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>utilis</i> (Wight) Burck</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>neskapeh</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>kowet</i> Totonaco de Atlequizayán <i>neskafé</i> Usos: Las semillas se aprovechan como sustituto de café, estas se tuestan y muelen para formar un polvo para infusión. Nota: M. Gorostiza comenta que se siembra con maíz con el fin de fijar nitrógeno.</p>
			<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Mucuna</i> sp.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qolompi:p</i> Totonaco de Atlequizayán <i>neskafé</i></p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urb.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>uyim</i> (jícama) Cuetzalan Náhuat <i>kahtso:t</i> Totonaco de Atlequizayán <i>xoqe kuyúm</i> Usos: El rizoma es comestible.</p>	







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Phaseolus coccineus</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74298</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqxana:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>tak^wa:waket</i></p>
	<p style="text-align: center;">Usos:</p> <p>Comestible, de esta planta se consumen las hojas, flores, frutos y raíces. Las hojas se preparan en caldo, se hierven en agua con sal caliza y/o bicarbonato de sodio y sal al gusto. Esta recibe el nombre de "Chiya: kak". Las flores se consumen en caldo, se hierven en agua con sal caliza y/o bicarbonato de sodio y sal al gusto, además se utiliza como relleno para tamales. Este recibe el nombre de "Aqxana:t". Las raíces se consumen endulzadas, primero se hierben, después se le retira la corteza y se machacan los tubérculos, posteriormente se vuelven a hervir con azúcar o panela al gusto. Este recibe el nombre de "Tsat". Los frutos se consumen hervidos, o las semillas en caldo o en tamales "Tlanka: stap".</p>		
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Phaseolus coccineus</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74332</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstapu luwa'</i> (frijol de víbora/serpiente)</p> <p>Nota: La especie silvestre se le conoce con este nombre.</p>







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Phaseolus</i> sp. (sensu stricto)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74423</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stranjeru stap</i> (extranjero frijol)</p> <p>Usos: Se consumen las semillas en tamales.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22218</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsilli: stap</i></p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>pixnet</i></p>
			







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Rhynchosia cf. erythrinoides</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74280</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xta:xwiki tsikts</i> (molleja de pájaro)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Rhynchosia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74520</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







			
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Rhynchosia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74590</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:tampa:chi mu:xni'</i> (faja de mono) Cuetzalan Náhuat <i>k^wetaxkolmekat</i></p> <p>Usos: Se tiene la creencia que las semillas de esta planta atraen el amor, el hombre o mujer que desee conseguir una pareja, deber cargar doce semillas en el bolso todos los días hasta que la persona indicada llegue.</p>
			







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Stylosanthes</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74394</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamanqa:tama:n</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Tephrosia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74357</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pulhkunta:y</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta)</p> <p>Usos: Sin uso</p>







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Trifolium repens</i> L.</p> <p>Colecta: 74067</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqtatu tawan</i> (hierba de tres hojas)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22300</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74433</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xu:yimi:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Fruto comestible, se consumen las semillas.</p>









		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22210</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki xanat</i> (falta analizar)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>exo:mekat</i></p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74307</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqaloqót stap</i> (frijol cornudo)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>chichimekoh et</i></p> <p>Usos: El fruto es comestible.</p>
			







		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74430</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ta:xwiki'</i> (molleja)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74503</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xta:xwiki tsikts</i> (molleja de pájaro)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			









		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22477, 22509</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xta:xwiki tsikts</i> (molleja de pájaro)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>laktsu kuyuk</i></p>
		<p>Fabaceae: Papilionoideae <i>Zornia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74390</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puyoh xanat</i> (flor de pollo)</p> <p>Tipos: Hay 1 tipo, aunque existe otra planta con el mismo nombre.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			








			
		<p>Fagaceae <i>Quercus corrugata</i> Hook</p> <p>Colecta: 22199, 22211, 22212, 22213, 22214</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukut</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>kostik a:wat</i></p>
			








		<p>Fagaceae <i>Quercus cortesii</i> Liebm.</p> <p>Colecta: 22200</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukut</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>kostik a:wat</i></p>
		<p>Fagaceae <i>Quercus germana</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74317</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhpuoqo kukut</i> (encino azul-grisáceo) Cuetzalan Náhuat <i>a:wa:t</i></p> <p>Tipos: No conoce cuantos tipos hay. Usos: Se aprovecha como leña.</p>
			







			<p>Fagaceae <i>Quercus hirtifolia</i> S. Valencia, Nixon & Kelly</p> <p>Colecta: 21895</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukut</i></p>
			<p>Fagaceae <i>Quercus</i> aff. <i>obtusata</i> Bonpl.</p> <p>Colecta: 22059</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukut</i></p>
			<p>Fagaceae <i>Quercus oleoides</i> Schltl. et Champ.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22080, 22178, 74310</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ma:tankah</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:wa:t</i> Totonaco de Atlequizayán <i>ma:tankah</i></p> <p>Usos: El tallo se emplea como columna en la elaboración de cabañas y casas rústicas. Nota: Según M. Gorostiza se aprovecha para leña. No</p>









			menciona construcción.	
			<p>Fagaceae <i>Quercus polymorpha</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22051, 74481</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukut</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay un solo tipo según los asesores.</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha como leña.</p>
				








			
			<p>Fagaceae <i>Quercus sapotifolia</i> Liebm.</p> <p>Colecta: 22058, 22079</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>kukat</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kukat</i></p>
			



		<p>Fagaceae <i>Quercus sartorii</i> Liebm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22057, 22201, 74224</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqsmiya:k</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:wa:t</i> o <i>a:wa:kowit</i> Náhuat de Zoquiapan <i>ista:k a:wat</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no enumerados.</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha como combustible en forma de leña.</p>	
				
			<p>Fagaceae <i>Quercus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74222</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqsmiya:k</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:wa:t</i> o <i>a:wa:kowit</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no enumerados.</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha como combustible en forma de leña.</p>

			
			<p>Fagaceae <i>Quercus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74223</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>Ihpupoqo kukut</i> (encino azul-grisáceo) Cuetzalan Náhuat <i>a:wa:t</i> o <i>a:wa:kowit</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no enumerados.</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha como combustible en forma de leña.</p>
			

		<p>Fagaceae <i>Quercus xalapensis</i> Bonpl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74225</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqsmiya:k</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:wa:t</i> o <i>a:wa:kowit</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no enumerados.</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha como combustible en forma de leña.</p>
		<p>Gelsemiaceae <i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J. St.-Hil.</p> <p>Colecta: 22281</p>	<p>Totonaco de Zongozoytla Sin nombre conocido.</p>
			







			<p>Gentianaceae <i>Gentiana ovatiloba</i> Kusn. subsp. <i>ovatiloba</i></p> <p>Colecta: 21893</p>	<p>Totonaco deZongozoytla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Gentianaceae <i>Lisianthus nigrescens</i> Schltldl. & Cham. var. <i>nigrescens</i></p> <p>Colecta: 22442</p>	<p>Totonaco deZongozoytla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Gentianaceae <i>Zeltnera</i> cf. <i>stricta</i> (Schiede) G. Mans.</p> <p>Colecta: 21849</p>	<p>Totonaco deZongozoytla Sin nombre conocido.</p>









		<p>Geraniaceae <i>Geranium seemannii</i> Peyr.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21639, 74565</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Gesneriaceae <i>Achimenes grandiflora</i> (Schltdl.) DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74207</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maqatsoqostah xanat</i> (flor hincada)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
			






		<p>Gesneriaceae <i>Columnea schiedeana</i> Schldtl. Colecta: 74099, 74100</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaxxaqa luwa'</i> (cabeza de serpiente) Cuetzalan Náhuat <i>chikoa:mpah</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, flor amarilla y con manchas marron.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
				
			<p>Gesneriaceae <i>Kohleria spicata</i> (Kunth) Oerst.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21335, 22238, 74511</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xtoq xkapa'</i> (bolsa de garrapata)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que se diferencian por el color y forma de la flor.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>









			<p>Gesneriaceae <i>Moussonia deppeana</i> (Schltdl. & Cham.) Hanst.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21393, 74447, 107387, 107449</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xtoq xkapa'</i> (bolso de garrapata)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es una planta más pequeña.</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Gesneriaceae <i>Moussonia</i> sp. novo ined.</p> <p>Colecta: 22391</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xtoq xkapa'</i> (bolso de garrapata)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>trompe:tah</i></p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>	
		<p>Gesneriaceae <i>Moussonia</i> sp. novo ined.</p> <p>Colecta: 22438</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xtoq xkapa'</i> (bolso de garrapata)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>trompeti:yah</i></p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>	







			
		<p>Gesneriaceae <i>Rhynchoglossum azureum</i> (Schldtl.) B.L. Burtt</p> <p>Colecta: 22004, 22202</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>seli:k xiwit</i></p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
			








		<p>Gesneriaceae <i>Smithiantha zebrina</i> (Regel) Kuntze</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21334, 22190, 74397</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xtoq xkapa'</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (bolso de garrapata)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Hamamelidaceae <i>Matudaea trinervia</i> Lundell var. <i>trinervia</i></p> <p>Colecta: 22374</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>Ahkokowit</i></p>









			
			<p>Heliconiaceae <i>Heliconia bourgaeana</i> Petersen</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22500, 74129</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo li:wa:pan</i> (macana de los aztecas [rojo]) Cuetzalan Náhuat <i>chamakih</i> o <i>kowtahchamakih</i> Náhuat de Zoquiapan <i>chamakih</i> Usos: Esta planta es de ornato, se aprovechan las brácteas para adorno en las fiestas locales. Nota: M. Gorostiza agregó que en S.M. Tzinacapan se usa como ornamental, para altares en ceremonias religiosas.</p>
			<p>Heliconiaceae <i>Heliconia schiedeana</i> Klotzsch</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21658, 74305</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>lhtakat seqna'</i> (plátano filoso) Cuetzalan Náhuat <i>noktaíswat</i> Usos: Las hojas se emplean para envolver tamales. Nota: M. Gorostiza confirma que en S.M. Tzinacapan la hoja se usa para envolver tamales.</p>







			<p>Heliconiaceae <i>Heliconia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22472, 74669</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasananka li:wa:pan</i></p> <p>Náhuat de zoquiapan <i>chamakih</i></p> <p>Notas: <i>Xasananka li:wa:pan</i> se interpreta como macana amarilla, proviene de las palabras <i>sananka</i> amarillo y <i>li:wa:pan</i> era un accesorio de los bailarines de la danza de los aztecas, que representaba una macana o espada antigua, el cual tiene apariencia a la inflorescencia de esta planta. Conocen dos tipos, el otro es de brácteas rojas, esta es amarilla.</p>
				
		<p>Hypericaceae <i>Hypericum hypericoides</i> (L.) Crantz subsp. <i>hypericoides</i></p> <p>Colecta: 21380, 107446</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	










		<p>Hypericaceae <i>Vismia baccifera</i> (L.) Triana & Planchon subsp. <i>baccifera</i></p> <p>Colecta: 22101, 74664</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqsin kiwi'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>ju:ki kiwi'</i></p>	
			<p>Hypoxidaceae <i>Hypoxis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21352, 74161</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tu:xama: xanat</i> (flor de cada tres días)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Hypoxidaceae <i>Hypoxis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74480</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtaqala: saqat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>








		<p>Icacinaceae <i>Calatola mollis</i> Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74251</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maqxaxát kiwi'</i> (árbol mugroso) Cuetzalan Náhuat <i>ka:la:tsapot</i></p> <p>Usos: Las semillas se utilizan para elaborar artesanías.</p>
		<p>Iridaceae <i>Crocasmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E. Br.</p> <p>Colecta: 74096</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>spada xanat</i> (flor de espada) Cuetzalan Náhuat <i>sakatsitsi:n</i></p> <p>Usos: Sin uso. Se tiene la creencia que esta planta muda y se convierte en una gladiola, específicamente en el ejemplar "74076"</p>
			

			<p>Iridaceae <i>Eleutherine latifolia</i> (Standl. & L.O.Williams) Ravenna</p> <p>Colecta: 22491</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Iridaceae <i>Gladiolus dalenii</i> Van Geel</p> <p>Colecta: 21775, 74076</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>spada xanat</i> (flora de espada)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
		<p>Iridaceae <i>Neomarica variegata</i> (M.Martens & Galeotti) Henrich & Goldblatt</p> <p>Colecta: 22476</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	




			
			<p>Iridaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22234</p> <p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Iridaceae <i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21822, 74328</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xtaqala: saqat</i> (zacate aplastado)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>

		<p>Iridaceae <i>Sisyrrinchium</i> sp.</p> <p>Colecta: 74620</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtaqala: saqat</i></p> <p>Notas: <i>Xtaqala saqat</i> significa zacate aplastado, proviene de las palabras <i>xtaqala'</i> aplastado y <i>saqat</i> zacate. Conocen varios tipos de esta planta que crece a orilla de caminos, no presenta ningún uso.</p>
		<p>Juglandaceae <i>Juglans pyriformis</i> Liebm. (sinon. de <i>Juglans olanchana</i> Standl. & L.O.Williams)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74210</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maqxaxát kiwi'</i> (árbol mugroso) Usos: Se aprovecha como combustible en forma de leña.</p>
		<p>Lacistemataceae <i>Lacistema aggregatum</i> (P.J. Bergius) Rusby</p> <p>Colecta: 22384</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>tao:lkowit</i></p>









			<p>Lamiaceae <i>Cantinoa mutabilis</i> (Rich.) Harley & J. F. B. Pastore (ex <i>Hyptis</i>)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21367, 21387, 74269, 107397, 107409</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xqalhxtajat xtaki'</i> (baba de saltamontes) Cuetzalan Náhuat <i>tsi:nich</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p> <p>Nota: Según M. Gorostiza, en S.M. Tzinacapan se usa como medicinal, para tratar el salpullido.</p>
			<p>Lamiaceae <i>Clerodendrum bungei</i> Steud.</p> <p>Colecta: 74626</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
			<p>Lamiaceae <i>Cornutia pyramidata</i> L.</p> <p>Colecta: 74658</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:xkut kiwi'</i></p> <p>Notas: Un asesor comentó que <i>A:xkut kiwi'</i> se interpreta como árbol tabaco, proviene de las palabras, <i>a:xkut</i> es el nombre que recibe el tabaco y <i>kiwi'</i> es árbol. Conocen un tipo de este árbol, aunque hay otros que reciben el mismo nombre, se les llama de la misma manera por la similitud de las hojas.</p>









		<p>Lamiaceae <i>Hyptis atrorubens</i> Poit.</p> <p>Colecta: 21374</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:wat ma:qantsi:s</i></p>	
			<p>Lamiaceae <i>Hyptis capitata</i> Jacq.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22409, 74391</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paxtoqno: tawan</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (hierba tapacaminos)</p> <p>Tipos: Existe otra planta con el mismo nombre, Rubiaceae, <i>Spermacoce</i> sp., #74442</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Lamiaceae <i>Hyptis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74393</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhqehni: tawan</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (falta analizar)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>tsotsokapahxiwit</i></p> <p>Usos: Sin uso. Nota: M. Gorostiza agrega que es medicinal, para quitar mezquinos.</p>	









		<p>Lamiaceae <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.</p> <p>Colecta: 22296</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>tsohya:kxiwit</i></p>
			<p>Lamiaceae <i>Ocimum carnosum</i> Link & Otto</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74209, 107402</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xu:nama:qachulhno'</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat <i>teposihya:k</i></p> <p>Usos: Esta planta es medicinal, se aplica en forma de baño para prevenir posibles enfermedades en bebés.</p>
			<p>Lamiaceae <i>Plectranthus scutellarioides</i> (L.) R.Br.</p> <p>Colecta: 74641</p> <p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Conocen un tipo de esta planta que crece en sitios abiertos, no presenta ningún uso.</p>









		<p>Lamiaceae <i>Salvia lasiocephala</i> Hook. & Arn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74389, 107420</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lak tsu ma:chiyana'</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (que provoca rabia pequeño)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Lamiaceae <i>Salvia microphylla</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74178</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xu:nama:kamanah</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat: <i>mi:rtoh</i></p> <p>Usos: Medicinal, se toma en té para las mujeres que no pueden concebir. Además, también se mezclaba con masa de maíz, para posteriormente darle a las gallinas, esto provocaba que maduraran con mayor rapidez los huevo y tuviesen mayor producción.</p>
		<p>Lamiaceae <i>Salvia mocinoi</i> Benth. (sin. <i>Salvia rubiginosa</i> Benth.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74388</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ma:chiya:na'</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (que provoca rabia)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es una planta más pequeña</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	







			<p>Lamiaceae <i>Salvia prunelloides</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22045</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Lamiaceae <i>Salvia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21387</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xqalhxtajat xtaki'</i></p>	
		<p>Lamiaceae <i>Salvia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21451</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:wat ma:qantsi:s</i></p>	







			<p>Lamiaceae <i>Salvia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21559</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:wat ma:qantsi:s</i></p>
			<p>Lamiaceae <i>Salvia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22005</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Lamiaceae <i>Salvia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22006</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	







			<p>Lamiaceae <i>Salvia</i> sp.</p> <p>Colecta: 74052</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ma:chiyana tawan</i> (hierba que da rabia) Cuetzalan Nahuat <i>chanampilo:l</i> (checar)</p> <p>Usos: Medicinal, antiguamente se utilizaba para tratar a las personas que adquirían rabia por la mordedura de un perro infectado, se puede hervir la planta y con ello lavar en el lugar de la mordida o simplemente machacar las hojas y aplicarlo en la zona afectada.</p>
			<p>Lamiaceae <i>Scutellaria</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74227</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xu:nama:kamanah</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Medicinal, se toma en té para las mujeres que no pueden concebir. Además, también se mezclaba con masa de maíz, para posteriormente darle a las gallinas, esto provocaba que maduraran con mayor rapidez los huevo y tuviesen mayor producción.</p>
			<p>Lamiaceae <i>Stachys</i> sp.</p> <p>Colecta: 21358</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Lamiaceae <i>Stachys</i> sp.</p> <p>Colecta: 21523</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Lamiaceae <i>Stachys</i> sp.</p> <p>Colecta: 21564</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:wat ma:qantsi:s</i></p>
			<p>Lamiaceae <i>Stachys</i> sp.</p> <p>Colecta: 21857</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Lamiaceae <i>Stachys</i> sp.</p> <p>Colecta: 74069</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chastu:tati tawan</i> (hierba de cuatro lados)</p> <p>Tipos: Simplemente que hay varios tipos de esta planta.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Lamiaceae <i>Stachys</i> sp.</p> <p>Colecta: 22337</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>tanka:la:t</i></p>
			<p>Lauraceae <i>Beilschmiedia mexicana</i> (Mez) Kostermans</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74474</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>jayit kiwi'</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos más pequeños y tiene el cáliz rojo.</p> <p>Usos: Anteriormente, el tallo se utilizaba en la elaboración de casas rústicas, además de que se utiliza como leña.</p>







		<p>Lauraceae <i>Beilschmiedia</i> sp.</p> <p>Colecta: 74651</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Lauraceae <i>Cinnamomum verum</i> Presl</p> <p>Colecta: 22383</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kane:lah</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>kane:lah</i></p>
			







		<p>Lauraceae <i>Damburneya salicifolia</i> (Kunth) Trofimov & Rohwer</p> <p>Colecta: 22352</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Lauraceae <i>Litsea glaucescens</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74591</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ku:nan tawan</i></p> <p>Usos: Las hojas se aprovechan como especia para la elaboración de distintos platillos.</p>
		<p>Lauraceae <i>Ocotea macrophylla</i> Kunth</p> <p>Colecta: 21812, 22457, 74290, 21624</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>taxtine:q</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xu:laqxu'</i></p>







			
		<p>Lauraceae <i>Ocotea psychotrioides</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22003, 22052, 22313</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qesqe'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xalak tsu qesqe'</i></p>
			








			<p>Lauraceae <i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees</p> <p>Colecta: 22453</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xqoyít kiwi'</i></p>
		<p>Lauraceae <i>Ocotea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22356</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qesqe'</i></p>	
		<p>Lauraceae <i>Ocotea</i> sp.</p> <p>Colecta: 21783</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	

		<p>Lauraceae <i>Ocotea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22340</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>awakatsi:tsin</i></p>
		<p>Lauraceae <i>Ocotea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74236</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>jayit kiwi'</i></p> <p>Usos: Anteriormente, el tallo se utilizaba en la elaboración de casas rústicas, además de que se utiliza como leña.</p>
			







		<p>Lauraceae <i>Ocotea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22312</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Lauraceae <i>Ocotea</i> sp. (distinctive species cannot be matched)</p> <p>Colecta: 22389</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>awakatsi:tsin</i></p>
		<p>Lauraceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21636</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Lauraceae <i>Persea americana</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74499</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukutah (xatsiti:n)</i> (aguacate negro)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos verdes, este es de fruto negros.</p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible y es empleado para la elaboración de distintos platillos.</p>
		<p>Lauraceae <i>Persea cf. pallescens</i> (Mez) Lorea-Hern.</p> <p>Colecta: 74676</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkukutah tsi:ya'</i></p> <p>Notas: <i>Xkukutah tsi:ya'</i> se interpreta como aguacate de ratón, proviene de las palabras <i>kukutah</i> aguacate y <i>tsi:ya'</i> ratón. Conocen un tipo de este árbol de frutos verdes diminutos, crece en el monte y cafetales, su nombre se debe a que los ratones de campo consumen sus frutos. Se emplea como leña y, algunas</p>
			







			<p>personas lo consumen al madurar ya que tiene un sabor similar al aguacate comercial.</p>
		<p>Lauraceae <i>Persea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74232</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>klhpuh chichi'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: El fruto es comestible.</p>
		<p>Lauraceae <i>Persea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74500</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhpuh (xatsiti:n)</i> (pahua negro)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, se diferencian por las características particulares de los frutos.</p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible.</p>







		<p>Lauraceae <i>Persea</i> sp.</p> <p>Colecta: 74607</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kukutah (xtakch)</i></p> <p>Notas: <i>Kukutah (xtakch)</i> se interpreta como aguacate verde, proviene de las palabras <i>kukutah</i> aguacate y <i>xtakne'</i> verde. Conocen dos tipos de este árbol, el otro es de frutos negros, este es verde. Crece principalmente en cafetales. El fruto maduro es comestible.</p>
		<p>Lentibulariaceae <i>Pinguicula emarginata</i> Zamudio & Rzed.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22388</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>talhu:ya xanat</i> (flor de roncha)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>nochipa yo:ltok</i></p>
			<p>Lentibulariaceae <i>Pinguicula moranensis</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74342</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>talhu:ya xanat</i> (flor de roncha)</p> <p>Tipos: Hay 3 tipos, los otros dos son de flores rosa y blanco, este es morado.</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>









			
		<p>Lentibulariaceae <i>Pinguicula</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21879</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>talhu:ya xanat</i> (flor de roncha)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
			

		<p>Linderniaceae <i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74168</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pik^wa: tawan</i> (hierba de espanto) Cuetzalan Náhuat: M. Gorostiza comenta que en algunos lugares lo conocen como <i>ma:ltantsi:n</i> Usos: Esta planta es medicinal, se hierve la planta y se aplica en forma de baño o se prepara con alcohol y se unta para remedio del espanto, provocado por algún evento traumático.</p>
		<p>Linderniaceae <i>Lindernia diffusa</i> (L.) Wettst.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21384, 74330</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmu:xuwa sakah</i> (arruga de tuza) Nota: Se nombra con el mismo término que la <i>Stellaria</i> sp. Usos: Sin uso.</p>
			

		<p>Loasaceae <i>Ecnide</i> sp.</p> <p>Colecta: 22107</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sman</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>sman</i></p>	
		<p>Loasaceae <i>Mentzelia hispida</i> Willd.</p> <p>Colecta: 22264</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sman</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>sman</i></p>	
			<p>Loasaceae <i>Mentzelia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22326</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sman</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>sman</i></p>

			
		<p>Loganiaceae <i>Spigelia humboldtiana</i> Cham. & Schltl.</p> <p>Colecta: 22209</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Loranthaceae <i>Psittacanthus schiedeanus</i> (Schltl. & Cham.) G. Don</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21382, 74200</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>muwe:s xanat</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat <i>tepalkat</i> Tipos: Se reconoce solamente un tipo. Usos: Se aprovecha como ornamento para ceremonias sociales.</p>








		<p>Loranthaceae <i>Struthanthus crassipes</i> (Oliv.) Eichler</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74489</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:watawanqa'</i> Cuetzalan Náhuat <i>tepalkat</i></p> <p>Tipos: Según los asesores hay solamente un tipo.</p> <p>Usos: Medicinal, las hojas se utilizan para el tratamiento contra la gastritis y esofagitis, se prepara en forma de té (5 hojas/1 litro de agua).</p>
		<p>Loranthaceae <i>Struthanthus deppeanus</i> (Schltdl. & Cham.) G. Don</p> <p>Colecta: 74643</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:watawanqa'</i></p> <p>Notas: <i>Li:watawanqa'</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de esta planta parásita de árboles, no presenta ningún uso.</p>
		<p>Lythraceae <i>Cuphea calaminthifolia</i> Schltdl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21711, 74572</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqaspalah xanat</i> (flor orejuda)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Lythraceae <i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Lythraceae <i>Cuphea cyanea</i> Moc. & Sessé ex DC.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqaspapalah xanat</i></p>
			<p>Lythraceae <i>Cuphea hookeriana</i> Walp.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







Colecta: 21359, 21832, 21854







Colecta: 21557







Colecta: 21521







		<p>Lythraceae <i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74275</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makastaka:t</i> (postrado) Cuetzalan Náhuat <i>a:te:nochpa:wa:s</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como ornamento vivo para jardines.</p>	
			<p>Lythraceae <i>Heimia salicifolia</i> (Kunth) Link</p> <p>Colecta: 74625</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Malpigiaceae <i>Bunchosia biocellata</i> Schtdl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21848, 74149</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tahch</i></p> <p>Usos: El fruto de este árbol es comestible. Se ingiere directamente al madurar. Además, se aprovecha como leña.</p>	






			
		<p>Malpigiaceae <i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22076, 74154</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka tahch</i> (sin análisis [falta analizar]) Cuetzalan Náhuat M. Gorostiza: Desconoce nombre, pero en otros lugares lo conocen por <i>na:ntsi:nkowitz</i>.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>lamtsi:n</i></p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible, además se aprovecha como leña.</p>
			









		<p>Malpigiaceae <i>Heteropterys brachiata</i> (L.) DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22050, 74230</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>latu:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Malpigiaceae <i>Malpighia glabra</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74323</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lashán kiwi'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Malpigiaceae <i>Mascagnia vacciniifolia</i> Nied.</p> <p>Colecta: 21819, 22458, 74019</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>miya:k xanat</i> (bejuco florescente)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







			
		<p>Malpighiaceae <i>Tetrapteryx schiedeana</i> Schltldl. & Cham. (sinónimo <i>T. mexicana</i> Hook. & Arn.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74551</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>latu:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Malvaceae <i>Abutilon</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74531</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasananka tánychachu'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: La corteza del tallo de esta planta se aprovecha como laso para amarres.</p>

		<p>Malvaceae <i>Anoda cristata</i> (L.) Schltl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21349, 22105, 74341</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:ma:makanu:n</i> (botón) <i>paqlhtawala'</i> (que florece postrado)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Malvaceae <i>Gossypium hirsutum</i> L.</p> <p>Colecta: 22331</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>punima:k</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>pamama:k</i></p>
			









		<p>Malvaceae <i>Hampea nutricia</i> Fryxell</p> <p>Colecta: 22099</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>tso:qo xu:nik</i></p>
		<p>Malvaceae <i>Helicteres baruensis</i> Jacq.</p> <p>Colecta: 22411</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Malvaceae <i>Helicteres guazumifolia</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22485</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>

			
		<p>Malvaceae <i>Heliocarpus appendiculatus</i> Turcz.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21694, 74507</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqmuntsiya: xu:nik</i> (falta analizar)</p> <p>San Juan Tahitic Náhuat <i>xo:no:t</i></p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>xo:no:kowit</i></p> <p>Tipos: Hay 4 tipos, se diferencian por el color de las flores.</p> <p>Usos:</p>
	<p>Malvaceae <i>Heliocarpus appendiculatus</i> Turcz.</p> <p>Usos: Antiguamente se desprendía la corteza del árbol, se ponía a secar y, por su atributo fibroso, se creaban distintos calibres de lasos. Además, cuando ocurre una urgencia por algún tipo de cortadura, se raspa la corteza y se aplica directamente en la herida para controlar la hemorragia. Cuando el árbol muere, se convierte en el mejor proveedor de hongos seta.</p>		





			<p>Malvaceae <i>Heliocarpus appendiculatus</i> Turcz.</p> <p>Colecta: 21695, 74007, 74008</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ka: nah xu: nik</i> (falta análisis) Cuetzalan Náhuat: <i>xo: no: kowit</i> Tipos: Hay 4 tipos, se diferencian por las flores.</p> <p>Uso:</p>
		<p>Malvaceae <i>Herissantia crispera</i> (L.) Briz.</p> <p>Colecta: 22124, 22329</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
				

		<p>Malvaceae <i>Hibiscus costatus</i> A. Rich.</p> <p>Colecta: 22276</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Malvaceae <i>Hibiscus syriacus</i> L. (cultivated)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74164</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasmantahwa larete xanat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornato viva para jardines.</p>
		<p>Malvaceae <i>Hibiscus uncinellus</i> DC.</p> <p>Colecta: 21503, 74004</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tánchachu'</i> (sin interpretación)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, la otra no abre completamente la flor</p> <p>Usos: Antiguamente se le extraía la corteza y se utilizaba como laso para hacer los amarres de áticos o zarzos principalmente, además se conocía que este es un material muy fuerte y</p>



			duradero.
		<p>Malvaceae <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22225, 22327, 74252</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>punima:k tánchachu'</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro abre completamente la flor.</p> <p>Usos: Antiguamente se le extraía la corteza y se utilizaba como laso para hacer los amarres de áticos o zarzos principalmente y, esta era la planta más buscada para realizar el trabajo ya que está provista de menos espinas, facilitando el trabajo.</p>
		<p>Malvaceae <i>Pavonia schiedeana</i> Steud.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21909, 74112</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kixi: tawan</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat <i>te:mpa:wa</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>









				
			<p>Malvaceae Pendiente.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21338</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Malvaceae Pendiente.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74162</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xu:nik li;palhna'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>ochpa:wa:s</i></p> <p>Tipos: En totonaco se reconoce 1 tipo. M. Gorostiza, náhuat de Tzinacapan, reconoce 2.</p> <p>Usos: Antiguamente, se utilizaba como escoba, para hacer las limpiezas del hogar.</p>










		<p>Malvaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74517</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:palhna: tawan</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: La planta se utiliza para realizar las labores de limpieza del hogar como escoba.</p>
		<p>Malvaceae <i>Phymosia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21476</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Malvaceae <i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand</p> <p>Colecta: 74023</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tampo:qo'</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat: <i>xi:lo:xo:chit</i></p> <p>Usos: Esta planta tiene uso ornamental, se utiliza para adornar parques y jardines.</p>







		<p>Malvaceae <i>Quararibea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22390</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>tepe:ala:wakkowit</i></p>
		<p>Malvaceae <i>Sida</i> sp.</p> <p>Colecta: 107368</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			








			<p>Malvaceae <i>Sidastrum paniculatum</i> (L.) Fryxell</p> <p>Colecta: 74598</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Sin uso.</p>
		<p>Malvaceae <i>Trichospermum galeottii</i> (Turcz.) Kosterm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21568, 74247</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsatsoqo xu:nik</i> (falta análisis) Cuetzalan Náhuat <i>tepe:xo:no:t</i></p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como leña.</p>	







			
		<p>Malvaceae <i>Triumfetta grandiflora</i> Vahl</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21525, 74435</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka kska:ta k^wayoh</i> (piojo de caballo grande)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es una planta más pequeña</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			







			<p>Malvaceae <i>Triumfetta</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21450, 74115, 107372</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kska:ta k^wayoh</i> (piojo de caballo) Cuetzalan Náhuat <i>tsonsasal</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Marantaceae <i>Goepertia misantlensis</i> (Lascur.) Borchs. & S. Suárez</p> <p>Colecta: 22473</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>a:yo:to:chiswat</i></p>
		<p>Maranthaceae <i>Maranta arundinacea</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74211, 74671</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>matso:q</i> <i>xmatso:q paxni'</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, la especie cultivada recibe el nombre de <i>matso:q</i> y la especie silvestre <i>xmatso:q paxni'</i>.</p>	







						
		<p>Marcgraviaceae <i>Marcgravia mexicana</i> Gilg</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22468</p>		<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>		
			<p>Marcgraviaceae <i>Souroubea exauriculata</i> Delp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22024, 74185</p>		<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankunu xanat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>	








		<p>Melastomataceae <i>Arthrostemma ciliatum</i> Pav. ex D. Don</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21494, 74213</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkutni: tawan</i> (hierba agria) Cuetzalan Náhuat <i>xo:xokoyo:lin</i></p> <p>Usos: Comestible, se aprovechan únicamente las hojas y tallos tiernos, se utilizan para proveer un sabor ácido a las salsas, así también, con el mismo fin es utilizado para los platillos hechos a base de <i>Paxni kak</i> y también se pueden comer crudas acompañadas de tortillas.</p>
		<p>Melastomataceae <i>Blakea laevigata</i> D. Don</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21860, 74264</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>suj</i> (uno de tres asesores) (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>na:ntsi:nkowitz</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>
			








		<p>Melastomataceae <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don</p> <p>Colecta: 22078</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xlaqastapu ski:ti'</i></p>	
		<p>Melastomataceae <i>Clidemia</i> cf. <i>petiolaris</i> (Schltdl. & Cham.) Schltdl. ex Triana</p> <p>Colecta: 21477, 21481</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>muju:t</i></p>	
			<p>Melastomataceae <i>Conostegia arborea</i> Schltdl. ex Steud.</p> <p>Colecta: 21914, 21915</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>









			
		<p>Melastomataceae <i>Conostegia icosandra</i> (Sw. in Wikstr.) Urban Colecta: 21631, 21826, 74024</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqswili:wat</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat: <i>to:toli:xkapolin</i> Tipos: Hay 2 tipos, la otra es de flores rosas. Usos: El fruto de esta planta es comestible, se ingiere de manera directa cuando estas están maduras.</p>
			











		<p>Melastomataceae <i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) D. Don ex DC.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>muju:t</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat <i>xa:lkapolin</i> Tipos: Hay 2 tipos, la otra es de flores blancas Usos: El fruto maduro de esta planta es comestible.</p>
		<p>Colecta: 21466, 74046, 107424</p>	
		<p>Melastomataceae <i>Heterocentron axillare</i> Naudin</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo xkutni: tawan</i> (hierba agria roja) Tipos: Hay 2 tipos, la otra es de hojas y tallo verde Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Descripción:</p>	
		<p>Colecta: 21574, 74204</p>	







		<p>Melastomataceae <i>Heterocentron elegans</i> (Schldtl.) Kuntze</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22378</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Melastomataceae <i>Heterocentron</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21446</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			








			<p>Melastomataceae <i>Miconia dodecandra</i> Cogn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22188</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>muju:t</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xalal tlanka muju:t</i></p>
				
		<p>Melastomataceae <i>Miconia glaberrima</i> (Schltdl.) Naudin</p> <p>Colecta: 21634, 22380, 74072</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatlanka saqsin kiwi'</i> (árbol agridulce) Cuetzalan Náhuat M. Gorostiza: Quizá un tipo de <i>teswat</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de flores amarillas Usos: Se aprovecha como combustible en forma de leña.</p>	








				
		<p>Melastomataceae <i>Miconia mexicana</i> (Bonpl.) Naudin</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21480, 74468, 107369</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalaj ka:kiwini muju:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Nahuat <i>teswat</i></p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible. Nota: M. Gorostiza no comentó que el fruto es comestible.</p>	
			<p>Melastomataceae <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.</p> <p>Colecta: 74006</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqsin kiwi'</i> (árbol dulce)</p> <p>Usos: Debido a que este es un árbol muy duro, resistente y sobre todo crece sin ramificaciones es aprovechado el tallo como polín y trabes en la construcción de casas rústicas. Además este árbol por su resistencia es aprovechado como combustible en forma de leño para los hogares.</p>







			<p>Melastomataceae <i>Miconia moorei</i> Wurdack</p> <p>Colecta: 74092</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laktsu muju:t</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuat Tal vez sea un tipo de <i>teswat</i></p> <p>Usos: El fruto de esta planta es comestible.</p>
			<p>Melastomataceae <i>Miconia sylvatica</i> (Schltdl.) Naudin</p> <p>Colecta: 21851, 22423, 74088</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi aqswili:wat</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (quizá un tipo de <i>teswat</i>) Totonaco de Atlequizayán <i>saqsín kiwi'</i></p>
			<p>Melastomataceae <i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex Loud</p> <p>Colecta: 22335</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka saqsín kiwi'</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (quizá un tipo de <i>teswat</i>) Náhuat de Zoquiapan <i>tenexkowit</i></p>







		<p>Melastomataceae <i>Monochaetum pulchrum</i> Decne</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah laqsih tawan</i> (falta analizar)</p>
		<p>Descripción:</p>	<p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de flores morados, este es blanco.</p>
		<p>Colecta: 74467</p>	<p>Usos: Antiguamente, se tenía la creencia, de que si los niños juegan con las flores de esta planta, provocaría irritación en los ojos, por ello se les prohibía tocar la planta.</p>
		<p>Melastomataceae <i>Tibouchina tortuosa</i> (Bonpl.) Almeda</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasmantahwa laqsih tawan</i> (hierba que daña los ojos [morado]) Cuetzalan Náhuat <i>ko:ko:ntsi:n</i></p>
		<p>Colecta: 74044</p>	<p>Tipos: Hay 2 tipos, la otra es de flores rosas. Usos: Se tiene la creencia que si los niños juegan con esta planta, les provocase irritación en los ojos.</p>







		<p>Melastomataceae <i>Triolena scorpioides</i> Naudin</p> <p>Colecta: 22215</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>a:xiwit</i></p>
		<p>Meliaceae <i>Cedrela odorata</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74490</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puksnan kiwi'</i> (árbol oloroso) Cuetzalan Náhuat <i>tio:kowit</i></p> <p>Usos: El tallo se aprovecha para la elaboración de muebles, debido a que es considerado una madera preciosa</p>
		<p>Meliaceae <i>Melia azederach</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22441</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>piochah</i></p>







		<p>Meliaceae <i>Trichilia americana</i> (Sesse & Moc.) T.D.Penn.</p> <p>Colecta: 21793</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Meliaceae <i>Trichilia havanensis</i> Jacq.</p> <p>Colecta: 74029, 74560</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>si:nax kiwi'</i> (árbol lluvioso)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>Xopilkowit</i></p> <p>Usos: Los frutos de esta árbol representan una importancia en el cultivo de maíz, ya que en el periodo de siembra, algunos mamíferos y aves recurren al saqueo de las semillas como un alimento fácil de conseguir, para ello, los frutos de este árbol se machacan y se mezclan con las semillas de maíz antes de sembrarlas, el sabor que adquieren las semillas provoca que no sea comestible para los depredadores y el porcentaje de germinación sea mayor.</p>
				







			
			<p>Meliaceae <i>Trichilia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22463</p> <p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>wahkalkowit</i></p>
		<p>Menispermaceae <i>Cissampelos pareira</i> L.</p> <p>Colecta: 21780, 22487, 22290, 74066</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stiliki miya:k</i> (bejuco redondo)</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>temekat</i></p>







			
		<p>Moraceae <i>Brosimum</i> cf. <i>alicastrum</i> Sw.</p> <p>Colecta: 22459</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kukxapu'</i></p>
		<p>Moraceae <i>Dorstenia</i> <i>contrajerva</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21912, 22182, 74429</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akaskulh tawan</i> Cuetzalan Náhuat <i>k^wa:k^wa:nakatsitsi:n</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>








			
		<p>Moraceae <i>Ficus americana</i> Aubl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22373</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqalpuh</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>aqalpuh</i></p>
		<p>Moraceae <i>Ficus aurea</i> Nutt.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22286</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqalpuh</i> (falta analizar)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>a:makwowit</i></p>







		<p>Moraceae <i>Ficus crocata</i> (Miq.) Miq.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74380</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi aqalpuh</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:makowit</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos más grandes, aproximadamente el doble de tamaño.</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>
		<p>Moraceae <i>Ficus pertusa</i> L. f.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22090, 22273, 74428</p> <p>Foto: 22273</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqstlimik</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>suja'</i></p>
		<p>Foto: 22090</p>	







		<p>Moraceae <i>Ficus pertusa</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74428</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>oqstlimink</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>a:makowit</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Moraceae <i>Ficus turrialbana</i> W.C. Burger</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22103</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqalpuh</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>aqalpuh</i></p>







		<p>Moraceae <i>Ficus velutina</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21846, 22315, 74187</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqalpuh</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>aqalpuh</i></p>
		<p>Moraceae <i>Ficus velutina</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74187</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqalpuh</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat: <i>a:makowit</i></p> <p>Tipos: Indican que solamente hay un tipo. Usos: Se aprovecha únicamente como leña</p>
			







		<p>Moraceae <i>Trophis mexicana</i> (Liebm.) Bureau</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21808, 22304</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Moraceae <i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22368</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			







			<p>Musaceae <i>Musa ornata</i> Roxb.</p> <p>Colecta: 74003</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>talhtsih seqna'</i> (plátano con semilla) Cuetzalan Náhuat: <i>itspahpa:tah</i></p> <p>Usos: Esta planta se aprovecha las hojas para envolver tamales y para tacos caseros.</p>
		<p>Myricaceae <i>Morella cerifera</i> (L.) Small</p> <p>Colecta: 21721, 21731</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
		<p>Myrtaceae <i>Eugenia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22350</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lasnán kiwi'</i></p>	







		<p>Myrtaceae <i>Eugenia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74257</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chiwix kiwi'</i> (árbol rocoso)</p> <p>Usos: El tallo se utiliza para la elaboración de cabos de herramientas como: hachas, martillos, marros, azadones, etc.</p>
		<p>Myrtaceae <i>Eugenia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22461</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>chi:chi:ltekowit</i></p>
		<p>Myrtaceae <i>Eugenia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21646</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Myrtaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22270</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kuyuh kiwi'</i></p>
		<p>Myrtaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22247</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>chi:chi:l tekowit</i></p>
			

		<p>Myrtaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22259</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>chi:chi:l tekowit</i></p>
		<p>Myrtaceae <i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74272</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ukum</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>pimie:ntah</i> o <i>mimie:ntah</i></p> <p>Usos: El fruto maduro, seco y granulado, se aprovecha como condimento en la gastronomía.</p>
		<p>Myrtaceae <i>Psidium guajava</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22291, 74277, 74331</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:siwi:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>xa:lxokot</i></p> <p>Tipos: El fruto con interior color rosa, recibe el nombre de:</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>a:siwi:t (pulaqchite:qlh)</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>xa:lxokot (tein tsina:ka)</i></p>








			<p>Usos: El fruto es comestible y las hojas se aprovechan en forma de té para controlar la diarrea (8 hojas/ 1 litro de agua).</p>
		<p>Myrtaceae <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston</p> <p>Colecta: 21689</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pu:morrosah</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>pumarrosah</i></p>
		<p>Nyctaginaceae <i>Boerhavia coccinea</i> Miller</p> <p>Colecta: 22122</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








			
		<p>Nyctaginaceae <i>Mirabilis jalapa</i> L.</p> <p>Colecta: 22224</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Nyctaginaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21569</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Nyctaginaceae <i>Pisonia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22445</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmakasiyin wa:ya'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>ksiyán wa:ya'</i></p>
		<p>Ochnaceae <i>Sauvagesia erecta</i> L. var. <i>erecta</i></p> <p>Colecta: 22181</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Onagraceae <i>Fuchsia arborescens</i> Sims</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21490, 74582</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>

			
		<p>Onagraceae <i>Lopezia racemosa</i> Cav.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21473, 74392, 107428</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ma:lakachihchih tawan</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>ahwachma:mani</i></p> <p>Usos: Anteriormente se consumía en caldo. Nota: M. Gorostiza comente que sirve de forraje para aves de corral y conejos.</p>
			









				<p>Onagraceae <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven</p> <p>Colecta: 74081</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqta:ti: xanat</i> (flor de cuatro pétalos) Cuetzalan Náhuatl <i>chia:wxiwit</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Onagraceae <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Ait.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21706, 74521</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qo:tanuya: xanat</i> (flor de atardecer) Cuetzalan Náhuatl <i>nexokoli:lpah</i></p> <p>Usos: Medicinal, se hierve la planta entera y se aplica en forma de baño, para tratar la inflamación muscular. Nota: M. Gorostiza agregó que es medicinal, las hojas se usan (solas o mezcladas con hojas de aguardiente) para desinflamar músculos.</p>	
		<p>Orchidaceae <i>Acianthera breedlovei</i> Soto Arenas, Solano & Salaza</p> <p>Colecta: 22014</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkapa: xanat</i></p>		









		<p>Orchidaceae <i>Acianthera circumplexa</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkapa: xanat</i></p>	
		<p>Colecta: 21514</p>		
			<p>Orchidaceae <i>Arpophyllum laxiflorum</i> Pfitzer</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Colecta: 21797</p>				




		<p>Orchidaceae <i>Aulosepalum pyramidale</i> (Lindl.) M.A.Dix & M.W.Dix</p> <p>Colecta: 21839</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Orchidaceae <i>Beloglottis costaricensis</i> (Rchb.f.) Schltr.</p> <p>Colecta: 21847, 22399, 22436</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Bletia neglecta</i> Sosa</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21561, 74469</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>	







		<p>Orchidaceae <i>Bletia purpurea</i> (Lam.) A. DC.</p> <p>Colecta: 22372</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xtanchiwix qo:lo'</i></p>
			
		<p>Orchidaceae <i>Brassia verrucosa</i> Bateman ex Lindl.</p> <p>Colecta: 74637</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>







			<p>Orchidaceae <i>Chysis laevis</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 22471</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>chi:lxo:chit</i></p>
			<p>Orchidaceae <i>Coelia triptera</i> (Sm.) G. Don ex Steud.</p> <p>Colecta: 21814</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Cranichis cochleata</i> Dressler</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21455, 74527, 74530</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>palo:max xanat</i> (flor paloma) (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta)</p>

				
			<p>Orchidaceae <i>Cyclopogon comosus</i> (Rchb.f.) Burns-Bal. & E.W.Greenw.</p> <p>Colecta: 22432</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Cyclopogon cranichoides</i> (Griseb.) Schltr.</p> <p>Colecta: 22419</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







			<p>Orchidaceae <i>Cyclopogon luteo-albus</i> (A. Rich. & Galeotti) Schltr.</p> <p>Colecta: 21626</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Cyclopogon violaceus</i> (A. Rich & Galeotti) Schltr.</p> <p>Colecta: 21810, 21838, 21842, 22434, 22464, 22465, 22466, 22467</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Dichaea glauca</i> (Sw.) Lindl.</p> <p>Colecta: 74642</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Conocen un tipo de esta planta que crece sobre árboles en sitios conservados, se emplea como ornamento vivo para jardines.</p>	







				
		<p>Orchidaceae <i>Dichaea intermedia</i> Ames & Correll</p> <p>Colecta: 22511</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:maqa:x tawan</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>tepe:toroh</i></p>	
			<p>Orchidaceae <i>Dichaea muricatoides</i> Hamer & Garay</p> <p>Colecta: 22082</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:maqa:x tawan</i></p>







		<p>Orchidaceae <i>Dinema polybulbon</i> (Sw.) Lindl.</p> <p>Colecta: 21556</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Elleanthus cynarocephalus</i> (Rchb.f.) Rchb.f.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22013, 74183</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaqawasa qalhwantalaqajuy</i> (que llora mirando hacia abajo [niño])</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>tatemala: n cho:kani</i></p> <p>Tipos: Hay un solo tipo de esta.</p> <p>Usos: Véase nota arriba sobre la leyenda.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Encyclia candollei</i> (Lindl.) Schltr.</p> <p>Colecta: 21821, 21863, 74085</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xqoni:wa xanat</i> (flor parda)</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornato vivo en jardines y para adornar salones en eventos sociales.</p>







			
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum cardiochilum</i> L.O.Williams</p> <p>Colecta: 22173, 74663</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum chlorocorymbos</i> Schltr.</p> <p>Colecta: 22094, 22128</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








				
			<p>Orchidaceae <i>Epidendrum ciliare</i> L.</p> <p>Colecta: 22235</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Epidendrum cristatum</i> Ruiz & Pav.</p> <p>Colecta: 21906</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum diffusum</i> Sw.</p> <p>Colecta: 22083, 22089, 74674</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum eustirum</i> Ames, F.T. Hubb. & C. Schweinf.</p> <p>Colecta: 21333</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			









		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum isomerum</i> Schltr.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Colecta: 22170</p>	
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum longipetalum</i> A. Rich. & Galeotti</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Colecta: 21868</p>			








		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum melistangum</i> Hágsater</p> <p>Colecta: 74665</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum polyanthum</i> Lindl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74194</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>juni: xanat</i> (flor colibrí)</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum propinquum</i> A.Rich. & Galeotti</p> <p>Colecta: 21649, 22265</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>






			
		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum ramosum</i> Jacq.</p> <p>Colecta: 22171</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			








		<p>Orchidaceae <i>Epidendrum veroscriptum</i> Hágstater Descripción:</p> <p>Colecta: 22152, 22359, 74483</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornamento vivo para jardines</p>	
				
			<p>Orchidaceae <i>Gongora galeata</i> (Lindl.) Rchb.f.</p> <p>Colecta: 74657, 74675</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>








				
		<p>Orchidaceae <i>Govenia mutica</i> Rchb. f.</p> <p>Colecta: 21337</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Orchidaceae <i>Habenaria odontopetala</i> Rchb. f.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22279, 22282, 74446</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>




			<p>Orchidaceae <i>Habenaria tuerckheimii</i> Schltr.</p> <p>Colecta: 22081</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Isochilus</i> cf. <i>major</i> Schlecht. & Cham.</p> <p>Colecta: 21899, 74660</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Laelia anceps</i> Lindl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74381</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi qalhwantalaqajuy</i> (que llora mirando hacia abajo pequeño)</p> <p>Tipos: Hay un solo tipo. Usos: Se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>	

		<p>Orchidaceae <i>Leochilus carinatus</i> (Knowles & Westc.) Lindl.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
		<p>Colecta: 74647</p>	<p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>	
			<p>Orchidaceae <i>Leochilus oncidoides</i> Knowles & Westc.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Colecta: 21555, 22267, 22278</p>				

			
		<p>Orchidaceae <i>Lycaste aromatica</i> (Graham) Lindl.</p> <p>Colecta: 22018</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah xka:ki xanat</i></p>
		<p>Orchidaceae <i>Lycaste consobrina</i> Rchb. f.</p> <p>Colecta: 74059</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xka:ki xanat</i> (flor de elotamal)</p> <p>Usos: Esta planta se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>

		<p>Orchidaceae <i>Lycaste deppei</i> (Lodd. ex Lindl.) Lindl.</p> <p>Colecta: 22017, 22507</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah xka:ki xanat</i></p>	
			<p>Orchidaceae <i>Malaxis histioantha</i> (Link) Garay & Dunst.</p> <p>Colecta: 74655</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Maxillaria cucullata</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 21516, 21560</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	

			<p>Orchidaceae <i>Maxillaria densa</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 21619</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Maxillaria tenuifolia</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 22398</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
				



Orchidaceae

Maxillaria variabilis Bateman
ex Lindl.







Colecta: 21620, 21845, 22274,
74616









Totonaco de Zongozotla







xasananka maqapa: noqx xanat







Notas: *Xasananka maqapa: noqx xanat* se interpreta como flor de manos cruzadas amarilla, proviene de las palabras *sananka'* amarillo, *maqapa: noqx* de manos cruzados y *xanat* flor. Conocen varios tipos de esta planta que crece sobre árboles y rocas en zonas conservadas, se aprovecha como ornamento vivo para jardines.








			<p>Orchidaceae <i>Nidema boothii</i> (Lindl.) Schltr.</p> <p>Colecta: 21692</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Notylia barkeri</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 21816, 21865, 22397, 74615</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Oncidium incurvum</i> Barker ex Lindl.</p> <p>Colecta: 74652</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>	







			
		<p>Orchidaceae <i>Oncidium sphacelatum</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 21936, 22460, 74631</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>mayoh xanat</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>mayoh xanat</i></p>
			








		<p>Orchidaceae <i>Ornithocephalus inflexus</i> Lindl.</p> <p>Colecta: 74646</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>		
				<p>Orchidaceae <i>Pelexia funckiana</i> (A.Rich. & Galeotti) Schltr.</p> <p>Colecta: 22400</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Platystele stenostachya</i> (Rchb. f.) Garay</p> <p>Colecta: 22166, 22242</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>		







			
		<p>Orchidaceae <i>Platythelys</i> cf. <i>maculata</i> (Hook.) Garay</p> <p>Colecta: 22067, 22097</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Pleurothallis cardiothallis</i> Rchb. f.</p> <p>Colecta: 21841, 22243, 22245, 22246</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>









			
		<p>Orchidaceae <i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.</p> <p>Colecta: 22256, 22416</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>papatliloh</i></p>
			









		<p>Orchidaceae <i>Prosthechea cochleata</i> (L.) W.E.Higgins</p> <p>Colecta: 21622, 22479, 74073</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tantu: kitsis xanat</i> (flor de cinco patas)</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>	
		<p>Orchidaceae <i>Prosthechea cretacea</i> (Dressler & G.E.Pollard) W.E.Higgins</p> <p>Colecta: 74644</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>	
			<p>Orchidaceae <i>Prosthechea michuacana</i> (Lex.) W.E.Higgins</p> <p>Colecta: 21862, 74630</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>










			
		<p>Orchidaceae <i>Prosthechea ochracea</i> (Lindl.) W.E.Higgins</p> <p>Colecta: 21621</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Prosthechea pseudopygmaea</i> (Finet) W.E.Higgins</p> <p>Colecta: 21388</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>



		<p>Orchidaceae <i>Prosthechea pygmaea</i> (Hook.) W. E. Higgins</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22184, 22253, 74344</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stuku: xanat</i> (flor estrella)</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>kwowra:banoh</i></p>	
		<p>Orchidaceae <i>Prosthechea radiata</i> (Lindl.) W.E. Higgins</p> <p>Colecta: 74645</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>	
			<p>Orchidaceae <i>Prosthechea rhyngophora</i> (A. Rich. & Galeotti) W.E. Higgins</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74190</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>stuku: xanat</i> (flor estrella)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, se diferencian por el color y tamaño de la flor</p> <p>Usos: Sin uso.</p>








			<p>Orchidaceae <i>Prosthechea varicosa</i> (Bateman ex Lindl.) W.E. Higgins</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aktsu tsama:t xanat</i></p>
			<p>Orchidaceae <i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay & Dunst.</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Colecta: 22307</p>	






			<p>Orchidaceae <i>Sarcoglottis richardiana</i> (Schltr.) Salazar & Soto Arenas</p> <p>Colecta: 22401</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Sarcoglottis sceptrodes</i> (Rchb.f.) Schltr.</p> <p>Colecta: 22404</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Scaphyglottis fasciculata</i> Hook.</p> <p>Colecta: 21650, 22308, 22310</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	








				<p>Orchidaceae <i>Schiedeella transversalis</i> (A.Rich. & Galeotti) Schltr.</p> <p>Colecta: 21892</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Sobralia macrantha</i> Lindl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21993 21994,, 74182, 74184</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhwantalaqajuy</i> (<i>xatsama:t</i>) (que llora mirando hacia abajo [niña]) Cuetzalan Náhuat: Parece una <i>tatempa:n cho:kani</i>, pero no lo había visto en este color. Usos: Véase nota arriba sobre la leyenda.</p>		
					

			<p>Orchidaceae <i>Stanhopea dodsoniana</i> Salazar & Soto Arenas</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22056, 74376</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsinkulo pa:tax</i> (patito agachado) Cuetzalan Náhuat <i>tekontsi:n</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Stanhopea dodsoniana</i> Salazar & Soto Arenas</p> <p>Colecta: 74662</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsinkulo pa:tax</i></p> <p>Notas: <i>Tsinkulo pa:tax</i> se interpreta como patito agachado, proviene de las palabras <i>tsinkilahwa'</i> agachado, encogido y <i>pa:tax</i> surge del intento de pronunciar pato. Conocen un tipo de esta planta que crece sobre árboles en sitios conservados, se aprovecha como ornato vivo para jardines.</p>
			<p>Orchidaceae <i>Stanhopea tigrina</i> Bateman</p> <p>Colecta: 74661</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsinkulo pa:tax</i> <i>talaqán</i></p> <p>Notas: <i>Tsinkulo pa:tax</i> se interpreta como patito agachado, proviene de las palabras <i>tsinkilahwa'</i> agachado, encogido y <i>pa:tax</i> surge del intento de pronunciar pato. También, gran parte de la gente lo llama <i>Talaqán</i>, que significa máscara, el nombre lo recibe debido a que la flor presenta una apariencia similar a esta.</p>








		<p>Orchidaceae <i>Stelis pachyglossa</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase</p> <p>Colecta: 22244</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Stelis platystylis</i> (Schltr.) Solano & Soto Arenas</p> <p>Colecta: 21515</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Stelis veracruzensis</i> Solano</p> <p>Colecta: 22065</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>

			<p>Orchidaceae <i>Stenorrhynchos glicensteinii</i> Christenson</p> <p>Colecta: 22402</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Orchidaceae <i>Trichosalpinx ciliaris</i> (Lindl.) Luer</p> <p>Colecta: 22303</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
				








			<p>Orobanchaceae <i>Agalinis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74308</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lasa:t tawan</i> (hierba delgada)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Orobanchaceae <i>Castilleja arvensis</i> Schtdl. & Cham.</p> <p>Colecta: 21727</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
		<p>Orobanchaceae <i>Lamourouxia multifida</i> Kunth</p> <p>Colecta: 21558</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	







		<p>Oxalidaceae <i>Oxalis corniculata</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21369, 21855, 74216</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi sqoqot</i> (hierba salada pequeña) Cuetzalan Náhuat <i>xo:xokoyo:lin</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de flores morados</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>	
		<p>Oxalidaceae <i>Oxalis latifolia</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22111</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqoqot</i></p>	
			<p>Oxalidaceae <i>Oxalis</i> sp.</p> <p>Colecta: 22177</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqoqot</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>sqoqat</i></p>

			<p>Oxalidaceae <i>Oxalis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21371, 74198</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka sqoqot</i> (planta salada grande) Cuetzalan Náhuat <i>xo:xokoyo:lin</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de flores amarillas Usos: Esta es una planta comestible, las hojas se consumen crudas acompañadas de tortillas, de la misma manera se consumen las raíces de esta planta.</p>
			<p>Oxalidaceae <i>Oxalis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74350</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sqoqot</i> (hierba salada)</p> <p>Tipos: Hay 3 tipos, los otros dos son de flores morado y amarillo, este es rosa Usos: Sin aprovechamiento.</p>
			<p>Papaveraceae <i>Bocconia frutescens</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21488, 74193</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qalhku:chichile:qx</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>ma:nehnextikxiwit</i></p> <p>Usos: Esta planta es medicinal, las raíces se preparan en té y lo beben las personas que padecen diabetes, para controlar los niveles de glucosa. Nota: M. Gorostiza agrega que en Tzinacapan se usa para tratar la bronquitis.</p>







			<p>Passifloraceae <i>Passiflora alata</i> Curtis</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22054, 74367</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pu:xalo:qwat</i> (granada)</p> <p>Usos: Su fruto es comestible.</p>
		<p>Passifloraceae <i>Passiflora edulis</i> Sims f.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74368</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pu:xalo:qwat/marrakuyah</i> (granada) Cuetzalan Náhuat <i>maracuyá</i></p> <p>Usos: El fruto es comestible.</p>	
				








			<p>Passifloraceae <i>Passiflora guatemalensis</i> S. Watson</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21774, 74463</p> <p>J. MacDougal 2017-03-15 "I went back and dolesly examined your photos again. I did find one dried stipule in the photo of 74463, so it IS <i>P. guatemalensis</i>"</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xalo:qwat xkut</i> (granada de tejón)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos pero no se especificaron.</p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible.</p>
			<p>Passifloraceae <i>Passiflora helleri</i> Peyr.</p> <p>Colecta: 21693, 22339, 74005</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xalo:qwat stayi'</i> (<i>tantu: pa:tax</i>) (Granada de ardilla [patas de pato])</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>tsina:kamekat</i></p> <p>Tipos: Hay 4 tipos, se diferencian por la forma de la hoja</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Passifloraceae <i>Passiflora rugosissima</i> Killip</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21526, 21655, 74584</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpu:xalo:qwat stayi'</i> (<i>Laka mi:tsi'</i>) (granada de ardilla [cara de gato])</p> <p>Tipos: Hay varios tipos pero no se especifican.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
				
			<p>Passifloraceae <i>Passiflora sexflora</i> Juss.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74335</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tantu: pa:tax</i> (patas de pato)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>








		<p>Pendiente Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22288</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>
		<p>Pendiente Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22293</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>
		<p>Pendiente Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22294</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>








		<p>Phrymaceae <i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom</p> <p>Colecta: 22269</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Phrymaceae <i>Leucocarpus perfoliatus</i> (Kunth) Benth.</p> <p>Colecta: 21487</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Phyllanthaceae <i>Phyllanthus nuriri</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74138, 74139</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lile:q tawan</i> (hierba con palabra sin análisis)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>








		<p>Phytolaccaceae <i>Phytolacca americana</i> L.</p> <p>Colecta: 21495, 74075</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah watlaklh</i> (sin interpretación)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>almo:lkilit</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de hojas color rojo.</p> <p>Usos: Esta es una planta comestible, de la cual se aprovechan únicamente las hojas, primero se hierve agua mezclada con sal caliza y después se echan las hojas al agua hirviendo, posteriormente se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto.</p> <p>De las dos existentes, esta es la que más se prefiere, porque tiene hojas más grandes y frondosas.</p>
			
		<p>Papaveraceae <i>Phytolacca rivinoides</i> Kunth & C.D. Bouché</p> <p>Colecta: 74015</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatoqo watlaklh</i> (sin interpretación)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>almo:lkilit</i></p> <p>Usos: Comestible, de cual se aprovechan únicamente las hojas, primero se hierve agua mezclada con sal caliza y después se echan las hojas al agua hirviendo, posteriormente se preparan guisadas con manteca, chile picado, cebolla en aros y sal al gusto.</p>








		<p>Phytolaccaceae <i>Rivina humilis</i> L. .</p> <p>Colecta: 21461, 21908, 74013</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqpin tawan</i> (hierba enchilada)</p> <p>Usos: Esta planta es medicinal, se utiliza en forma de baño para combatir la fiebre y la inflamación.</p>	
		<p>Phytolaccaceae <i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walter</p> <p>Colecta: 22012, 22428, 74624</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>	
			<p>Phytolaccaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22427</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>

			
		<p>Picramniaceae <i>Picramnia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74339</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtila: kiwi'</i> (uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (falta analizar)</p> <p>Usos:</p>
		<p>Picramniaceae <i>Picramnia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74378</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kulu: kiwi'</i> (solamente uno de tres asesores tuvo nombre para este árbol) (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>







		<p>Picramniaceae <i>Picramnia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74379</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kulu: kiwi'</i> (solamente uno de tres asesores tuvo nombre para este árbol) (falta analizar)</p> <p>Nota: Las personas tienen como conocimiento que este ejemplar y el número 74378 es la misma planta.</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>	
		<p>Pinaceae <i>Pinus chiapensis</i> (Martínez Andresen)</p> <p>Colecta: 74601</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxwat</i></p> <p>Notas: <i>Akxwat</i> no tiene interpretación. Conocen un solo tipo de este árbol, sin embargo, son muchas especies las que se consideran con el mismo nombre, pensando que se trata del mismo individuo. Crece en sitios conservados y cafetales. El tallo se emplea principalmente para la elaboración de muebles.</p>	
			<p>Pinaceae <i>Pinus douglasiana</i> Martínez</p> <p>Colecta: 22375</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkija:t</i></p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>chichi:k okot</i></p> <p>Náhuatl de Cuetzalan <i>okot</i></p>







		<p>Pinaceae <i>Pinus oocarpa</i> Schiede ex Schltld.</p> <p>Colecta: 22025, 22026</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkija:k</i></p>	
			<p>Pinaceae <i>Pinus patula</i> Schiede ex Schltld. & Cham.</p> <p>Colecta: 74602</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkija:k</i></p> <p>Notas: <i>Xkija:k</i> no tiene interpretación. Conocen un solo tipo de este árbol, sin embargo, son muchas especies las que se consideran con el mismo nombre, pensando que se trata del mismo individuo. Es aprovechado para extracción de material para construcción y resina, las hojas se utilizan como ornato para eventos sociales.</p>
		<p>Pinaceae <i>Pinus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74196</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxwat</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>okot o okokowit</i></p> <p>Tipos: Se desconoce cuántos tipos hay.</p> <p>Usos: Este árbol es aprovechado para extracción de madera y posteriormente para la elaboración de muebles.</p>	








			<p>Piperaceae <i>Peperomia barbinodis</i> Trel.</p> <p>Colecta: 21499, 21578, 21579</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia berlandieri</i> Miq.</p> <p>Colecta: 22387</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>pachti</i></p>	
		<p>Piperaceae <i>Peperomia botterii</i> C. DC.</p> <p>Colecta: 22341</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>selikxiwit</i></p>	







		<p>Piperaceae <i>Peperomia bracteata</i> A.W. Hill (sinónimo <i>P. gracillima</i> S. Watson)</p> <p>Colecta: 22048</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Piperaceae <i>Peperomia consoquitlana</i> C. DC.</p> <p>Colecta: 21478</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia epidendron</i> C. DC.</p> <p>Colecta: 21510</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	





			<p>Piperaceae <i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A.Dietr.</p> <p>Colecta: 21549, 21566, 22336</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia granulosa</i> Trel.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21524, 74395</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:kawi:n</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Esta planta representa una importancia cultural, se cuenta que esta planta es utilizada para brujerías, debido a su amargo sabor, mandan maldiciones hacia la persona de interés.</p>	
		<p>Piperaceae <i>Peperomia maculosa</i> (L.) Hook.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21500, 21651, 74113</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka kuksasan</i> (quelite de zorrillo grande) Cuetzalan Náhuat <i>te:kwa:nenepi:l</i></p> <p>Usos: Esta planta es comestible, se aprovechan únicamente las hojas, esta planta constituye uno de los ingredientes principales de la comida tradicional del municipio de Zongozotla, se prepara con frijoles enchilados y tallos de <i>xkutni'</i> (<i>Begonia</i> spp.).</p>	



		<p>Piperaceae <i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A.Dietr.</p> <p>Colecta: 21498</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:kawi:n</i></p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia peltolimba</i> C.DC. ex Trel.</p> <p>Colecta: 21799, 74648</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi kuksasan</i></p> <p>Usos: Esta planta es comestible, se aprovechan únicamente las hojas, esta planta constituye uno de los ingredientes principales de la comida tradicional del municipio de Zongozotla, se prepara con frijoles enchilados y tallos de distintas especies de <i>Xkutni'</i> (<i>Begonia</i> spp.).</p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia pseudoalpinia</i> Trel.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74355</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xatsatsoqo li:kawi:n</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, se distinguen por el color de los tallo y hojas, este es de tallo rojizo y hojas verdes</p> <p>Usos: Sin uso.</p>








		<p>Piperaceae <i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth</p> <p>Colecta: 22362</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia mexicana</i> (Miq.) Miq.</p> <p>Colecta: 21776</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Piperaceae <i>Peperomia</i> sp. (sp. novo?)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74286</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkuksasan lawa:n</i> (quelite de zorrillo de extranjero)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Piperaceae <i>Peperomia tetraphylla</i> Hook & Arn.</p> <p>Colecta: 21519</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Piperaceae <i>Peperomia urocarpoides</i> C. DC.</p> <p>Colecta: 22252</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Piperaceae <i>Piper aequale</i> Vahl</p> <p>Colecta: 22502</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p>	







		<p>Piperaceae <i>Piper amalago</i> L.</p> <p>Colecta: 22420</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>tso:qo:t kiwi'</i></p>
		<p>Piperaceae <i>Piper auritum</i> Kunth</p> <p>Colecta: 22497, 74018</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ji:ni'</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat: <i>omikilit</i> Usos: Planta comestible y medicinal, para consumir se aprovechan las hojas para preparar tamales y salsas. Como planta medicinal sirve para la fiebre y para prevenir enfermedades en niños y recién nacidos (hombres), preparando las hojas para baño.</p>
		<p>Piperaceae <i>Piper dilatatum</i> L. C. Rich</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74119</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i> (árbol pinto) Cuetzalan Náhuat <i>xa:lkowit</i></p> <p>Usos: Esta planta es aprovechada como combustible en forma de leña.</p>







		<p>Piperaceae <i>Piper lapathifolium</i> (Kunth) Steud.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21782, 74296</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i> (árbol pinto) Cuetzalan Náhuat <i>tsotsolpahxiwit</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se especifican. Usos: Sin uso. Nota: Según M. Gorostiza en S.M. Tzinacapan, es medicinal. La hoja se usa para tapar granos/ erupciones en la piel, con esto se pueden eliminar del cuerpo.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>		<p>Piperaceae <i>Piper pseudofulgineum</i> C. DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 107366</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
		<p>Piperaceae <i>Piper schiedeanaum</i> Steud.</p> <p>Colecta: 21497, 74336</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qantsapu: kiwi'</i> (árbol gusano)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>

		<p>Piperaceae <i>Piper schlehtendahliaum</i> C.DC.</p> <p>Colecta: 22123, 22431, 22505</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>talak tsuwi tso:qo:t tawan</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>tabaki:yoh</i></p>
			
		<p>Piperaceae <i>Piper sp.</i></p> <p>Colecta: 22488</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>chiwix tso:qo:t</i></p>








			<p>Piperaceae <i>Piper</i> sp.</p> <p>Colecta: 22489</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>chiwix tso:qo:t</i></p>
			<p>Piperaceae <i>Piper</i> sp.</p> <p>Colecta: 21773</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Piperaceae <i>Piper</i> sp.</p> <p>Colecta: 21789</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Piperaceae <i>Piper</i> sp.</p> <p>Colecta: 21998</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p>
		<p>Piperaceae <i>Piper</i> sp.</p> <p>Colecta: 22036</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i></p>
		<p>Piperaceae <i>Piper</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74297</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tso:qo:t kiwi'</i> (árbol pinto) Cuetzalan Náhuat <i>xa:lkowit</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se especifican.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>








		<p>Piperaceae <i>Piper umbellatum</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74159</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qantsapu: tawan</i> (hierba de gusano) Cuetzalan Náhuat <i>piltsompech</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Plantaginaceae <i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.</p> <p>Colecta: 74634</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
			









		<p>Plantaginaceae <i>Lophospermum erubescens</i> D. Don</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21931, 74254</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kampa:nah xanat</i> (flor campana)</p> <p>Usos: Antiguamente se desprendía la corteza del árbol y por su atributo fibroso se creaban distintos calibres de lasos, principalmente para amarrar cercas.</p>
		<p>Plantaginaceae <i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small</p> <p>Colecta: 74632</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta</p>
			






		<p>Plantaginaceae <i>Plantago alismatifolia</i> Pilg.</p> <p>Colecta: 74603</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pasma: tawan</i></p> <p>Notas: <i>Pasma: tawan</i> significa hierba olote, proviene de las palabras <i>pasma'</i> olote y <i>tawa:n</i> hoja o hierba. Conocen un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos, no presenta ningún aprovechamiento.</p>	
			<p>Plantaginaceae <i>Plantago australis</i> Lam.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74206, 107375</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pasma: tawan</i> (hierba olote)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Plantaginaceae <i>Russelia maculosa</i> Lundell</p> <p>Colecta: 22217</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	


		<p>Plantaginaceae <i>Russelia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22163, 22316, 74512</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>	
		<p>Plantaginaceae <i>Scoparia dulcis</i> L.</p> <p>Colecta: 22165</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Plantaginaceae <i>Stemodia peduncularis</i> Benth.</p> <p>Colecta: 22254, 22268, 22357</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>









		<p>Plantaginaceae <i>Stemodia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22117</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Plantaginaceae <i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Hassl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22119, 74345</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmu: xuwa sa kah</i> (solamente uno de tres asesores dio este nombre) (arruga de tuza)</p> <p>Usos: Sin uso</p>
			






			<p>Plantaginaceae <i>Uroskinnera hirtiflora</i> Hemsl. var. <i>hirtiflora</i></p> <p>Colecta: 22183, 22332</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:xkut kiwi'</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>a:xkut kiwi'</i></p> <p>Náhuat de Cuetzalan <i>k^wakowiteko:ni</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>tabaki:yoh</i></p>
		<p>Plantaginaceae <i>Veronica peregrina</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74552</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
		<p>Plantaginaceae <i>Veronica persica</i> Poir.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74537</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	

		<p>Plantanaceae <i>Plantanus mexicana</i> Moric.</p> <p>Colecta: 21820, 74020</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ka:nax kiwi'</i> (sin interpretación árbol) Cuetzalan Náhuatl: <i>pa:pa:lo:kilit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como leña.</p>	
			<p>Poaceae <i>Cenchrus</i> cf. <i>polystachios</i> (L.) Morrone (o <i>C. purpureus</i>)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74493</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paran saqat</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuatl <i>merkeró:n</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como forraje para mulas y caballos.</p>
			<p>Poaceae <i>Cryptochloa strictiflora</i> (E. Fourn.) Swallen</p> <p>Colecta: 22385</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqat</i></p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>sakat</i></p>










		<p>Poaceae <i>Lasiacis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74235, 107388</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>matlu:k</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Anteriormente con el tallo se elaboraba un juguete, que consistían en crear un proyectil en donde se cargaba con cascara de naranja y se le empujaba con una barita, para provocar presión y ésta provoca que la cascara se proyectara, formando un tipo de pistola. Además, se utilizaba en la elaboración de cometas.</p>	
			<p>Poaceae <i>Paspalum paniculatum</i> L.</p> <p>Colecta: 21376</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqat</i></p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Poaceae <i>Paspalum</i> sp.</p> <p>Colecta: 107382</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqat</i></p>









			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22197</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqat</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>saqat</i></p>
			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74234</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lispi:la'</i></p> <p>Usos: Anteriormente se utilizaba como una flauta para atraer víboras y serpientes, para elaborar la flauta, se requiere el escapo de la inflorescencia y posteriormente se le hace una rajadura transversal con el mismo fruto de la planta y listo. Al soplar produce un sonido muy agudo y al presionar en distintos puntos, genera distintos tonos.</p>
			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74266</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>sa:ka:t</i> (falta análisis)</p> <p>Usos: Anteriormente, el tallo se cortaba en trozos pequeños y se empleaba en la formación académica, como sustituto de ábaco.</p>



			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74338</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laqacha:n</i> (uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74353</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqxma: saqat</i> (solamente un asesor de tres dio este nombre) Cuetzalan Náhuat <i>patachsakat</i></p> <p>Usos: Se emplea como forraje para ganado.</p>	
			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74364</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chixi: saqat</i> (zacate peludo) Cuetzalan Náhuat <i>sakat</i></p> <p>Usos: Forraje para equinos y ganado.</p>







		<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74372</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kux kiwi'</i> (árbol de pavo de monte)</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha en la construcción de cabañas y casas rústicas como estructura del techado.</p>	
			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74401</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqa tlanka saqat</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74450</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lhqonqa saqat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha como forraje para ganado.</p>







			<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 74672</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qa:ti:t</i></p> <p>Notas: <i>Qa:ti:t</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de esta planta que crece a orilla de ríos, el tallo se emplea en la construcción de casas rústicas y cabañas.</p>	
		<p>Poaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22035</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>matlu:k</i></p>		
				<p>Poaceae <i>Saccharum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22272, 74538</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chankat</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>owat</i></p> <p>Tipos: Hay 4 tipos, los otros son de tallo blanco, dos marrón y este es amarillo.</p> <p>Usos: El tallo es comestible, también se emplea para la fabricación de panela y aguardiente.</p>








			<p>Polemoniaceae <i>Cobaea</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21630, 74567</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kampa:nah xanat</i> (flor de campana)</p> <p>Usos:</p>
			<p>Polemoniaceae <i>Loeselia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22325</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Polygalaceae <i>Monnina xalapensis</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21714, 21894, 74304</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>mantah xanat</i> (flor morada)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>








			<p>Polygalaceae <i>Polygala paniculata</i> L.</p> <p>Colecta: 21362</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Polygalaceae <i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake</p> <p>Colecta: 21913</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Polygonaceae <i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21386, 74262, 107419</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xcha:pixi chulhno'</i> (mezquino de ave nocturno) Usos: Medicinal, se aprovecha para tratar los malestares provocados por las hemorroides. Se hierbe la planta (500 g/10 litros de agua), posteriormente se aplica en forma de baño en una tina. Además se tiene que tomar en té dos veces al día hasta que aminoren los dolores (1 planta/ 1 litro de agua).</p>	







Sin registro fotográfico		<p>Polygonaceae <i>Persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) Small</p> <p>Colecta: 107376</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
		<p>Polygonaceae <i>Persicaria punctata</i> (Elliott) Small</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21443, 74136</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpin chachaq</i> (chile de sapo)</p> <p>Usos: Esta planta se utiliza para tratar las ronchas provocado por hongos, se hierve la planta entera y se aplica en forma de baño.</p>
		<p>Polygonaceae <i>Rumex</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74109</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pa:simaqa:t</i> (pancreas)</p> <p>Usos: Esta planta es comestible, se aprovechan únicamente las hojas, estas son utilizadas para condimentar salsas, en especial la salsa verde que se acompaña con carne de puerco o huevo. Además, se pueden consumir crudas.</p>








			
		<p>Polygonaceae <i>Rumex</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74205</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpa:simaqa:t toroh</i> (páncreas de toro)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de hojas angostas.</p> <p>Usos: Se aprovecha como forraje para aves de corral.</p>
		<p>Portulacaceae <i>Portulaca oleracea</i> L.</p> <p>Colecta: 74613</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpulh</i></p> <p>Notas: <i>Xpulh</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de esta planta que crece en sitios rocosos y húmedos. Comestible, se prepara guisado con verduras y carne.</p>







		<p>Portulacaceae <i>Portulaca pilosa</i> L.</p> <p>Colecta: 22425</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Primulaceae <i>Ardisia compressa</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22237, 74459</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqtala:wat</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (falta analizar)</p> <p>Tipos: 1 tipo, existen otras dos plantas con el mismo nombre.</p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible.</p>
		<p>Primulaceae <i>Ardisia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74261</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>wala:p</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin ningún uso.</p>







		<p>Primulaceae <i>Ardisia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74315</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aatala:wat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: EL fruto es comestible.</p>	
		<p>Primulaceae <i>Ardisia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21647</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aatala:wat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: EL fruto es comestible.</p>	
			<p>Primulaceae <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.</p> <p>Colecta: 74600</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Sin uso.</p>







		<p>Primulaceae <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. subsp. <i>coriacea</i></p> <p>Colecta: 74084</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maktáh kiwi'</i> (sin análisis) Cuetzalan Náhuatl <i>chi:lkowit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha el tallo para la construcción de casas rústicas como puntal.</p> <p>Nota: M. Gorostiza observa que en S.M. Tzinacapan se aprovecha como alfradas en la construcción de casas.</p>	
			<p>Primulaceae <i>Parathesis donnell-smithii</i> Mez</p> <p>Colecta: 21910, 74153</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalaj ka:kiwi:ni muju:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: El fruto es comestible, cuando este madura.</p>
		<p>Primulaceae <i>Parathesis psychotriodes</i> Lundell</p> <p>Colecta: 21924, 22100</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>aqtala:wat</i></p>	







			
		<p>Primulaceae <i>Samolus floribundus</i> Kunth</p> <p>Colecta: 21831</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Proteaceae <i>Roupala montana</i> Aubl.</p> <p>Colecta: 22455</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







				
			<p>Ranunculaceae <i>Clematis dioica</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74460</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xlaqpi:tsat monqno'</i> (pestañas de buho)</p> <p>San Juan Tahitic <i>barba de chivo</i> (español)</p> <p>Usos: Sin uso</p>
		<p>Ranunculaceae <i>Clematis</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21723</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xlaqpi:tsat monqno'</i> (pestañas de buho)</p> <p>San Juan Tahitic <i>barba de chivo</i> (español)</p> <p>Usos: Sin uso</p>	








		<p>Ranunculaceae <i>Ranunculus</i> sp.</p> <p>Colecta: 74070</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paqkitsis xanat</i> (flor de cinco pétalos)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Rhamnaceae <i>Frangula capreifolia</i> (Schltdl.) Grubov.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74144</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pulunkswa:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como leña.</p>
		<p>Rhamnaceae <i>Frangula capreifolia</i> (Schltdl.) Grubov var. <i>grandifolia</i> (M.C. Johnst. et L.A. Johnst.) A. Pool.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21850, 22355, 74140,</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lahnan kiwi'</i> (árbol y palabra sin análisis)</p> <p>Usos: Este árbol se aprovecha únicamente para leña.</p>







		<p>Rhamnaceae <i>Gouania obamana</i> A. Pool</p> <p>Colecta: 22406</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rhamnaceae <i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb.</p> <p>Colecta: 22168</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rosaceae <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74214</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>nisperoh</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Esta es una planta medicinal y se utiliza para tratar los malestares de los riñones, como el dolor en el costado, se preparan las hojas en forma de té (4 hojas/1 litro de agua).</p> <p>Nota: Según M. Gorostiza, el fruto es comestible.</p>







		<p>Rosaceae <i>Prunus brachybotrya</i> Zucc.</p> <p>Colecta: 22318</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Colecta: 21997</p>	<p>Totonaco de Zongozotla aqxu:nan kiwi'</p>
			







		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Colecta: 21798</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Colecta: 21888</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Colecta: 22021</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74105</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqxu:nan kiwi'</i> (sin análisis)</p> <p>Usos: Se aprovecha el tallo para la elaboración de cabos de herramientas, como azadones, martillos, picos, hachas, palas, etc.</p>
		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74186</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi aqxu:nan kiwi'</i> (de punta agria pequeños)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos grandes.</p> <p>Usos: Se aprovecha el tallo para la elaboración de cabos de herramientas como; martillos, palas, hachas, etc.</p>
			








		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74470</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xuna: kapulih</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha como leña.</p>	
			<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74562</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Rosaceae <i>Prunus</i> sp.</p> <p>Colecta: 21735</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	


		<p>Rosaceae <i>Rubus</i> sp.</p> <p>Colecta: 21809</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>watsap</i></p>
		<p>Rosaceae <i>Rubus</i> sp.</p> <p>Colecta: 74087</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>watsap</i> Cuetzalan Náhuat <i>wa:tsalwits</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro solo se encuentra en bosque Usos: El fruto de esta planta es comestible.</p>
		<p>Rosaceae <i>Rubus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74434</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>watsap</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. (nota que otros llaman a <i>Rubus</i> sp. con un préstamo del totonaco)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es de frutos más grandes. Usos: El fruto es comestible.</p>







			
		<p>Rosaceae <i>Rubus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74570</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>watsap</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>wa:tsalwits</i></p> <p>Tipos: Hay 3 tipos, los otros dos son de flores y frutos más pequeños.</p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A.Rich. ex DC.</p> <p>Colecta: 22179</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>walhtaqa:t</i></p>







		<p>Rubiaceae <i>Arachnothryx heteranthera</i> (Brandege) Borhidi</p> <p>Colecta: 22223, 22289</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>ti:ltako:t</i></p>
		<p>Rubiaceae <i>Arachnothryx pringlei</i> (Lorence) Borhidi</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74580</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>sa:wapahkowit</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p> <p>Nota: M. Gorostiza comenta que hay 2 tipos, el otro es de flores blancas. El tallo de éste, col. #74580, se usa para hacer artesanías.</p>
			







		<p>Rubiaceae <i>Arachnothryx</i> sp. (or perhaps <i>Gonzalagunia</i> sp.)</p> <p>Colecta: 22236</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltdl.</p> <p>Colecta: 21391</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Chiococca</i> cf. <i>alba</i> (L.) Hitchc.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74514</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Coccocypselum hirsutum</i> Bartl. ex DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21368, 21919, 22255, 74181</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pixi tawan</i> (hierba mezquina)</p> <p>Usos: Esta planta es utilizada contra el tratamiento de los mezquinos en la piel, se aprovechan únicamente los frutos, estos se machan y se aplican sobre la zona afectada dos veces al día, hasta que el mezquino desaparezca.</p>	
				
			<p>Rubiaceae <i>Crusea calocephala</i> DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21350, 22129, 74283</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qoloma: xanat</i> (que florece postrado)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>









		<p>Rubiaceae <i>Crusea coccinea</i> DC. var. <i>breviloba</i> Loes.</p> <p>Colecta: 21885, 22068</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Deppea microphylla</i> Greenman</p> <p>Colecta: 21882</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Diodia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21867</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Diodia virginiana</i> L.</p> <p>Colecta: 22422</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Famea occidentalis</i> (L.) A.Rich.</p> <p>Colecta: 22084, 22096, 22186</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>walhtaqa:t</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>lukút kiwi'</i></p>
		<p>Rubiaceae <i>Galianthe brasiliensis</i> (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo subsp. <i>angulata</i> (Benth.) E.L. Cabral & Bacigalupo</p> <p>Colecta: 74034, 107379</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makastaka:t</i> (hierba postrada) Cuetzalan Náhuat: <i>ochpa:wa:s</i></p> <p>Usos: Las raíces se preparan en té como remedio para los riñones. Y antiguamente se utilizaba la planta para barrer.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Galium</i> sp.</p> <p>Colecta: 22194</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Galium</i> sp.</p> <p>Colecta: 22429</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Gonzalagunia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22239</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Hamelia patens</i> Jacq. Colecta: 21444, 74079</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>malhtantu:lunkx</i> Cuetzalan Náhuat <i>wi:tsikite:mpi:l</i></p> <p>Usos: Esta planta es medicinal, las flores se utilizan para controlar las hemorragias en la nariz, se coloca una flor en la fosa nasal y se aspira el olor de ésta. Se dice que si se juega con esta planta provocara la hemorragia en vez de controlarla.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Hillia tetandra</i> Sw. Colecta: 22414</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Hoffmannia excelsa</i> (Kunth) K.Schum. Colecta: 22314</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Hoffmannia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21643</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Hoffmannia</i> sp.</p> <p>Colecta: 21886</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Manettia reclinata</i> L. (new state register)</p> <p>Colecta: 22233</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Notopleura uliginosa</i> (Sw.) Bremek.</p> <p>Colecta: 22185</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Rubiaceae <i>Oldenlandia microtheca</i> (Schldl. & Cham.) Steud. or <i>Mexotis latifolia</i> (M. Martens & Galeotti) Terrell & H. Rob.</p> <p>Colecta: 74604, 107455</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Notas: Se desconoce esta planta.</p>
			<p>Rubiaceae <i>Palicourea padifolia</i> (Roem. & Schult.) C.M. Taylor & Lorence</p> <p>Colecta: 74068, 107455</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkikwat</i> Cuetzalan Náhuat <i>to:chxo:chit</i> (conejo flor)</p> <p>Usos: Los frutillos de esta planta son comestibles. (M. Gorostiza: Se aplica a las semillas de maíz antes de sembrarla, para que la mazorca sea fácil de desgranar.)</p>



		<p>Rubiaceae <i>Palicourea tetragona</i> (Donn.-Sm.) C. M. Taylor & Lorence (antes <i>Psychotria chiapensis</i>, <i>Psy. tetragona</i>)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>walhtaqa:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>ka:la:omit</i></p>
		<p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74146</p>	<p>Usos: En la antigüedad al no existir dentistas, de este árbol se aprovechaba el látex para controlar el dolor y extraer los dientes dañados, se aplicaba una o dos gotas de látex en el diente dañado, este provocaba que los dientes se destruyeran por completo.</p>
		<p>Rubiaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21876</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rubiaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21881</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Psychotria</i> sp. o <i>Palicourea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22484</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Psychotria elata</i> (Sw.) Hammel</p> <p>Colecta: 22176</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkikwat</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xkikwat</i></p>








		<p>Rubiaceae <i>Psychotria pubescens</i> Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74155</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi walhtaqa:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Psychotria</i> sp.</p> <p>Colecta: 22085</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Psychotria</i> sp.</p> <p>Colecta: 21918</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Rubiaceae <i>Psychotria</i> sp.</p> <p>Colecta: 21921</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Psychotria</i> sp.</p> <p>Colecta: 22495</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Psychotria</i> sp.</p> <p>Colecta: 21623</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>








		<p>Rubiaceae <i>Richardia scabra</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21372, 74351</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah ma:lakachi:ch</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Rubiaceae <i>Sabicea mexicana</i> Wernham</p> <p>Colecta: 22208</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>piok^witaxkol</i></p>
			







		<p>Rubiaceae <i>Sommeria arborescens</i> Schldtl.</p> <p>Colecta: 21905, 22009, 107404</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			
		<p>Rubiaceae <i>Spermacoce remota</i> Lam.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21373, 74122, 74442</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>paxtoqno: tawan</i> (hierba tapacaminos)</p> <p>Tipos: Existe otra planta con el mismo nombre: Lamiaceae, <i>Hyptis capitata</i> Jacq., #74391).</p> <p>Usos: Sin uso.</p> <p>Segundo nombre: <i>xnikna tawan</i> (hierba que desinflama)</p> <p>Usos: Esta planta es medicinal,</p>







			<p>se toma en té para las personas que sufren una caída a cierta altura (5 plantas/1 litro de agua).</p>
		<p>Rubiaceae <i>Spermacoce</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74528</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos:</p>
			

			<p>Rubiaceae <i>Spermacoce</i> sp. o <i>Diodia</i> sp.</p> <p>Colecta: 22053</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Rutaceae <i>Citrus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74539</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xaxkuta la:xax</i> (naranja agria) Cuetzalan Náhuat <i>chichi:kxokot</i></p> <p>Usos: Medicinal, las hojas se preparan en té para combatir la fiebre (10 hojas/1 litro de agua). Nota: M. Gorostiza comenta que el fruto amargo se utiliza para calmar la fiebre.</p>	
		<p>Rutaceae <i>Zanthoxylum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74259</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pixi: kiwi'</i> (uno de tres asesores) (árbol mezquino)</p> <p>Usos: Se emplea el tallo como trabe para casas rústicas.</p>	








		<p>Sabiaceae <i>Meliosma alba</i> (Schltdl.) Walp.</p> <p>Colecta: 21777</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Salicaceae <i>Casearia corymbosa</i> Kunth</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22266, 74410</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lukut kiwi'</i> (solamente uno de tres asesores tuvo un nombre para esta planta) (árbol huesudo)</p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>
			







			<p>Salicaceae <i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turcz.) Sleumer</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74312</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tanqoxa:n</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>tao:lkowit</i></p> <p>Usos: Las hojas se emplean en la preparación del temascal, se utiliza para generar e ingresar aire frío al temascal. Nota: M. Gorostiza comenta que se emplea para la construcción de casas rústicas como alfarilla.</p>
		<p>Salicaceae <i>Salix humboldtiana</i> Willd.</p> <p>Colecta: 74621</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makastaka:t</i></p> <p>Notas: <i>Makastaka:t</i> significa postrado, proviene de <i>makastakah</i> postrado. Conocen un tipo de este árbol que crece a orilla de ríos, se aprovecha solo como leña.</p>	
		<p>Salicaceae <i>Salix microphylla</i> Schltl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21904, 74268</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>makastaka:t/tara:y</i> (postrado de río) Cuetzalan Náhuat <i>ata:wahtsomia:s</i></p> <p>Usos: Medicinal, se utiliza para tratar los malestares de los riñones, únicamente para el dolor en el costado, se aprovechan las hojas en forma de té (3 ramas (100 g)/1 litro de agua).</p>	







		<p>Salicaceae <i>Xylosma characantha</i> Standl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74482, 74484</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:taya'</i></p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro es una planta grande</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Salicaceae <i>Xylosma flexuosa</i> (Kunth) Hemsl. s.l.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22020, 22023, 22205, 22361</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:taya'</i> (falta analizar)</p> <p>Usos:</p>








			
		<p>Salicaceae <i>Xylosma panamensis</i> Turcz.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74424</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:taya'</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, la otra es una planta más pequeña y presenta espinas en todo el tallo.</p> <p>Usos: Medicinal, se aprovechan las hojas o la corteza para combatir la tos, se preparan en forma de té (10 hojas o 10 cm² de corteza /1 litro de agua).</p>
		<p>Santalaceae <i>Phoradendron falcifer</i> Kuijt</p> <p>Colecta: 21718</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maq̄tala tawan</i></p>








		<p>Santalaceae <i>Phoradendron pedicellatum</i> (Tiegh.) Kuijt</p> <p>Colecta: 22174</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maq̄tala tawan</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xaqo:lo muwes</i></p>	
		<p>Santalaceae <i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.</p> <p>Colecta: 22284</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maq̄tala tawan</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xaqo:lo muwes</i></p>	
			<p>Sapindaceae <i>Billia hippocastanum</i> Peyr.</p> <p>Colecta: 22260, 22376</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>itsk^winahkokowit</i></p>




				
			<p>Sapindaceae <i>Cupania glabra</i> Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21133, 22146, 74375</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>la:qax kiwi'</i> (árbol de quetzal) Cuetzalan Náhuat <i>kwesalkowit</i> Totonaco de Atlequizayán <i>la:qax kiwi'</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como columna en la construcción de cabañas y casas rústicas.</p>
		<p>Sapindaceae <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.</p> <p>Colecta: 22309</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	

			
		<p>Sapindaceae <i>Paullinia clavigera</i> Schlechtd.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22031, 22125, 74313</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>la:qax miya:k</i> (bejuco de quetzal)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>la:qax maya:k</i></p> <p>Usos: El tallo y raíces se aprovechan para la elaboración de tepache, en una olla con agua se agregan los trozos y se deja reposar de 2 a 4 días, se endulza con panela al gusto y listo.</p> <p>Nota: Francisco Ignacio Salgado Palomo, de Tacuapa, mpio. Cuetzalan, llama otro <i>Paullinia</i>, <i>P. pinnata</i>, <i>kwesalmekat</i>, con el mismo significado de "bejuco de quetzal".</p>
			







		<p>Sapindaceae <i>Paullinia costaricensis</i> Radlk.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21794</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
		<p>Sapindaceae <i>Paullinia costata</i> Schl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74558</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			







		<p>Sapindaceae <i>Sapindus saponaria</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22338</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>snatph</i> o <i>snatpuh</i></p> <p>Usos:</p>	
		<p>Sapindaceae <i>Serjania cambessedeaana</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22145</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Sapindaceae or Anacardiaceae</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74229</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xi:p</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: REVISAR DETERMINACIÓN</p>







			<p>Sapotaceae <i>Casimiroa edulis</i> La Llave & Lex.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74494</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>skukulu:ja:k</i> (falta analizar) San Juan Tahitic Náhuat <i>ista:k tsapot</i></p> <p>Usos: El fruto maduro es comestible, además las hojas se utilizan para tratar a las personas que padecen de elevada presión arterial en forma de té (2 hojas/1 litro).</p>
		<p>Sapotaceae <i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H.E.Moore & Stearn</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74370</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ja:k</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>kowtsapot</i></p> <p>Usos: El fruto de este árbol es comestible, además las semillas son utilizadas para el crecimiento foliar, se asan las semillas al comal, posteriormente se pican y se mezclan con aceite para cabello.</p>	
		<p>Sapotaceae <i>Sideroxylon contrerasii</i> (Lundell). T.D. Penn</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21660</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	







			
		<p>Scrophulariaceae <i>Buddleja americana</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21724, 74440</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xnikinku:t</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Medicinal, se emplea como agente desinflamador para músculos y para reducir el ácido láctico producto del cansancio y sobre esfuerzo, se hierbe la planta completa y se aplica en forma de baño.</p>
			









Una colecta de *Sinclairia discolor* Hook. & Arn. (74472) fue designado por Osbel López Francisco y su papá, Sebastián López Cano como qantsi: miya:k, un nombre generalmente dado a *Smilax subpubescens* A. DC. Hay otro *Smilax*, todavía no identificado a especie, que se llama *qantsili:lh* y aparentemente otra que se llama *xalak tsuwi qantsili:lh* (pequeño *qantsili:lh*). Así es muy probable que la designación de una Mikania con este nombre fue por error.








			<p>Smilacaceae <i>Smilax aristolochiifolia</i> Mill.</p> <p>Colecta: 22369</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:staq</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>cha:staqa'</i></p>
			<p>Smilacaceae <i>Smilax bona-nox</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74172</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:staq</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat: <i>tek^wetahwits</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos de esta planta, no se especifica cuantos.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>






		<p>Smilacaceae <i>Smilax mollis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.</p> <p>Colecta: 21629, 22287</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:staq</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>alambri:yoh</i></p>
		<p>Smilacaceae <i>Smilax</i> sp.</p> <p>Colecta: 21870</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi qantsili:lh</i></p>
		<p>Smilacaceae <i>Smilax</i> sp.</p> <p>Colecta: 22187</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qantsili:lh</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>qantsili:lh</i></p>







		<p>Smilacaceae <i>Smilax</i> sp.</p> <p>Colecta: 21787</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:staq</i></p>
		<p>Smilacaceae <i>Smilax</i> sp.</p> <p>Colecta: 74065</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi cha:staq</i> (de tallo verde o crudo [pequeños]) Cuetzalan Náhuat <i>tekwetahwits</i></p> <p>Tipos: Simplemente que hay varios tipos de esta planta. Usos: Sin uso, considerado maleza por lo cafecultores.</p>
			

		<p>Smilacaceae <i>Smilax</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74309</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qantsili:lh</i> (antena de cozol/acamaya) Cuetzalan Náhuat <i>kantsili:n</i></p>
		<p>Smilacaceae <i>Smilax</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74260</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqmanqa:wat</i> (de cabeza húmeda) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido.</p>
		<p>Smilacaceae <i>Smilax subpubescens</i> A. DC.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21719, 74303</p>	







			<p>Solanaceae <i>Browallia americana</i> L.</p> <p>Colecta: 21835</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Solanaceae <i>Brugmansia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21550, 74177, 107401</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasananka saqa xanat</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat: <i>to:tolkilit</i> Tipos: Hay 3 tipos, los otros son flores de color rosa y blanco. Usos: Se aprovecha como cerca viva y como forraje para aves de corral.</p>	
			<p>Solanaceae <i>Brugmansia x candida</i> Pers.</p> <p>Colecta: 74058, 74117</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqa xanat</i> (chechar análisis semántico) Cuetzalan <i>to:tolkilit</i></p> <p>Tipos: Hay 3 tipos, los otros dos son de flores rosas y amarillas. Usos: Esta planta se aprovecha como forraje para aves de corral, las hojas se pueden combinar con masa de harina de maíz, para proveer mayor nutrición a las aves.</p>








			<p>Totonaco de Zongozotla <i>pu:tio xanat</i> (flora doble) Cuetzalan Náhuat Parece <i>to:tolkilit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como cerca viva.</p>	
			<p>Solanaceae <i>Brugmansia × insignis</i> (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult.</p> <p>Colecta: 74057</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasqawawa saqa xanat</i> Cuetzalan <i>o:tolkilit</i></p> <p>Usos: Esta planta se aprovecha como forraje para aves de corral, las hojas se pueden combinar con masa de harina de maíz, para proveer mayor nutrición a las aves. (M. Gorostiza: Medicinal, se utiliza para la tos. Se calientan las hojas sobre el fuego y se aplican en la garganta.)</p>
		<p>Solanaceae <i>Cestrum elegans</i> (Brongn.) Schltld.</p> <p>Colecta: 21628</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	








		<p>Solanaceae <i>Cestrum fasciculatum</i> (Schltdl.) Miers</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74501</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Solanaceae <i>Cestrum nocturnum</i> L.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74248</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pulu:x kiwi'</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>kwitakowit</i></p> <p>Usos: Tiene un olor muy penetrante en las noches cuando este está en floración. Nota: M. Gorostiza comenta que se aprovecha hervido como forraje para aves de corral, en ocasiones se mezcla con <i>Brugmansia</i> sp.</p>

		<p>Solanaceae <i>Cestrum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21725</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Solanaceae <i>Jaltomata procumbens</i> (Cav.) J.L. Gentry</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21840, 74208</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tantulhqat</i></p> <p>Usos: Comestible, se aprovechan solo las hojas, se pueden preparar de dos maneras distintas; preparadas en caldo con sal al gusto o envueltas en 3 hojas de plátano sazonadas con sal y se cocinaban a las brasas, la cocción llegaba a su punto cuando la primera capa de hojas de plátano se quemaba, esto podía tardar entre 10 y 15 minutos.</p>
		<p>Solanaceae <i>Lycianthes geminiflora</i> (M. Martens & Galeotti) Bitter</p> <p>Colecta: 21710</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Solanaceae <i>Lycianthes</i> sp.</p> <p>Colecta: 22066</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Solanaceae <i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viv.</p> <p>Colecta: 22126, 22263</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>axkut tawan</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>axkut tawan</i></p>
		<p>Solanaceae <i>Nicotiana</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74455</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>axkut</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>iyakowit</i> San Juan Tahitic Náhuat <i>kowtah taba:koh</i></p> <p>Usos: Medicinal, se utiliza en el tratamiento del empacho en los niños, las hojas son machacadas y posteriormente la pasta se aplica directamente en la parte del estómago.</p>







			<p>Además, que es utilizado de manera recreativa para fumar. Antiguamente se creía que al fumar la planta, ahuyentaba las víboras, por lo cual los señores que trabajaban en las labores del campo, tenía que dar fumadas periódicas, para sentirse seguros.</p>
		<p>Solanaceae <i>Physalis gracilis</i> Miers Colecta: 21445, 21512, 74011</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chapulalh</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat: <i>chiia:wakilit</i> Usos: Esta planta es comestible y medicinal, para consumir se preparan las hojas en caldo o se pueden comer las hojas crudas, y como medicina es utilizado para el malestar de los riñones, preparando las hojas en caldo, sin embargo, solo se bebe el caldo.</p>
			







			<p>Solanaceae <i>Solandra maxima</i> (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S. Green</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21688, 74585</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qa:xi xanat</i> (flor jícara)</p> <p>Usos: Existe una creencia, si las niñas juegan con las flores de esta planta, les crecerán los senos de manera exagerada.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum aphyodendron</i> S. Knapp</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74294</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pulu:x tawan</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>kwitakowit</i></p> <p>Tipos: Nota que los asesores indicaron que solamente hay un tipo de pulux tawan.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
		<p>Solanaceae <i>Solanum cf. appendiculatum</i> Dunal</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21570, 74488</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido. (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	








			<p>Solanaceae <i>Solanum capsicoides</i> All.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74166</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>puxtoqo:qono:t</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat: M. Gorostiza dice que lo ha visto en zonas cálidas, en donde le llaman <i>witsto:tomat</i>.</p> <p>Usos: Se utiliza para tratar los malestares de la próstata, se toma en forma de té.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum cf. erianthum</i> D. Don</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74524</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:xtoq cha:t</i> (bastón de mujer)</p> <p>Tipos: Hay 2 tipos, el otro tienen espinas en el tallo. Un asesor dijo que solamente conoce la con espinas como <i>xlixtoq chat</i>.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
				







			<p>Solanaceae <i>Solanum lanceolatum</i> Cav.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74279</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xli:xtoq cha:t</i> (bastón de mujer)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Solanaceae <i>Solanum nigrescens</i> M. Martens & Galeotti or <i>S. douglasii</i> Dunal)</p> <p>Colecta: 21364, 74028</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>mu:stalu:t</i> (hierba de bolitas en el ápice) Cuetzalan Náhuat: <i>tomakilit</i></p> <p>Usos: Esta planta es comestible, se preparan las hojas en caldo o se pueden comer crudas acompañadas de una tortilla.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum nudum</i> Dunal</p> <p>Colecta: 74036</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqtsintsi paska:t</i> (mujer despeinda) Cuetzalan Náhuat: <i>ti:Itik kwitakowit</i></p> <p>Usos: Un asesor comentó que esta planta es medicinal, se utiliza en forma de baño para aliviar el espanto por eventos trágicos. Otro asesor agregó que esta planta es medicinal, se utiliza para bañar a las mujeres recién aliviadas y para</p>	







			<p>bebés con el fin de prevenir enfermedades.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum schlechtendalium</i> Walp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74238</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pulu:x tawan</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat <i>ma:nehnextik kwitakowit</i></p> <p>Usos: Sin ningún aprovechamiento.</p>
			







		<p>Solanaceae <i>Solanum skutchii</i> Correll</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21575, 74169, 107393</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtamat kux</i> (tomate de pavo de monte)</p> <p>Usos: El fruto de esta planta es comestible, se utiliza para la elaboración de salsas.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21825</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21856</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Solanaceae <i>Solanum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21900</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de San Juan Tahitic <i>itsk^win pah wits</i></p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21926</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Solanaceae <i>Solanum</i> sp.</p> <p>Colecta: 21627</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>pulux tawan</i></p> <p>Náhuat de San Juan Tahitic <i>piok^wita kowit</i></p>






			<p>Solanaceae <i>Solanum umbellatum</i> Mill.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74239</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tsi:wana: tawan</i> (hierba que da comezón) Cuetzalan Náhuat <i>tsohpilo:kowit</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p> <p>Nota: Algunos en Cuetzalan dicen que esta planta es comida por los perros para el empacho.</p>
		<p>Solanaceae <i>Witheringia solanacea</i> L'Her.</p> <p>Colecta: 22407</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
		<p>Staphyleaceae <i>Turpinia insignis</i> (Kunth) Tul.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74148</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>li:qalanqlhwat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como combustible en forma de leña.</p>	







		<p>Styracaceae <i>Styrax glabrescens</i> Benth.</p> <p>Colecta: 22386, 74656</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>ista:k kowit</i></p>
			
		<p>Symplocaceae <i>Symplocos coccinea</i> Bonpl.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21633, 22206, 74256, 74473</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtaknán kiwi'</i> (árbol verdoso)</p> <p>Náhuat de zoquiapan <i>xoxoktik kowit</i></p>







			
		<p>Talinaceae <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.</p> <p>Colecta: 21336, 22153</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Theophrastaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21813</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>







		<p>Tovariaceae <i>Tovaripendula</i> Ruiz & Pav.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21486, 74589</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			
		<p>Ulmaceae <i>Phyllostylon rhamnoides</i> (J.Poiss.) Taub. (sin. <i>Phyllostylon brasiliensis</i> Capan. ex Benth. & Hook.f.)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74295</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpaqan matsiswani:na'</i> (alas de anochedor)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>





		<p>Urticaceae <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.</p> <p>Colecta: 21659, 74010</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:qo:wa'</i> (sin interpretación) Cuetzalan Náhuat: <i>chi:kis</i> Tipos: Hay 2 tipos, no hay información adicional. Usos: Esta planta es medicinal, se aprovechan los brotes para preparar un té que ayuda a disminuir los dolores provocados por la presión arterial, además, las hojas en forma de té sirven para tarar la gastritis.</p>
		<p>Urticaceae <i>Myriocarpa</i> sp.</p> <p>Colecta: 22351</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ku:jala'</i></p>
		<p>Urticaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 22478</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>xpayit</i></p>










			<p>Urticaceae Pendiente</p> <p>Colecta: 21553</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Sin registro fotográfico</p>			<p>Urticaceae <i>Phenax hirtus</i> (Sw.) Wedd.</p> <p>Colecta: 107395</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
			<p>Urticaceae <i>Pilea cf. irrorata</i> Donn. Sm.</p> <p>Colecta: 22433</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuatl de Zoquiapan <i>a:xiwit</i></p>








		<p>Urticaceae <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.</p> <p>Colecta: 21381</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Urticaceae <i>Pilea pubescens</i> Liebm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74343, 107433, 107442</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpuyit tawan</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Urticaceae <i>Pilea</i> sp.</p> <p>Colecta: 21917</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>

		<p>Urticaceae <i>Pilea</i> sp.</p> <p>Colecta: 22063</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Urticaceae <i>Ureia corallina</i> (Liebm.) Wedd. Descripción:</p> <p>Colecta: 21464, 21897, 74127</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpuyit</i> (que provoca ronchas) Cuetzalan Náhuat <i>a:tsi:tsika:s</i></p> <p>Usos: Esta planta es utilizada únicamente como cerca viva, debido a las glándulas urticantes que esta posee.</p>
		<p>Urticaceae <i>Ureia rzedowskii</i> V.W. Steinm.</p> <p>Colecta: 22370</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>









		<p>Urticaceae <i>Urtica chamaedryoides</i> Pursh</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74495</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>chili:x</i> (falta analizar) San Juan Tahitic Náhuat <i>tsi:tsika:s</i></p> <p>Usos: Medicinal, se emplea para tratar la reumatoides, se puede aplicar de forma directa, las hojas se colocan en la zona afectada o también se puede machacar la planta y colocarla con apoyo de una venda.</p>
		<p>Valerianaceae <i>Valeriana candolleana</i> Gardner</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21482, 74103</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>spuntak</i> (de apariencia algodonoso) Cuetzalan Náhuat: Sin nombre conocido. aunque M. Gorostiza observó que En otros lugares lo conocen como "itskuinxiwit" perro-hierba.</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento Se considera maleza porque enreda completamente las matas de café.</p>
			







<p>Sin registro fotográfico</p>		<p>Valerianaceae <i>Valeriana scandens</i> var. <i>candolleana</i> (Gardner) C.A.Mull.</p> <p>Colecta: 107416</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.</p>
		<p>Verbenaceae <i>Bouchea prismatica</i> (L.) Kuntze</p> <p>Colecta: 22037</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Verbenaceae <i>Cornutia pyramidata</i> L.</p> <p>Colecta: 22510</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p> <p>Náhuat de Cuetzalan <i>kowiteko:ni</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>witeko:n</i></p>

			<p>Verbenaceae <i>Lantana camara</i> L.</p> <p>Colecta: 21354, 74056</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xlaqastapu ski:ti'</i> (ojo de pez) Cuetzalan Nahuat <i>tanokwilpahxiwit</i></p> <p>Usos: Antiguamente, se consumían los frutos al madurar, actualmente ya no se práctica, pero los frutos son comestibles. (M. Gorostiza: Se hierve y se usa como enjuague bucal para aliviar aftas bucales.)</p>
				
			<p>Verbenaceae <i>Lantana</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22022, 22040, 74284</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xlaqastapu ski:ti'</i> (ojo de pez)</p> <p>Usos: El fruto es comestible.</p>








		<p>Verbenaceae <i>Lippia myriocephala</i> Schlttdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74387, 74413</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>a:xkut kiwi'</i> (árbol de tabaco) Cuetzalan Náhuat <i>ok^wilkowit</i></p> <p>Usos: Se aprovecha como leña.</p>
		<p>Verbenaceae <i>Petrea volubilis</i> L.</p> <p>Colecta: 224444</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			







		<p>Verbenaceae <i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21922, 74118</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>saqsi tawan</i> (hierba dulce) Cuetzalan Náhuat <i>tsope:kxiwit</i> Usos: Medicinal, se hace un té con las hojas y tallo y se utiliza para el dolor de vientre, matriz y malestares causados por la menstruación, además se utiliza cuando ocurre ausencia de la menstruación por irregularidad. Nota: M. Gorostiza agrega que se usa para preparar un atole.</p>	
			<p>Verbenaceae <i>Priva</i> sp.</p> <p>Colecta: 21485</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
			<p>Verbenaceae <i>Verbena</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74240</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xtantu:n xtaki'</i> (patas de saltamontes)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>









			<p>Violaceae <i>Pombalia attenuata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Paula-Souza</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74145</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>aqastujut xanat</i> (flor de arete)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Viscaceae <i>Phoradendron hexastichum</i> (DC.) Griseb.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74233</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maqawala: tawan</i> (hierba que posa) Cuetzalan Náhuat <i>tepalkat</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no enumerados.</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento.</p>
		<p>Viscaceae <i>Phoradendron undulatum</i> (Pohl ex DC.) Eichler</p> <p>Colecta: 74097</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>maqawala: tawan</i> (hierba que posa) Cuetzalan Náhuat <i>tepalkat</i></p> <p>Usos: Sin aprovechamiento alguno.</p>	








		<p>Vitaceae <i>Cissus microcarpa</i> Vahl</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74132</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tlanka taxa:k</i> (análisis de significado pendiente)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>a:ki:tsmekat</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, desconoce el total de estas</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento, al tener contacto con la planta, provoca ronchas en todo el cuerpo.</p>
		<p>Vitaceae <i>Cissus</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74165</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xasnapapah taxa:k</i> (falta analizar)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>a:ki:tsmekat</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos.</p> <p>Usos: Sin aprovechamiento. Pero al tener contacto con la planta provoca ronchas en todo el cuerpo.</p>
		<p>Vitaceae <i>Cissus</i> sp.</p> <p>Colecta: 22346</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>





			<p>Vitaceae <i>Vitis popenoei</i> J.L. Fennell</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74302</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kaxapat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: El tallo se aprovecha para elaborar cunas rústicas.</p>	
				<p>Vitaceae <i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22141, 74152</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>snunkut</i> (sin análisis)</p> <p>Cuetzalan Náhuat <i>texokomekat</i></p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>chuchox</i></p> <p>Usos: De esta planta se aprovecha el tallo como laso, se utiliza principalmente como amarre en la elaboración de cercas rústicas de patio.</p> <p>Nota: M. Gorostiza agregó que se puede cortar y beber del jugo que este contiene.)</p>
			<p>Winteraceae <i>Drimys granadensis</i> L.f.</p> <p>Colecta: 21880</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	





		<p>Zamiaceae <i>Ceratozamia mexicana</i> Brongn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22034, 74246</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ku:nu'</i> Cuetzalan Náhuat <i>tepe:sin</i></p> <p>Usos: Las semillas se consumen asadas al comal, además las hojas se utilizan como ornamento en ceremonias sociales.</p>	
		<p>Zingiberaceae <i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74226</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qaxtah xanat</i> (flor cal) Cuetzalan Náhuat <i>a:yo:iswat</i></p> <p>Usos: Se aprovecha únicamente como ornato.</p>	
			<p>Zingiberaceae <i>Renealmia alpinia</i> (Rottboell) Maas</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74130</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xkijat</i> (olor a resina) Cuetzalan Náhuat <i>nexkihiswat o nexkihit</i></p> <p>Usos: Se aprovechan las hojas para envolver tamales de frijol, y los frutos son comestibles, se preparan hervidos y se ingieren directamente.</p> <p>Nota: M. Gorostiza. EL fruto es comestible (pulpa), se hierve y se le agrega pimienta. Además, las hojas se usan para envolver tamales.</p>






			<p>Zingiberaceae <i>Renealmia</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21465, 74158</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xalak tsuwi xkijat</i> Cuetzalan Náhuat: Sin nombre conocido. (nota que no se llama <i>nexkihít</i>, cf. #74130)</p> <p>Usos: Se aprovechan las hojas en la elaboración de tamales, se cortan pedazos de la hoja y se mezclan en la masa, sin embargo, al momento de degustar se retiran las hojas, ya que no son comestibles.</p>
			<p>Zingiberaceae <i>Zingiber officinale</i> Roscoe</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74278</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xpin kachupi:n</i></p> <p>Usos: Medicinal, de esta planta se aprovechan las raíces para el dolor de muelas, se machacan las raíces crudas y se aplican de manera directa en las muelas dañadas. Además, esta planta se utiliza para los dolores reumáticos, se machacan las raíces y se aplican en la zona afectada y se sujetan con una venda.</p>








			<p>Anemiaceae <i>Anemia mexicana</i> Klotzsch var. <i>mexicana</i></p> <p>Colecta: 22157</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laksu tankapa:s</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			<p>Anemiaceae <i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74399</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>laksu tankapa:s</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
				







		<p>Aspleniaceae <i>Asplenium auriculatum</i> Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74581</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, sin especificar.</p> <p>Usos: Sin uso</p>	
				
			<p>Aspleniaceae <i>Asplenium harpeodes</i> Kunze</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74569</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>




		<p>Blechnaceae <i>Blechnum appendiculatum</i> Willd.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 21379, Tejero 5772</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i> (falta analizar)</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Blechnaceae <i>Blechnum polypodioides</i> Raddi</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5789</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
		<p>Blechnaceae <i>Parablechnum schiedeanum</i> (Schltdl. ex C.Presl) Gasper & Salino</p> <p>Colecta: 22248</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i> (falta analizar)</p> <p>Náhuat Zoquiapan <i>pesmat</i></p>

		<p>Cyatheaceae <i>Alsophila firma</i> (Baker) D.S. Conant</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1668, 2853, Tejero 5779</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxan</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no especificados. Usos:</p>	
				
		<p>Cyatheaceae <i>Cyathea bicrenata</i> Liebm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2852, Tejero 5780</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tampo:qo akxan</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no especificados. Usos:</p>	






				
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Cyatheaceae <i>Cyathea divergens</i> var. <i>tuerckheimii</i> (Maxon) R.M. Tryon</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5783 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxan</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat Sin nombre conocido. San Juan Tahitic Sin nombre conocido.</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no especificados. Usos: El tallo se aprovecha como columna para casas rústicas y para la elaboración de artesanías talladas.</p>	
			<p>Cyatheaceae Cyatheaceae <i>Cyathea tuerckheimii</i> Maxon</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74475, 74476, 74477</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxan</i> (falta analizar) Cuetzalan Náhuat pesma San Juan Tahitic Sin nombre conocido.</p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no especificados. Usos: El tallo se aprovecha como columna para casas rústicas y para la elaboración de artesanías talladas.</p>







				
			<p>Cyatheaceae <i>Sphaeropteris myosuroides</i> (Lieb.) R. Tryon</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22305</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxan</i> (falta analizar)</p> <p>Totonaco de Atlequizayán <i>kichi:x</i></p> <p>Tipos: Hay varios tipos, no especificados. Usos: El tallo se aprovecha como columna para casas rústicas y para cercas.</p>
				








				
		<p>Dennstaedtiaceae <i>Pteridium caudatum</i> (L.) Maxon</p> <p>Colecta: 2842</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i></p> <p>Notas:</p>	
<p>Sin foto</p> 	<p>Sin foto</p>	<p>Dennstaedtiaceae <i>Saccoloma inaequale</i> (Kunze) Mett.</p> <p>Colecta: Tejero 5784 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p> <p>Notas:</p>	



				<p>Dicksoniaceae <i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.</p> <p>Colecta: 2851, 74673</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tanqosmit</i></p> <p>Notas: <i>Tanqosmit</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de esta planta que crece en sitios perturbados, las hojas se emplean para techar casas y viveros.</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Dryopteridaceae <i>Ctenitis bullata</i> A.R. Sm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1661</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>		
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Dryopteridaceae <i>Ctenitis cf. interjecta</i> (C. Chr.) Ching</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1664</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>		




Sin foto	Sin foto	<p>Dryopteridaceae <i>Elaphoglossum ellipticifolium</i> A. Rojas</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1663</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Dryopteridaceae <i>Elaphoglossum loraе</i> Mickel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5781</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Dryopteridaceae <i>Elaphoglossum paleaceum</i> (Hook & Grev.) Sledge</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5760</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>



Sin foto		Sin foto		<p>Dryopteridaceae <i>Elaphoglossum sartorii</i> (Liebm.) Mickel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5769, 5782</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
				<p>Dryopteridaceae <i>Elaphoglossum</i> sp. (ejemplar sin los elementos para llegar a especie)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74265</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>qo:qo: tawan</i> (hierba muda)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se enumeran ni se presentan.</p> <p>Usos: Sin uso conocido.</p>
				<p>Dryopteridaceae <i>Mickelia bernoullii</i> (Kuhn ex Christ) R. C. Moran, Labiak & Sundue</p> <p>Colecta: 22506</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>akxan</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>pesmat</i></p>










				
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Dryopteridaceae <i>Phanerophlebia remotispora</i> E. Fourn.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1666, Tejero 5774</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>	
			<p>Equisetaceae <i>Equisetum myriochaetum</i> Schltld. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74285</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kstajan k^w ayoh</i> (cola de caballo)</p> <p>Usos: Medicinal, se utiliza para tratar los malestares de los riñones, como el dolor en el costado, se prepara en forma de té (50 cm del tallos/1 litro de agua).</p>




		<p>Gleicheniaceae <i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching</p> <p>Colecta: 2841, 74639</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:maqsasat</i></p> <p>Notas: <i>Cha:maqsasat</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos, se emplea el tallo para la elaboración de jaulas rústicas.</p>	
				
			<p>Gleicheniaceae <i>Sticherus ferrigineus</i> (Desv.) J. Gonzalez (antes <i>S. bifidus</i>)</p> <p>Colecta: 74638</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>cha:maqsasat</i></p> <p>Notas: <i>Cha:maqsasat</i> no tiene interpretación. Conocen un tipo de esta planta que crece a orilla de caminos, se emplea el tallo para la elaboración de jaulas rústicas.</p>





			
Sin foto	Sin foto	<p>Hymenophyllaceae <i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Colecta: Tejero 5786a (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Hymenophyllaceae <i>Hymenophyllum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5786b (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>






Sin foto	Sin foto	<p>Hymenophyllaceae <i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5786c (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Lycopodiaceae <i>Huperzia taxifolia</i> (Sw.) Trevis</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5765 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
			<p>Lycopodiaceae <i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic. Serm.) (sinónimo <i>Palinhaea cernua</i> (L.) Vasc. & Franco)</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2844, 74281</p> <p>Totonaco de Zongozotla <i>xaqaloqot luwa'</i> (cuerno de serpiente/víbora)</p> <p>Usos: Se utiliza como ornamento en ceremonias sociales.</p>



Sin foto	Sin foto	<p>Lycopodiaceae <i>Phlegmariurus linifolius</i> (L.) B. Øllg.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1660, Tejero 5761 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Lycopodiaceae <i>Phlegmariurus taxifolius</i> (Sw.) Á. Löve & D. Löve</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1662</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
		<p>Marattiaceae <i>Marattia weinmannifolia</i> Liebm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74471</p> <p>Nota: Los de Zongozotla reconocen solamente un tipo. A. Sotelo de S. Juan Tahitic dice que hay dos, el otro tiene el interior del rizoma morado, éste</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>ka:tama li:wat</i> (falta analizar)</p> <p>Usos: En la antigüedad, en situaciones de escases y extrema pobreza, los pobladores se veían obligados a buscar este helecho y extraerle su rizoma para utilizarlo como alimento. El proceso inicia retirando la corteza del rizoma y posteriormente se hierva, una vez llegado la cocción total, se</p>







		<p>es blanco. El rizoma es comestible, se hierve por un día completo, posteriormente se mezcla con nixtamal y se muele para hacer tortillas.</p>	<p>hace una pasta y se mezcla con masa de maíz, para luego hacer tortillas. El fin del rizoma era aumentar el volumen de masa, para obtener más tortillas empleando poco maíz.</p>		
			<p>Ophioglossaceae <i>Ophioglossum nudicaule</i> L. f.</p> <p>Colecta: 21360</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i></p>	
				<p>Osmundaceae <i>Osmunda regalis</i> var. <i>spectabilis</i> (Willd.) A. Gray</p> <p>Colecta: 22249, Tejero 5787</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i></p>





Sin foto	Sin foto	<p>Polypodiaceae <i>Campyloneurum amphostenon</i> (Kunze ex Klotzsch) Fée</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5762 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>	
			<p>Polypodiaceae <i>Campyloneurum xalapense</i> Fée</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74513, Tejero 5766</p>	<p>Totonaco de Zongozotla qo:qo: tawan (falta analizar)</p> <p>Usos: Anteriormente, esta planta se utilizaba para hacer hablar a los niños, el ritual consistía en ir rompiendo poco a poco la hoja cerca de la boca del niño, mientras el instructor pronuncia frases cortas y sencillas, para que el menor intente repetirlo.</p> <p>Nota: El mismo uso se reporta de Hueyapan (náhuatl)</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Polypodiaceae <i>Campyloneurum</i> sp.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2846</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>spada tawan</i></p> <p>Usos: Sin uso.</p>	






		<p>Polypodiaceae <i>Cochlidium linearifolium</i> (Desv.) Maxon ex C. Chr.</p> <p>Colecta: 21883</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>	
			<p>Polypodiaceae <i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22330, 74267, Tejero 5752</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>spada tawan</i> (hierba espada)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos que no se enumeran ni se presentan.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Polypodiaceae <i>Pecluma alfredii</i> (Rosenst.) M.G. Price y <i>Pecluma alfredii</i> (Rosenst.) M.G. Price var. <i>cupreolepis</i> (A.M. Evans) A. R. Sm.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1656, Tejero 5752</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	






		<p>Polypodiaceae <i>Pecluma bourgeauana</i> L.A. Triana-Moreno</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74550</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i></p> <p>Usos: <i>Tankapa:s</i> es el nombre que recibe la gran mayoría de especies de helechos. Conocen varios tipos de esta planta que crece en sitios húmedos, no presenta ningún uso.</p>	
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Polypodiaceae <i>Pecluma longepinnulata</i> (E. Fourn.) F.C. Assis & Salino</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5776</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p> <p>Usos: Sin uso.</p>	
			<p>Polypodiaceae <i>Phlebodium pseudoaureum</i> (Cav.) Lellinger</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2845, 74171, Croat 107417, Tejero 5764</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kurus tawan</i> (hierba de cruz) Cuetzalan Náhuat: <i>mi:misto:n</i></p> <p>Usos: Se utiliza el rizoma de esta planta para tratar los dolores de la garganta en forma de té, (15 cm de rizoma/ 1 litro de agua).</p>




		<p>Polypodiaceae <i>Pleopeltis crassinervata</i>(Fée) T. Moore</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1658, 2849, 74167, Tejero 5754</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xmaka:n mi:tsi'</i> (patas de gato)</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Polypodiaceae <i>Pleopeltis fallax</i> (Schltdl. & Cham.) Mickel & Beitel</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: Tejero 5758 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Polypodiaceae <i>Pleopeltis plebeia</i> (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm. & Tejero</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1655, Tejero 5751, 5759 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>



		<p>Polypodiaceae <i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R. Sm. Descripción: Colecta: 74462</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kurus tawan</i> (hierba de cruz) Tipos: Hay 1 tipo, existe otra planta con el mismo nombre (<i>Phlebodium pseudoaureum</i>) Usos: Sin uso</p>
		<p>Pteridaceae <i>Argyroschisma incana</i> (C. Presl) Windham Colecta: 22047</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
		<p>Pteridaceae <i>Argyroschisma incana</i> (C. Presl) Windham Colecta: 22047</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>





Sin foto	Sin foto	<p>Pteridaceae <i>Llavea cordifolia</i> Lag.</p> <p>Colecta: 1657, Tejero 5753</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
		<p>Pteridaceae <i>Mildella intramarginalis</i> (Kaulf. ex Link) Trevis</p> <p>Colecta: 2850</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>lak tsu tankapa:s</i></p>
		<p>Pteridaceae <i>Pityrogramma trifoliata</i> (L.) R.M. Tryon</p> <p>Colecta: 22257, Croat 107396 (identificado como <i>Pityrogramma</i> sp.)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i></p> <p>Náhuat de Zoquiapan <i>pesmat</i></p>



			
		<p>Pteridaceae <i>Pteris orizabae</i> M. Martens & Galeotti</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74533</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos pero no se especifican más.</p> <p>Usos: Sin uso.</p>
			



			<p>Pteridaceae <i>Pteris pulchra</i> Schltdl. & Cham.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74461</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>tankapa:s</i> (falta analizar)</p> <p>Tipos: Hay varios tipos pero no se especificaron.</p> <p>Usos: Se aprovecha como ornamento vivo en parques y jardines.</p>
		<p>Pteridaceae <i>Scoliosorus ensiformis</i> (Hook.) T. Moore</p> <p>Colecta: 1670, Tejero 5790</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>	
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>			

			<p>Vittariaceae <i>Vittaria bradeorum</i> Rosenst.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 22167</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Pteridaceae <i>Vittaria flavicosta</i> Mickel & Beitel</p> <p>Colecta: Tejero 5770</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>	
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Saccolomataceae <i>Saccoloma inaequale</i> (Kunze) Mett.</p> <p>Colecta: 1669</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>	

		<p>Schizaeaceae <i>Schizaea elegans</i> (Vahl) Sw.</p> <p>Colecta: 22418</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin nombre conocido.</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Selaginellaceae <i>Selaginella flexuosa</i> (C. Presl) Spring</p> <p>Colecta: Tejero 5785 (col. Zoquiapan)</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Selaginellaceae <i>Selaginella pallescens</i> (C. Presl) Spring</p> <p>Colecta: 1659 (como <i>S. cf. pallescens</i>); Tejero 5755</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>

Sin foto	Sin foto	<p>Selaginellaceae <i>Selaginella silvestris</i> Aspl.</p> <p>Colecta: Tejero 5756</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
		<p>Selaginellaceae <i>Selaginella stellata</i> Spring</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 74563</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xma:saqa luwa'</i> (nido de víbora/serpiente) Cuetzalan Náhuat <i>ichkapxiwit</i></p> <p>Tipos: Hay solamente un tipo. Usos: Se tiene la creencia, que para prevenir el ataque de una garrapata al realizar recorridos en el monte, se ponga 12 plantas de este helecho en la bolsa del pantalón.</p>
		<p>Selaginellaceae <i>Selaginella</i> cf. <i>stellata</i> Spring</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 2843</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>xma:saqa luwa'</i> (nido de víbora/serpiente)</p> <p>Usos: Se tiene la creencia, que para prevenir el ataque de una garrapata al realizar recorridos en el monte, se ponga 12 plantas de este helecho en la bolsa del pantalón.</p>

Sin foto	Sin foto	<p>Tectariaceae <i>Ctenitis bullata</i> A.R. Sm.</p> <p>Colecta: Tejero 5763</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Tectariaceae <i>Ctenitis</i> sp.</p> <p>Colecta: Tejero 5771</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos</p>
		<p>Tectariaceae <i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw.</p> <p>Descripción:</p> <p>Colecta: 1667, 22424, Tejero 5777</p>	<p>Totonaco de Zongozotla <i>kurus tawan</i> (hierba de cruz)</p>

			
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Thelypteridaceae <i>Amarauropelta concinna</i> (Willd.) Pic. Serm.</p> <p>Colecta: 107454</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos.</p>
<p>Sin foto</p>	<p>Sin foto</p>	<p>Thelypteridaceae <i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy</p> <p>Colecta: Tejero 5775</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos.</p>

Sin foto	Sin foto	<p>Thelypteridaceae <i>Christella quadrangularis</i> (Fée) Holttum</p> <p>Colecta: Tejero 5773</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos.</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Thelypteridaceae <i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching</p> <p>Colecta: 1665</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos.</p>
Sin foto	Sin foto	<p>Thelypteridaceae <i>Thelypteris cheilanthoides</i> (Kunze) Proctor</p> <p>Colecta: Croat 107377</p>	<p>Totonaco de Zongozotla Sin datos.</p>

Sin foto	Sin foto	Thelypteridaceae <i>Thelypteris rudis</i> (Kunze) Proctor Colecta: Tejero 5788 (col. Zoquiapan)	Totonaco de Zongozotla Sin datos de registro.
----------	----------	---	---

Falta coleccionar

1.

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann

Colecta: 74322, 74622 **Tipos:** Hay 2 tipos, el otro tiene espinas en el tallo, este no tiene.

Pisonia aculeata kwi:xistit. Significa "garra de gavilán" que es el mismo significado que tiene en totonaco, así es un calco. No tiene uso alguno. La planta que Salgado Palomo conoce como kwi:xistit se da en los montes y orillas de caminos en la zona donde hace calor. Es de tallo leñoso y crece hasta unos 15 o 20 metros de altura apoyándose en los árboles, puede alcanzar unos 4 o 5 cm de diámetro.

Zongozotla xmakasiyin waya'

Atlequizayan ksi:yen wa:ya'

Usos:

¹ Se agradece NSF-DEL, NEH Preservation and Access, CONABIO, ELDP

² Las colectas se hicieron también por Canek Ledesma Corral, Anastacio Sotelo Hernández y Mariano Gorostiza Salazar. Las fotografías son de Osbel López Francisco y Mariano Gorostiza Salazar.

El apoyo general de Allan Coombes era imprescindible para las identificaciones de las especies aunque también contamos con el apoyo de los siguientes botánicos para identificaciones de familias específicas: **Acanthaceae**: Tom Daniel; **Areaceae** (*Chamaedorea*): Donald Hodel